

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Nystatin Orifarm 100000 TV/ml geriamoji suspensija

nystatinas

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite šį lapelį, nes jame pateikiama svarbi informacija apie vaistą. Svarbi informacija jums.

- Išsaugokite šį lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Šis vaistas skirtas tik jums. Nedalinkite jo kitiems. Jis gali jiems pakenkti, net jei jų ligos požymiai tokie patys kaip jūsų.
- Jeigu pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, kuris nėra išvardytas šiame lapelyje. Žr. 4 skyrių. Kas yra šiame lapelyje

Kas yra Nystatin

1. Orifarm ir kam jis vartojamas Kas jums reikia žinoti prieš vartojant Nystatin
2. Ką turite žinoti prieš vartodami Nystatiną Orifarm
3. Kaip vartoti Nystatin Orifarm
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Nystatin Orifarm
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Nystatin Orifarm ir kam jis vartojamas

Nystatin Orifarm priklauso priešgrybelinių vaistų grupei. Jame yra veiklioji medžiaga nistatinas. Jis veikia lokaliai gleivinėje ir nėra absorbuojamas į organizmą.

Nystatin Orifarm vartojamas burnos ir žarnyno grybelinėms infekcijoms gydyti.

2. Ką reikia žinoti prieš vartojant Nystatin Orifarm

Nevartokite Nystatin Orifarm

- jeigu esate alergiškas nistatino ar bet kuriai kitai šio vaisto sudedamajai daliai (išvardytai 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš vartodami Nystatin Orifarm

Kiti vaistai ir Nystatin Orifarm

Pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui, jei vartojate, neseniai vartojote ar galite vartoti kitus vaistus.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Jei esate nėščia ar žindote kūdikį, manote, kad galite būti nėščia arba planuojate pastoti, prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

Šį vaistą turėtumėte vartoti tik tuo atveju, jei gydytojas mano, kad nauda jums viršija galimą riziką vaisiui.

Žindymas

Nežinoma, ar Nystatin Orifarm patenka į motinos pieną. Prieš žindydama vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Nėra žinomo šio vaisto poveikio gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

Nystatin Orifarm sudėtyje yra sudėtyje yra metilo parahidroksibenzoatas ir natrio metilo parahidroksibenzoatas gali sukelti alergines reakcijas (galimai uždelstas).

Šiame vaistiniame preparate yra 1,2 mg natrio 1 ml geriamojoje suspensijoje, tai yra mažiau nei 23 mg vienoje dozėje, t. y. iš esmės „be natrio“.

3. Kaip vartoti Nystatin Orifarm

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Jūsų gydytojas arba odontologas nustatys dozę ir ji bus individualizuota jums.

Buteliuką reikia gerai suplakti prieš naudojimą.

Burnos ertmės grybelinė infekcija: Rekomenduojama dozė suaugusiesiems yra 1 ml, 4 kartus per dieną. Suspensiją geriausia vartoti po valgio ir laikyti burnoje kuo ilgiau prieš nuryjant.

Vartojimas vaikams, kūdikiams ir naujagimiams

Rekomenduojama dozė vaikams (vyresniems nei 2 metų), kūdikiams (nuo 1 mėnesio iki 2 metų) ir naujagimiams (nuo gimimo iki 1 mėnesio) yra 1 ml, 4 kartus per dieną. Suspensiją geriausia vartoti po valgio ir laikyti burnoje kuo ilgiau prieš nuryjant. Kūdikiams suspensija gali būti duodama lašais arba praskiedžiama nedideliu kiekiu vandens ir tepama burnoje.

Žarnyno grybelinė infekcija: Rekomenduojama dozė suaugusiesiems yra 5 ml 3 kartus per dieną. Suspensiją nurykite tiesiogiai. Kad išvengtumėte infekcijos pasikartojimo, gydymą turėtumėte tęsti 2-3 dienas po to, kai visi infekcijos požymiai išnyks.

Vartojimas vaikams ir kūdikiams

Rekomenduojama dozė vaikams (vyresniems nei 2 metų) ir kūdikiams (nuo 1 mėnesio iki 2 metų) yra 1 ml, 4 kartus per dieną. Suspensiją nurykite tiesiogiai. Kad išvengtumėte infekcijos pasikartojimo, gydymą turėtumėte tęsti 2-3 dienas po to, kai visi infekcijos požymiai išnyks.

Jei vartojate daugiau Nystatin Orifarm nei turėtumėte

Jei pavartojote per daug arba vaikas netyčia išgėrė vaisto, kreipkitės į gydytoją arba skubios pagalbos skyrių, kad įvertintų riziką ir patartų.

Jei pamiršote pavartoti Nystatin Orifarm

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Nustokite vartoti Nystatin Orifarm ir nedelsdami pasakykite savo gydytojui, jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų:

Sunkūs odos ir gleivinės pokyčiai (vadinamasis Stevenso-Džonsono sindromas).

Tai yra retas šalutinis poveikis ir gali pasireikšti iki 1 iš 1000 žmonių.

Padidėjusio jautrumo reakcijos ir vietinis odos patinimas (angioedema), reakcija, kurios metu veidas ir kaklas gali žymiai patinti.

Padidėjusio jautrumo reakcijos nuo šio vaisto yra labai reti šalutiniai poveikiai (gali pasireikšti iki 1 iš 10 000 žmonių) arba nežinomi (dažnis negalima įvertinti pagal turimus duomenis).

Raudonas, pleiskanojantis išplitęs bėrimas su gumbeliais po oda ir pūslėmis, lydymas karščiavimu. Simptomai paprastai pasireiškia gydymo pradžioje (ūminė generalizuota egzantematinė pustuliozė). Dažnis negalima įvertinti pagal turimus duomenis.

Nedažnas: gali pasireikšti iki 1 iš 100 žmonių

Alerginės odos reakcijos.

Didelės dozės gali sukelti skrandžio sutrikimus, tokius kaip pykinimas, vėmimas ir viduriavimas.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku arba slaugytoju. Tai apima bet kokią galimą šalutinį poveikį, nenurodytą šiame lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį tiesiogiai per nacionalinę pranešimų sistemą, nurodytą V priede. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Nystatin Orifarm

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Neatidaryta buteliukas: Laikyti žemiau 25°C.

Atidaryta buteliukas: Laikyti žemiau 25°C iki 2 mėnesių.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam etiketėje po EXP. Tinkamumo laikas nurodo paskutinę to mėnesio dieną.

Nesunaikinkite vaistų per nuotekas ar buitinių atliekų konteinerį. Paklauskite savo vaistininko, kaip sunaikinti vaistus, kurių nebenaudojate. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kas yra Nystatin Orifarm sudėtyje

- Veiklioji medžiaga yra nistatinas. 1 ml suspensijos yra 100 000 tarptautinių vienetų (TV) nistatino.
- The kitos sudedamosios dalys yra:

ksilitolis
karmeliozė natris
metilas parahidroksibenzoatas (E218)
pipirmėčių aliejus
išgrynintas vanduo
natrio hidroksidas (pH reguliavimui)
druskos rūgštis (pH reguliavimui).

Geriamoji suspensija saldinta ksilitoliu.

Kas yra Nystatin Orifarm išvaizda ir pakuotės turinys

Nystatin Orifarm geriamoji suspensija yra geltona ir mėtų skonio ir tiekama 100 ml gintaro spalvos stiklo buteliuose.

Rinkodaros leidimoturėtojas ir gamintojas [Užpildyti nacionaliniu lygmeniu]

Šis vaistinis preparatas yra

registruotas ES valstybėse narėse EEE pagal šiuos pavadinimus: Švedija, Islandija, Suomija,

Danija ir Norvegija: Nystatin

Orifarm Orifarm

Šis lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2025-04-16