

Prospect: Informații pentru utilizator

Nistatină Orifarm 100000 UI/ml suspensie orală

nistatină

Citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați-vă medicului, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament v-a fost prescris numai dumneavoastră. Nu-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă simptomele lor sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
- Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul, farmacistul sau asistenta medicală. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce conține acest prospect

1. Ce este Nistatină Orifarm și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Nistatină Orifarm
3. Cum să luați Nystatin Orifarm
4. Posibile efecte secundare
5. Cum să păstrați Nystatin Orifarm
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Nystatin Orifarm și pentru ce se utilizează

Nystatin Orifarm face parte din grupul medicamentelor antifungice. Conține substanța activă nistatină. Are un efect local asupra mucoasei și nu este absorbit în organism.

Nystatin Orifarm este utilizat pentru a trata infecțiile fungice din gură și intestine.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Nystatin Orifarm

Nu luați Nystatin Orifarm

- dacă sunteți alergic la nistatină sau la oricare dintre celelalte ingrediente ale acestui medicament (enumerat în secțiunea 6).

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a lua Nystatin Orifarm

Alte medicamente și Nystatin Orifarm

Informați medicul sau farmacistul dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil, cereți sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament.

Sarcina

Ar trebui să luați acest medicament doar dacă medicul dumneavoastră consideră că beneficiile pentru dumneavoastră depășesc riscul potențial pentru făt.

Nu se știe dacă

Nystatin Nistatină Orifarm trece în laptele matern. Consultați medicul înainte de a alăpta în timp ce luați acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există efecte cunoscute ale acestui medicament asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Nistatină Orifarm conține conține metil parahidroxibenzoat și sodiu Metil parahidroxibenzoat poate provoca reacții alergice (posibil întârziate).

Acest produs medicamentos conține 1,2 mg sodiu per ml suspensie orală, ceea ce este mai puțin de 23 mg per doză, adică practic „fără sodiu”.

3. Cum să luați Nistatină Orifarm

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Verificați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul sau dentistul dumneavoastră decide doza și aceasta va fi individualizată pentru tine.

Flaconul trebuie agitat bine înainte de utilizare.

Infecție fungică a cavității bucale: Doza recomandată pentru adulți este de 1 ml, de 4 ori pe zi. Luați suspensia de preferință după mese și păstrați-o în gură cât mai mult timp posibil înainte de a o înghiți.

Utilizare la copii, sugari și nou-născuți

Doza recomandată pentru copii (peste 2 ani), sugari (de la 1 lună la 2 ani) și nou-născuți (de la naștere la 1 lună) este de 1 ml, de 4 ori pe zi. Suspensia trebuie luată de preferință după mese și păstrată în gură cât mai mult timp posibil înainte de a o înghiți. Pentru sugari, suspensia poate fi administrată în picături sau diluată cu puțină apă și aplicată în gură.

Infecție fungică a intestinului: Doza recomandată pentru adulți este de 5 ml de 3 ori pe zi. Înghițiți suspensia direct. Pentru a evita revenirea infecției, ar trebui să continuați tratamentul timp de 2-3 zile după ce toate semnele infecției au dispărut.

Utilizare la copii și sugari

Doza recomandată pentru copii (peste 2 ani) și sugari (1 lună până la 2 ani) este de 1 ml, de 4 ori pe zi. Înghițiți suspensia direct. Pentru a evita revenirea infecției, ar trebui să continuați tratamentul timp de 2-3 zile după ce toate semnele infecției au dispărut.

Dacă utilizați mai mult Nystatin Orifarm decât ar trebui

Dacă ați utilizat prea mult sau un copil a luat medicamentul din greșeală, contactați medicul sau unitatea de urgență pentru evaluarea riscului și sfaturi.

Dacă uitați să utilizați Nystatin Orifarm

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, întrebați medicul, farmacistul sau asistenta.

4. Posibile efecte secundare

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca efecte secundare, deși nu toată lumea le manifestă.

Opriti administrarea Nystatin Orifarm și spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă dezvoltăți oricare dintre aceste simptome:

Modificări grave ale pielii și mucoaselor (așa-numitul sindrom Stevens-Johnson).

Acesta este un efect secundar rar și poate afecta până la 1 din 1000 de persoane.

Reacții de hipersensibilitate și umflături locale ale pielii (angioedem), o reacție în care fața și gâtul se pot umfla considerabil.

Reacțiile de hipersensibilitate la acest medicament sunt efecte secundare foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 de persoane) sau necunoscute (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile).

O erupție cutanată roșie, solzoasă, extinsă, cu umflături sub piele și vezicule însoțite de febră. Simptomele apar de obicei la inițierea tratamentului (pustuloză exantematoasă acută generalizată). Frecvența nu poate nu poate Mai puțin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 de persoane

Reacții alergice ale pielii.

Dozele mari pot provoca disconfort gastric, cum ar fi greață, vărsături și

Doze mari pot provoca tulburări stomacale, cum ar fi greață, vărsături și ..

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistentul medical. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemul național de raportare menționat în Anexa V. Prin raportarea reacțiilor adverse, puteți ajuta la furnizarea de informații suplimentare despre siguranța acestui medicament.

5. Cum să păstrați Nystatin Orifarm

A nu se lăsa acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Flacon nedeschis: A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Flacon deschis: A se păstra la temperaturi sub 25°C timp de până la 2 luni.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a deșeurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Nystatin Orifarm conține

- Substanța activă este nistatină. 1 ml de suspensie conține 100.000 Unități Internaționale (UI) de nistatină.
 - The alte ingrediente sunt:
 - xilitol
 - carmeloză sodiu
 - metil parahidroxibenzoat (E218)
 - ulei de mentă
 - apăpurificată
 - hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).
- Suspensia orală este îndulcită cu xilitol.

Cum arată Nystatin

Orifarm și conținutul ambalajului Nystatin

Orifarm Orifarm suspensia orală este galbenă și cu aromă de mentă aromatizată și vine în flacoane de sticlă chihlimbar de 100 ml.

Marketing Autorizație Deținător și Producător
[A se completa la nivel național]

Acest produs medicamentos este autorizat în Statele Membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Suedia, Islanda, Finlanda, Danemarca și Norvegia: Nystatin Orifarm

Acest prospect a fost revizuit ultima dată la 2025-04-16