

Bipacksedel: Information till användaren

Nystatin Orifarm 100000 IE/ml oral suspension

nystatin

Läs hela denna bipacksedel noggrant innan du börjar ta detta läkemedel eftersom det innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om deras symtom är desamma som dina.
- Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4. Vad denna bipacksedel innehåller

Vad Nystatin

1. Orifarm är och vad det används för Vad du behöver veta innan du tar Nystatin
2. Vad du behöver veta innan du tar Nystatin Orifarm
3. Hur du tar Nystatin Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur du förvarar Nystatin Orifarm
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad Nystatin Orifarm är och vad det används för

Nystatin Orifarm tillhör gruppen av svampdödande läkemedel. Det innehåller den aktiva substansen nystatin. Det har en lokal effekt på slemhinnan och absorberas inte i kroppen.

Nystatin Orifarm används för att behandla svampinfektioner i munnen och tarmarna.

2. Vad du behöver veta innan du tar Nystatin Orifarm

Ta inte Nystatin Orifarm

- om du är allergisk mot nystatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Nystatin Orifarm

Andra läkemedel och Nystatin Orifarm

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Du bör endast ta detta läkemedel om din läkare finner att fördelarna för dig överväger den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är inte känt om Nystatin Orifarm passerar över i bröstmjolk. Rådfråga din läkare innan du ammar medan du tar denna medicin.

Körning och användning av maskiner

Det finns ingen känd effekt av denna medicin på förmågan att köra eller använda maskiner.

Nystatin Orifarm innehåller innehåller metyl parahydroxibensoat och natrium Metyl parahydroxibensoat kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda). Denna medicinska produkt innehåller 1,2 mg natrium per ml oral suspension, vilket är mindre än 23 mg per dos, dvs. i princip "natriumfri".

3. Hur man tar Nystatin Orifarm

Ta alltid denna medicin exakt som din läkare eller apotekare har sagt till dig. Kontrollera med din läkare eller apotekare om du är osäker.

Din läkare eller tandläkare bestämmer dosen och den kommer att vara individualiserad för dig.

Flaskan ska skakas väl före användning.

Svampinfektion i munhålan: Den rekommenderade dosen för vuxna är 1 ml, 4 gånger dagligen. Ta suspensionen helst efter måltider och håll den i munnen så länge som möjligt innan du sväljer.

Användning hos barn, spädbarn och nyfödda

Den rekommenderade dosen för barn (över 2 år), spädbarn (från 1 månad till 2 år) och nyfödda (från födsel till 1 månad) är 1 ml, 4 gånger dagligen. Suspensionen bör helst tas efter måltider och hållas i munnen så länge som möjligt innan den sväljs. För spädbarn kan suspensionen ges i droppar eller spädas med lite vatten och penslas i munnen.

Svampinfektion i tarmen: Den rekommenderade dosen för vuxna är 5 ml 3 gånger dagligen. Svälj suspensionen direkt. För att undvika att infektionen återkommer bör du fortsätta behandlingen i 2-3 dagar efter att alla tecken på infektion har försvunnit.

Användning hos barn och spädbarn

Den rekommenderade dosen för barn (över 2 år) och spädbarn (1 månad till 2 år) är 1 ml, 4 gånger dagligen. Svälj suspensionen direkt. För att undvika att infektionen återkommer bör du fortsätta behandlingen i 2-3 dagar efter att alla tecken på infektion har försvunnit.

Om du använder mer Nystatin Orifarm än du borde

Om du har använt för mycket eller om ett barn har tagit medicinen av misstag, kontakta din läkare eller akutmottagning för bedömning av risken och råd.

Om du glömmer att använda Nystatin Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om användningen av denna medicin, fråga din läkare, apotekare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Nystatin Orifarm och kontakta din läkare omedelbart om du utvecklar något av dessa symtom:

Allvarliga hud- och slemhinneförändringar (så kallat Stevens-Johnsons syndrom).

Detta är en sällsynt biverkning och kan påverka upp till 1 av 1000 personer.

Överkänslighetsreaktioner och lokal hudsvullnad (angioödem), en reaktion där ansiktet och halsen kan svälla avsevärt.

Överkänslighetsreaktioner från denna medicin är mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer) eller okända (frekvens kan inte uppskattas från tillgängliga data).

Ett rött, fjällande utbrett utslag med knölar under huden och blåsor åtföljt av feber.

Symtomen uppträder vanligtvis vid behandlingsstart (akut generaliserad exantematös pustulos). Frekvensen kan inte uppskattas från tillgängliga data.

Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 personer

Allergiska hudreaktioner.

Höga doser kan orsaka magbesvär såsom illamående, kräkningar och diarré.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella möjliga biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet som anges i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur du förvarar Nystatin Orifarm

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Oöppnad flaska: Förvara under 25°C.

Öppnad flaska: Förvara under 25°C i upp till 2 månader.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet avser sista dagen i den månaden.

Kasta inte läkemedel i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga din apotekare hur du ska kasta läkemedel som du inte längre använder. Dessa åtgärder hjälper till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Nystatin Orifarm innehåller

- Den aktiva substansen är nystatin. 1 ml suspension innehåller 100 000 internationella enheter (IE) nystatin.
- Den andra ingredienser är:
 - xylitol
 - karmellos natrium
 - metyl parahydroxbensoat (E218)
 - pepparmyntsolja
 - renat vattenrenat vatten
 - natriumhydroxid (för pH-justering)natriumhydroxid (för pH-justering)
 - saltsyra (för pH-justering).

Den orala suspensionen är sötad med xylitol.

Vad Nystatin Orifarm ser ut som och innehåll i förpackningen
Nystatin Orifarm oral suspension är gul och mint smak och kommer i 100 ml bärnstensfärgade glasflaskor.

Marknadsföring Tillståndsinnehavare och tillverkare [Kommer att fyllas i nationellt]
Denna medicinska produkt är

godkänd i medlemsstaterna i EEA under följande namn: Sverige, Island, Finland, Danmark och Norge: Nystatin
Orifarm Orifarm

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-04-16