

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ozempic 0,25 mg süstelahus eeltäidetud süstlas  
semaglutiid

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Ozempicu toimeaine on semaglutiid. See aitab teie kehal vähendada veresuhkru taset ainult siis, kui veresuhkur on liiga kõrge, ja see võib aidata ennetada südamehaigusi 2. tüüpi diabeediga patsientidel. Samuti võib see aidata aeglustada neerufunktsiooni halvenemist 2. tüüpi diabeediga patsientidel viisil, mis ületab ainult veresuhkru taseme alandamise.

Ozempicut kasutatakse täiskasvanute (alates 18-aastased ja vanemad) 2. tüüpi diabeedi raviks, kui dieet ja kehaline aktiivsus ei ole piisavad:

ainuravina – kui te ei tohi kasutada metformiini (teine diabeediravim) või koos teiste diabeediravimitega – kui need ei ole piisavad teie veresuhkru taseme reguleerimiseks. Need võivad olla ravimid, mida te võtate suu kaudu (oraalselt) või süstite, nagu insuliin.

On oluline, et jätkate oma dieedi ja kehalise tegevusega nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile öelnud.

2. Millal te ei tohi seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal te ei tohi seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist.

See ravim ei ole sama mis insuliin ja te ei tohi seda kasutada, kui:

teil on 1. tüüpi diabeet – seisund, kus teie keha ei tooda insuliini  
teil on tekkinud diabeetiline ketoatsidoos – diabeedi tüsistus, mille korral on kõrge veresuhkur, hingamisraskused, segasus, liigne janu, magus lõhn hingeõhus või magus või metallimaitse suus.

Ozempic ei ole insuliin ja seetõttu ei tohi seda kasutada insuliini asendajana.

Kui te teate, et peate läbima operatsiooni, mille käigus teid hoitakse narkoosis (unes), rääkige oma arstile, et kasutate Ozempic'ut.

### Mõjud seedesüsteemile

Selle ravimiga ravi ajal võib teil esineda iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust. Need kõrvaltoimed võivad põhjustada dehüdratsiooni (vedelikukaotust). On oluline, et te joote palju, et vältida dehüdratsiooni. See on eriti oluline, kui teil on neeruprobleeme. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on küsimusi või muresid.

Tõsine ja püsiv kõhuvalu, mis võib olla ägeda pankreatiidi tagajärg

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil on tõsine ja püsiv valu kõhupiirkonnas. See võib viidata ägedale pankreatiidile (põletikuline kõhunäär). Vaadake jaotist 4, et saada teavet põletikulise kõhunäärme hoiatavate sümptomite kohta.

### Madal veresuhkur (hüpoglükeemia)

Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib see suurendada madala veresuhkru (hüpoglükeemia) riski. Vaadake jaotist 4, et saada teavet madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Teie arst võib paluda teil kontrollida oma veresuhkru taset. See aitab teie arstil otsustada, kas sulfonüüluurea derivaadi või insuliini annust tuleb kohandada, et vähendada madala veresuhkru riski.

### Diabeetiline silmahaigus (retinopaatia)

Kui teil on diabeedist tingitud silmahaigus ja te kasutate insuliini, võib see ravim põhjustada teie nägemise halvenemist, mis võib vajada ravi. Teavitage oma arsti, kui teil on diabeetiline silmahaigus või kui teil tekivad selle ravimiga ravi ajal silmaprobleemid. Kui teil on võimalik ebastabiilne diabeetiline silmahaigus, ei ole Ozempic 2 mg kasutamine soovitatav.

### Äkilised muutused teie nägemises

Kui te ravi ajal selle ravimiga äkki ei näe midagi või nägemine halveneb kiiresti, võtke kohe ühendust oma arstiga. See võib olla põhjustatud väga haruldasest kõrvaltoimest, mida nimetatakse mittearteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optilise neuropaatia (NAION) (vt lõik 4: Tõsised kõrvaltoimed). Teie arst võib suunata teid silmauuringule ja võib-olla peate lõpetama selle ravimiga ravi.

### Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Seda ravimit ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel alla 18 aasta, kuna selle vanuserühma ohutus ja efektiivsus ei ole veel kindlaks tehtud.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Ozempic'ule veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka taimsete ravimite või teiste retseptita ostetud ravimite kohta.

Rääkige oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele eriti siis, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad ühte järgmistest toimeainetest:

Varfariin või teised sarnased suu kaudu manustatavad ravimid, mis takistavad vere hüübimist (suukaudsed antikoagulandid). Teie verd võib-olla tuleb sagedamini testida, et kontrollida, kui kiiresti teie veri hüübib.

Või kui te kasutate insuliini. Teie arst ütleb teile, kuidas insuliini annust vähendada ja soovib teil sagedamini kontrollida oma veresuhkru taset, et vältida hüperglükeemiat (kõrge veresuhkur) ja diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, mis tekib, kui keha ei suuda glükoosi lagundada, kuna insuliini on ebapiisavalt).

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate, et võite olla rase, soovite raseduda või toidate last rinnaga? Võtke siis enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna ei ole teada, kas see on kahjulik sündimata lapsele. Seetõttu on soovitatav kasutada rasedumisvastaseid vahendeid selle ravimi kasutamise ajal. Kui soovite raseduda, arutage oma arstiga, kuidas ravi kohandada, kuna peate selle ravimi kasutamise lõpetama vähemalt 2 kuud ette. Kui rasedute selle ravimi kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga, sest teie ravi tuleb muuta.

Ärge kasutage seda ravimit, kui toidate last rinnaga, kuna ei ole teada, kas see satub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

On ebatõenäoline, et Ozempic mõjutab teie autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet. Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib teil tekkida madal veresuhkur (hüpoglükeemia), mis võib vähendada teie keskendumisvõimet. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui teil esinevad madala veresuhkru sümptomid. Vaadake lõik 2 'Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?' teabe saamiseks suurenenud madala veresuhkru riski kohta ja lõik 4 madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma arstiga.

Ozempic sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

### 3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju seda ravimit ma pean kasutama?

Algannus on 0,25 mg üks kord nädalas, nelja nädala jooksul.

Pärast nelja nädalat suurendab teie arst annust 0,5 mg-ni üks kord nädalas.

Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 0,5 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 1 mg-ni üks kord nädalas.

Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 1 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 2 mg-ni üks kord nädalas.

Ärge muutke oma annust, kui arst pole seda teile öelnud.

Kuidas seda ravimit manustatakse?

Ozempic manustatakse nahaaluse süstina (subkutaanne süst). Ärge süstige seda veeni ega lihasesse.

Parimad kohad süstimiseks on teie reite esikülg, keskkoha esikülg (kõht) või õlavars.

Enne kui kasutate pliiatsit esimest korda, näitab teie arst või õde, kuidas pliiatsit kasutada.

Üksikasjalikud kasutusjuhised leiate selle infolehe tagaküljelt.

Millal seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit üks kord nädalas, võimalusel iga nädal samal päeval.

Võite end süstida igal ajal päeval – sõltumata söögikordadest.

Et aidata teil meeles pidada, et süstite seda ravimit ainult üks kord nädalas, on soovitatav märkida valitud nädalapäev (näiteks kolmapäev) karbile ja iga kord, kui olete selle ravimi süstinud, kirjutada kuupäev karbile.

Vajadusel võite muuta oma iganädalase süsti päeva, kui see on vähemalt 3 päeva pärast teie viimast süsti. Pärast uue annustamispäeva valimist tuleb annustamist jätkata üks kord nädalas.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui olete kasutanud rohkem Ozempic'it kui peaks. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu iiveldus.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?

Kui unustate annuse süstida ja:

kui Ozempic'i oleks pidanud kasutama 5 päeva või vähem tagasi, kasutage seda kohe, kui meelde tuleb. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

kui Ozempic'i oleks pidanud kasutama rohkem kui 5 päeva tagasi, jätke vahele jäänud annus vahele. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

Ärge kasutage kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga konsulteerimata. Kui lõpetate kasutamise, võib teie veresuhkru tase tõusta.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

#### Tõsised kõrvaltoimed

Sageli (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10-st)

diabeetilise silmahaiguse tüsistused (retinopaatia) – rääkige oma arstile, kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal silmaprobleemid, nagu nägemise muutused.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l inimesel 100-st)

kõhunäärme põletik (äge pankreatiit), mis võib põhjustada tugevat püsivat valu kõhus ja seljas. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 1 000-st)

tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem). Otsige kohe meditsiinilist abi ja teavitage oma arsti nii kiiresti kui võimalik, kui teil tekivad sümptomid nagu hingamisraskused, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, neelamisraskused ja kiire südametegevus.

Väga harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)

silmahaigus nimega mittearteriiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia (NAION), mis võib põhjustada, et te näete ühe silmaga vähem või üldse mitte, ilma igasuguse valuta. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate, et te ei näe äkki midagi või näete aeglaselt halvemini (vt jaotis 2: 'Äkilised muutused teie nägemises').

Pole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

Soole ummistus. Tõsine ummistuse vorm, millega kaasnevad sümptomid nagu kõhuvalu, puhitus, oksendamine jne.

#### Muud kõrvaltoimed

Väga sageli (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10-st)

iiveldus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast  
kõhulahtisus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast  
madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliini sisaldavate ravimitega

Sageli (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10-st)

oksendamine  
madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos teiste suukaudsete diabeediravimitega, mis ei sisalda sulfonüüluurea derivaate või insuliini

Madal veresuhkur võib tekkida ootamatult. Selle sümptomiteks võivad olla: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, kiire südametegevus, iiveldus või tugev nälgitunne, nägemise muutused, unisus või nõrkus, närvilisus, ärevus või segadus, keskendumisraskused või värisemine.

Teie arst ütleb teile, kuidas madalat veresuhkrut ravida ja mida teha, kui teil need hoiatusmärgid ilmnevad.

Madal veresuhkur tekib tõenäolisemalt, kui kasutate ka sulfonüüluurea derivaate või insuliini. Teie arst võib nende ravimite annust vähendada enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.

seedehäired (düspepsia)  
põletikuline magu (gastriit) – sümptomiteks on muu hulgas kõhuvalu, iiveldus või oksendamine  
refluks või kõrvetised – tundud ka kui gastroösofageaalne reflukshaigus (GORD)  
kõhuvalu  
kõhupuhitus  
kõhukinnisus  
rõhitsemine  
sapikivid  
pearinglus  
väsimus  
kaalulangus  
vähenenud söögiisu  
gaaside teke (kõhupuhitus)  
kõhunäärmeensüümide tõusja (nagu lipaas ja amülaas)  
peavalu.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l inimesel 100-st)  
toit või jook maitseb erinevalt kui tavaliselt  
kiire pulss  
süstekoha reaktsioonid – nagu verevalumid, valu, ärritus, sügelus ja nahalööve  
allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, sügelus või nõgestõbi  
toit püsib maos kauem kui tavaliselt (aeglustunud mao tühjenemine).

#### Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

#### 5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pliiatsi etiketil ja karbil pärast EXP. Seal on märgitud kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja viimane päev.

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis (2°C–8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida eemal külmaelemendist. Hoidke pliiatsi kork pliiatsil, et kaitsta seda valguse eest.

Pärast esmakordset kasutamist:

Kui hoiate pliiatsit alla 30°C või külmkapis (2°C–8°C) (mitte külmaelemendi lähedal), võite seda säilitada 6 nädalat. Ozempicut ei tohi hoida sügavkülmas. Kui ravim on külmunud, ei tohi seda enam kasutada.

Hoidke pliiatsit, kui te seda ei kasuta, koos pliiatsikorgiga, et kaitsta seda valguse eest.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus ei ole selge ja värvitu või peaaegu värvitu.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsi oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on semaglutiid. Üks ml süstelahust sisaldab 1,34 mg semaglutiidi. Üks eeltäidetud pliiats sisaldab 2 mg semaglutiidi 1,5 ml lahuses. Iga annus sisaldab 0,25 mg semaglutiidi 0,19 ml-s.

Selle ravimi muud ained on: dinaatriumfosfaatdihüdraat, propüleenglükool, fenool, süstevesi, soolhape/naatriumhüdrosiid (pH kohandamiseks). Vaadake ka jaotist 2, 'Ozempic sisaldab naatriumi'.

Kuidas Ozempic välja näeb ja kui palju on pakendis?

Ozempic on selge ja värvitu või peaaegu värvitu süstelahus eeltäidetud pliiatsis. Iga eeltäidetud pliiats sisaldab 1,5 ml lahust, mis on ette nähtud 4 annuseks 0,25 mg.

Ozempic 0,25 mg süstelahus on saadaval järgmises pakendisuuruses: 1 pliiats ja 4 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela.

Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud

Muud teabeallikad

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa Raviameti veebisaidilt:

<http://www.ema.europa.eu>.

Kasutusjuhised

Ozempic 0,25 mg lahus süstimiseks eeltäidetud süstlas  
semaglutiid

Juhised Ozempic 0,25 mg süstelahuse kasutamiseks eeltäidetud süstlas

Lugege neid juhiseid hoolikalt enne Ozempic eeltäidetud süstla kasutamist.

Arutage oma arsti, õe või apteekriga, kuidas Ozempic'it õigesti süstida.

Kasutage selle süstla ravimit ainult ettenähtud viisil.

Alustage oma süstla kontrollimisest, et veenduda, et see sisaldab Ozempic 0,25 mg. Seejärel vaadake allolevaid pilte, et tutvuda oma süstla ja nõela erinevate osadega.

Kui olete pime või vaegnägija ja ei saa süstla annuse akent lugeda, ärge kasutage seda süstalt ilma abita. Paluge abi inimeselt, kellel on hea nägemine ja kes teab, kuidas Ozempic eeltäidetud süstalt kasutada.

Teie süstal on eeltäidetud süstal pööratava annuse seadistamise nupuga. Süstal sisaldab 2 mg semaglutiidi ja saate valida ainult

0,25 mg annuseid. Üks kasutamata süstal sisaldab neli 0,25 mg annust. Pärast nende nelja annuse süstimist jääb süstlasse veel lahust. Süstal tuleb ära visata.

Kasutage karbi kaane siseküljel olevat tabelit, et jälgida, mitu süsti olete teinud ja millal olete süstid teinud.

Teie süstal on mõeldud kasutamiseks 30G, 31G ja 32G ühekordselt kasutatavate nõeltega, mille maksimaalne pikkus on 8 mm.

NovoFine Plus nõelad on pakendis kaasas.

#### Oluline teave

Pöörake nendele märkustele erilist tähelepanu, kuna need on olulised süstla ohutuks kasutamiseks.

#### 1. Vahetage oma pliiatsil nõel

Kontrollige oma pliiatsi nime ja värvilist etiketti, et veenduda, et see sisaldab Ozempic 0,25 mg. See on eriti oluline, kui kasutate rohkem kui ühte tüüpi süstitavat ravimit. Vale ravimi kasutamine võib olla teie tervisele kahjulik.

Eemaldage pliiatsi kork.

Kontrollige, kas pliiatsis olev lahus on selge ja värvitu. Vaadake läbi pliiatsi akna. Kui lahus tundub hägune või värviline, ei tohi te pliiatsit kasutada.

Võtke uus nõel.

Kontrollige paberist katteplaati ja välimist nõelakorki kahjustuste suhtes, need võivad mõjutada steriilsust. Kasutage uut nõela, kui on näha mingeid kahjustusi.

Eemaldage paberist katteplaat.

Veenduge, et kinnitate nõela õigesti.

Suruge nõel otse pliiatsile.

Keerake see kinni.

Nõelal on nõelakork ja nõelakate. Te peate mõlemad eemaldama. Kui te ei eemalda mõlemat, siis te lahust ei süsti.

Eemaldage välimine nõelakork ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks. Teil on seda vaja pärast süstimist, et nõel pliiatsilt ohutult eemaldada.

Eemaldage sisemine nõelakate ja visake see ära. Kui proovite seda tagasi panna, võite end kogemata nõelaga torgata.

Nõela otsas võib ilmuda tilk lahust. See on normaalne, kuid peate siiski kontrollima voolu, kui kasutate uut pliiatsit esimest korda. Vaadake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu'.

Kinnitage uus nõel pliiatsile alles siis, kui olete valmis süsti tegema.

Kasutage iga süsti jaoks alati uut nõela. Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, nakkust, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Ärge kunagi kasutage kõverat või kahjustatud nõela.

## 2. Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu

Kui teie pliiats on juba kasutusel, minge edasi 3. sammu juurde 'Teie annuse seadistamine'. Kontrollige voolu ainult enne iga uue pliiatsi esimest süsti. Pöörake annuse seadistusnuppukontrolljoonele (\*\* =) kohe pärast '0'. Kontrollige, et kontrolljoon oleks annuse näidikunoolega ühel joonel.

Hoidke pliiatsit nõelaga ülespoole suunatuna.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all, kuni annuse näidikuaken näitab taas '0'. Number '0' peab olema annuse näidikunoolega ühel joonel. Nõela otsa peab ilmuma tilk lahust.

Nõela otsa võib jääda väike tilk, kuid seda ei süstita. Kui tilka ei ilmu, korrake 2. sammu 'Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu' maksimaalselt 6 korda. Kui tilka ikka ei ilmu, vahetage nõel ja korrake 2. sammu 'Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu' veel kord. Visake pliiats ära ja kasutage uut, kui lahuse tilka ikka ei ilmu.

Kontrollige alati, et nõela otsa ilmuks tilk, enne kui kasutate uut pliiatsit esimest korda. Nii olete kindel, et lahus voolab. Kui tilka ei ilmu, ei süsti te ravimit, isegi kui annuse näidikuaknas ilmub mõni muu number. See võib viidata ummistunud või kahjustatud nõelale. Kui te ei kontrolli voolu enne iga uue pliiatsi esimest süsti, ei pruugi te saada ettenähtud annust ja Ozempicu soovitud toime võib puududa. 3. Teie annuse seadistamine

Pöörake annuse seadistusnuppu, et seada 0,25 mg.

Jätkake pöörämist, kuni annuse näidikuaken peatub ja näitab 0,25 mg.

Ainult annuse näidikuaken ja annuse näidikunool näitavad, et 0,25 mg on seadistatud.

Saate seadistada ainult 0,25 mg annuse kohta. Annuse seadistusnupp teeb teistsugust klõpsuheli, kui seda pöörata edasi, tagasi või mööda 0,25 mg. Ärge loendage pliiatsi klõpse.

Enne selle ravimi süstimist kasutage alati annuse näidikuakent ja annuse näidikunoole, et näha, et 0,25 mg on seadistatud. Ärge loendage pliiatsi klõpse. Annuse seadistusnupuga saab seadistada ainult 0,25 mg annuseid. 0,25 mg peab olema täpselt annuse näidikunoolega ühel joonel, et olla kindel, et saate õige annuse.

Enne kui te seda ravimit süstite, kasutage alati annuse akent ja annuse näidikunoole, et näha, et on seadistatud 0,25 mg. Ärge loendage pliiatsi klikke. Ainult 0,25 mg annuseid saab seadistada annuse seadistusnupuga. 0,25 mg peab olema täpselt ühel joonel annuse näidikunoolega, et olla kindel, et saate õige annuse.

Torkake nõel oma nahka nii, nagu arst või õde teile on näidanud.

Veenduge, et näete annuse näidikuakent. Ärge katke seda sõrmedega. See võib süsti katkestada.

Veenduge, et näete annuse akna. Ärge katke seda sõrmedega. See võib süstimist katkestada.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all.

Vaadake, kuidas annuseakna näitaja naaseb tagasi '0' peale. Number '0' peab olema joondatud annuse noolega. Võite kuulda või tunda klõpsu.

Hoidke manustamisnuppu all, kui hoiate nõela oma nahas..

Lugege aeglaselt kuue-ni, hoides manustamisnuppu all.

Kui nõel eemaldatakse nahast varem, võite näha, kuidas lahuse jugake nõelaotsast välja tuleb. Sel juhul ei ole kogu annust süstitud.

Eemaldage nõel oma nahast. Seejärel võite manustamisnupu vabastada.

Kui süstekoht hakkab veritsema, vajutage sellele õrnalt.

Pärast süstimist võite näha nõelaotsal lahuse tilka. See on normaalne ja ei mõjuta teie annust.

Vaadake alati annuseakent, et teada saada, kui palju mg te süstite. Hoidke manustamisnuppu all, kuni annuseaken naaseb tagasi '0' peale.

Kuidas ära tundaummistunud või kahjustatud nõela

- Kui pärast manustamisnupu pidevat vajutamist ei naase annuseaken '0' peale, olete võib-olla kasutanud ummistunudvõi kahjustatud nõela.
- Sel juhul ei ole te ravimit saanud, isegi kui annuseakna number on muutunud võrreldes algselt seatud annusega. Kuidas toimida ummistunud

nõela korrald

Vahetage nõel vastavalt juhiste jaotises 5 'Pärast süstimist' ja korrake kõiki samme alates sammust 1 'Pange oma pliiatsile uus nõel'. Veenduge, et määrate vajaliku koguannuse.annus, mida vajate.

Ärge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

## 5. Pärast süstimist

Eemaldage alati nõel pärast iga süstimist ja visake see ära, et hõlbustada süstimist ja vältida nõela ummistumist. Kui nõel on ummistunud, ei süstita ravimit.

Asetage välimine nõelakate tasasele pinnale ja juhtige nõel sinna sisse, ilma et puudutaksite nõela või katet oma sõrmedega.

Kui nõel on kaetud, vajutage ettevaatlikult välimine nõelakate täielikult nõelale. Keerake nõel lahti ja visake see hoolikalt ära vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Asetage pliiatsikork pärast iga kasutamist tagasi pliiatsile, et kaitsta lahust valguse eest.

Kui pliiats tuleb ära visata, tehke seda ilma nõelata vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Ärge kunagi proovige sisemist nõelakatet tagasi nõelale panna. Võite end nõelaga torgata. Võite end nõelaga torgata.

Eemaldage alati kohe nõel oma pliiatsilt pärast iga süstimist.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

#### Muud olulised andmed

Hoidke oma pliiats ja nõelad alati teiste, eriti laste, silma alt ja käeulatuses eemal.

Ärge kunagi jagage oma pliiatsit või nõelu teiste inimestega.

Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitlemisel olema väga ettevaatlikud, et vältida torkeõnnetusi ja ristinfektsiooni.

#### Hoolitsege oma pliiatsi eest

Käsitsege oma pliiatsit hoolikalt. Karm käsitlemine või vale kasutamine võib põhjustada ebatäpse doseerimise. Sel juhul võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke pliiatsit autosse või muusse kohta, kus see võib olla liiga soe või liiga külm. Külmunud Ozempic'ut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib ravimi soovitud toime puududa.

Otsese päikesevalguse käes olnud Ozempic'ut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke oma pliiatsitolmu, mustuse või niiskuse kätte.

Ärge peske, kastke ega määrige oma pliiatsit. Pliiatsit võib puhastada niiske lapiga, millele on pandud kergelt nõudepesuvahendit. Ravimit niiskele lapile.

Ärge laske oma pliiatsil kukkuda või kõvale pinnale lüüa. Kui pliiats kukub või kahtlustate probleemi, peate paigaldama uue nõela ja kontrollima voolu enne süstimist.

Ärge proovige oma pliiatsit uuesti täita.

Ärge proovige oma pliiatsit parandada ega lahti võtta.