

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Ozempic 0,25 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä  
semaglutidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Jos saat jonkin haittavaikutuksen, joka mainitaan kohdassa 4, tai haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mikä Ozempic on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä Ozempic on ja mihin sitä käytetään?

Ozempicin vaikuttava aine on semaglutidi. Se auttaa kehoasi alentamaan verensokeritasoa vain silloin, kun verensokeri on liian korkea, ja se voi auttaa estämään sydänsairauksia tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Se voi myös auttaa hidastamaan munuaisten toiminnan heikkenemistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla tavalla, joka menee pidemmälle kuin pelkkä verensokerin alentaminen.

Ozempicia käytetään aikuisten (18-vuotiaiden ja sitä vanhempien) tyypin 2 diabeteksen hoitoon, kun ruokavalio ja liikunta eivät riitä:

itsenäisenä hoitona – kun et voi käyttää metformiinia (toinen diabeteslääke) tai muiden diabeteslääkkeiden kanssa – jos ne eivät riitä säätämään verensokeritasojasi. Nämä voivat olla lääkkeitä, jotka otat suun kautta (oraalisesti) tai injektioit, kuten insuliini.

On tärkeää, että jatkat ruokavaliotasi ja liikuntaa lääkärisi, apteekkarisi tai sairaanhoitajasi ohjeiden mukaisesti.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääke ei ole sama kuin insuliini, eikä sitä saa käyttää, jos:

sinulla on tyypin 1 diabetes – tila, jossa kehosi ei tuota insuliinia  
olet kehittänyt diabeettisen ketoasidoosin – diabeteksen komplikaatio, johon liittyy korkea verensokeri, hengitysvaikeudet, sekavuus, liiallinen jano, makealta tuoksuva hengitys tai makea tai metallinen maku suussa.

Ozempic ei ole insuliini, eikä sitä saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Jos tiedät, että sinulle tehdään leikkaus, jossa sinut pidetään nukutettuna (unessa), kerro lääkärillesi, että käytät Ozempicia.

Vaikutukset ruoansulatuskanavaan

Tämän lääkkeen käytön aikana voit kokea pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Nämä haittavaikutukset voivat aiheuttaa kuivumista (nestehukkaa). On tärkeää juoda runsaasti kuivumisen estämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on munuaisongelmia. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on kysymyksiä tai olet huolissasi.

Vakava ja jatkuva vatsakipu, joka voi johtua akuutista haimatulehduksesta

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on vakavaa ja jatkuvaa kipua vatsan alueella. Tämä voi viitata akuuttiin haimatulehdukseen (tulehtunut haima). Katso kohta 4 haimatulehduksen varoituseireista.

Matala verensokeri (hypoglykemia)

Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, se voi lisätä matalan verensokerin (hypoglykemian) riskiä. Katso kohta 4 matalan verensokerin varoituseireista. Lääkärisi voi pyytää sinua tarkistamaan verensokeritasosi. Tämä auttaa lääkäriäsi päättämään, onko sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin annosta tarpeen muuttaa matalan verensokerin riskin vähentämiseksi.

Diabeettinen silmäsairaus (retinopatia)

Jos sinulla on diabeteksen aiheuttama silmäsairaus ja käytät insuliinia, tämä lääke voi aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä, mikä saattaa vaatia hoitoa. Ilmoita lääkärillesi, jos sinulla on diabeettinen silmäsairaus tai jos koet silmäongelmia tämän lääkkeen käytön aikana. Jos sinulla on mahdollisesti epävakaa diabeettinen silmäsairaus, Ozempic 2 mg:n käyttöä ei suositella.

Äkilliset muutokset näkökyvyssäsi

Jos et yhtäkkiä näe mitään tai näkösi heikkenee nopeasti tämän lääkkeen käytön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi saadaksesi neuvoja. Tämä voi johtua erittäin harvinaisesta haittavaikutuksesta, jota kutsutaan ei-arteriittiseksi etummaiseksi iskeemiseksi optikusneuropatiaksi (NAION) (katso kohta 4: Vakavat haittavaikutukset). Lääkärisi voi ohjata sinut silmätutkimukseen ja saatat joutua lopettamaan tämän lääkkeen käytön.

Lapset ja nuoret alle 18-vuotiaat

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole vielä vahvistettu.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Ozempicin lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko mahdollisesti käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Tämä koskee myös rohdosvalmisteita tai muita lääkkeitä, jotka olet ostanut ilman reseptiä.

Kerro lääkärillesi, apteekkarillesi tai sairaanhoitajallesi erityisesti, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät seuraavia vaikuttavia aineita:

Varfariini tai muut vastaavat suun kautta otettavat lääkkeet, jotka estävät veren hyytymistä (oraaliset antikoagulantit). Veresi saattaa tarvita useammin testausta hyytymisnopeuden tarkistamiseksi.

Tai jos käytät insuliinia. Lääkärisi kertoo, kuinka voit vähentää insuliiniannostasi ja suosittelee, että tarkistat verensokerisi useammin hyperglykemian (korkea verensokeri) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, joka ilmenee, kun keho ei pysty hajottamaan glukoosia riittämättömän insuliinin vuoksi) estämiseksi.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, onko se haitallista sikiölle. Siksi ehkäisyn käyttöä suositellaan tämän lääkkeen käytön aikana. Jos haluat tulla raskaaksi, keskustele lääkärisi kanssa siitä, miten hoitoa tulee muuttaa, koska sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö vähintään 2 kuukautta etukäteen. Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana, ota heti yhteyttä lääkäriisi, koska hoitosi on muutettava.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, koska ei tiedetä, päätyykö se rintamaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Ozempic vaikuttaa ajokykyysi ja kykyysi käyttää koneita. Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, saatat saada matalan verensokerin (hypoglykemia), mikä voi heikentää keskittymiskykyäsi. Älä aja autoa tai käytä koneita, kun sinulla on matalan verensokerin oireita. Katso kohta 2 'Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?' saadaksesi tietoa matalan verensokerin lisääntyneestä riskistä ja kohta 4 matalan verensokerin varoitusoireista. Ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisätietoja.

Ozempic sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, eli se on käytännössä 'natriumvapaa'.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina juuri siten kuin lääkärisi on kertonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi.

Kuinka paljon tätä lääkettä minun pitäisi käyttää?

Aloitussannos on 0,25 mg kerran viikossa, neljän viikon ajan.

Neljä viikon jälkeen lääkärisi nostaa annoksen 0,5 mg:aan kerran viikossa.

Jos verensokerisi ei ole riittävästi hallinnassa annoksella 0,5 mg kerran viikossa, lääkärisi saattaa suositella annoksen nostamista 1 mg:aan kerran viikossa.

Jos verensokerisi ei ole riittävästi hallinnassa annoksella 1 mg kerran viikossa, lääkärisi saattaa suositella annoksen nostamista 2 mg:aan kerran viikossa.

Älä muuta annostasi, ellei lääkärisi ole niin kehottanut.

Miten tätä lääkettä annetaan?

Ozempic annetaan ihonalaisena injektiona (subkutaaninen injektio). Älä injektoidi sitä laskimoon tai lihakseen.

Parhaat paikat injektointiin ovat reiden etupuoli, vyötärön etupuoli (vatsa) tai olkavarsi.

Ennen kuin käytät kynää ensimmäistä kertaa, anna lääkärisi tai sairaanhoitajasi näyttää, miten kynää käytetään.

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät tämän pakkausselosteen takaa.

Milloin käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä kerran viikossa, mahdollisuuksien mukaan joka viikko samana päivänä.

Voit injektoida itsesi mihin aikaan päivästä tahansa – riippumatta aterioista.

Auttaaksesi muistamaan, että injektoidit tätä lääkettä vain kerran viikossa, on suositeltavaa merkitä valittu viikonpäivä (esimerkiksi keskiviikko) laatikkoon ja kirjoittaa päivämäärä laatikkoon aina, kun olet injektoinut lääkkeen.

Tarvittaessa voit muuttaa tämän lääkkeen viikoittaisen injektio päivän, kunhan se on vähintään 3 päivää viimeisen injektion jälkeen. Uuden annostuspäivän valinnan jälkeen annostusta tulee jatkaa kerran viikossa.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos olet käyttänyt enemmän Ozempicia kuin pitäisi. Saatat saada haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohdat injektoida annoksen ja:

jos on kulunut 5 päivää tai vähemmän siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Ozempicia, käytä se heti kun muistat. Sen jälkeen injektoidi seuraava annos tavalliseen tapaan suunniteltuna päivänäsi.

jos on kulunut yli 5 päivää siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Ozempicia, jätä unohtunut annos väliin. Sen jälkeen injektoidi seuraava annos tavalliseen tapaan suunniteltuna päivänäsi. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta siitä lääkärisi kanssa. Jos lopetat käytön, verensokeritasosi voi nousta.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

#### 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.

##### Vakavat haittavaikutukset

Yleinen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

diabeettisen silmätautiin komplikaatiot (retinopatia) – kerro lääkärillesi, jos saat silmäoireita tämän lääkkeen käytön aikana, kuten näön muutoksia.

Melko harvinainen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta)

haiman tulehdus (akuutti haimatulehdus), joka voi aiheuttaa vakavaa jatkuvaa kipua vatsassa ja selässä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos koet näitä oireita.

Harvinainen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 1 000:sta)

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos saat oireita kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta, nielemisvaikeuksia ja nopeaa sydämen sykettä.

Erittäin harvinainen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta)

silmän sairaus nimeltä ei-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia (NAION), joka voi aiheuttaa kivutonta näön heikkenemistä tai näön menettämistä toisessa silmässä. Ota heti yhteyttä lääkäriisi, jos huomaat äkillistä näön menettämistä tai hitaasti heikkenevää näköä (katso kohta 2: 'Äkilliset muutokset näössäsi').

Tuntematon (saatavilla olevien tietojen perusteella ei voida arvioida)

Suolen tukkeuma. Vakava ummetuksen muoto, johon liittyy oireita kuten vatsakipu, turvotus, oksentelu jne.

##### Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen (esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä)

pahoinvointi – tämä häviää yleensä ajan myötä

ripuli – tämä häviää yleensä ajan myötä

matala verensokeri (hypoglykemia), kun tätä lääkettä käytetään yhdessä sulfonyyliureajohdannaista tai insuliinia sisältävien lääkkeiden kanssa

Usein (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

oksentelu

matala verensokeri (hypoglykemia), kun tätä lääkettä käytetään yhdessä muiden suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa kuin sulfonyyliureajohdannaiset tai insuliini

Matala verensokeri voi ilmetä äkillisesti. Oireita voivat olla: kylmä hiki, viileä kalpea iho, päänsärky, nopea syke, pahoinvointi tai voimakas nälkä, näkömuutokset, uneliaisuus tai heikkous, hermostuneisuus, ahdistuneisuus tai sekavuus, keskittymisvaikeudet tai vapina. Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä tehdä, jos saat näitä varoitusoireita.

Matala verensokeri on todennäköisempää, jos käytät myös sulfonyyliureajohdannaisia tai insuliinia. Lääkärisi saattaa pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen tämän lääkkeen aloittamista.

ruoansulatushäiriö (dyspepsia)  
tulehtunut maha (gastriitti) – oireita ovat mm. mahakipu, pahoinvointi tai oksentelu  
refluksi tai närästys – myös gastroesofageaalinen refluksaus (GERD) nimeltään  
vatsakipu  
vatsan turvotus  
ummetus  
röyhtäily  
sappikivet  
huimaus  
väsymys  
painonlasku  
vähentynyt ruokahalu  
ilmavaivat (flatulenssi)  
haimaentsyymien lisääntyminen (kuten lipaasi ja amylaasi)  
päänsärky.

Joskus (esiintyy alle yhdellä 100 käyttäjästä)

ruoka tai juoma maistuu erilaiselta kuin normaalisti  
nopea pulssi  
injektiokohdan reaktiot – kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma  
allergiset reaktiot kuten ihottuma, kutina tai nokkosihottuma  
ruoka pysyy mahassa pidempään kuin normaalisti (hidastunut mahan tyhjeneminen).

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, kuten liitteessä V on mainittu. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyvistä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Löydät sen kynän etiketistä ja pahvilaatikosta EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Ennen käyttöönottoa:

Säilytä jääkaapissa (2°C–8°C). Älä säilytä pakastimessa. Pidä poissa kylmäelementistä. Pidä kynän korkki kynässä suojataksesi valolta.

Käytön jälkeen:

Jos säilytät kynää alle 30°C:ssa tai jääkaapissa (2°C–8°C) (ei kylmäelementin lähellä), voit säilyttää sitä 6 viikkoa. Älä säilytä Ozempicia pakastimessa. Jos valmiste on ollut jäätyneenä, sitä ei saa enää käyttää.

Säilytä kynä, kun et käytä sitä, kynän korkki päällä suojataksesi valolta.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei ole kirkas ja väritön tai lähes väritön.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeitä oikein, ne tuhotaan vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä valmiste sisältää?

Tämän valmisteen vaikuttava aine on semaglutidi. Yksi ml injektionestettä sisältää 1,34 mg semaglutidia. Esitäytetty kynä sisältää 2 mg semaglutidia 1,5 ml liuoksessa.

Jokainen annos sisältää 0,25 mg semaglutidia 0,19 ml:ssa.

Muut tämän valmisteen aineet ovat: dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, injektionesteisiin käytettävä vesi, suolahappo/natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen). Katso myös kohta 2, 'Ozempic sisältää natriumia'.

Miltä Ozempic näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Ozempic on kirkas ja väritön tai lähes väritön injektioneste esitäytetyssä kynässä. Jokainen esitäytetty kynä sisältää 1,5 ml liuosta, joka on tarkoitettu 4 annokseen, kukin 0,25 mg.

Ozempic 0,25 mg injektioneste on saatavana seuraavassa pakkauskoossa: 1 kynä ja 4 NovoFine Plus kertakäyttöneulaa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Tanska

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty

Muut tietolähteet

Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla:

<http://www.ema.europa.eu>.

## Käyttöohjeet

Ozempic 0,25 mg liuos injeksiota varten esitäytetyssä kynässä semaglutidi

Ohjeet Ozempic 0,25 mg liuoksen käyttöön esitäytetyssä injektiokynässä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Ozempic-esitäytettyä kynääsi. Keskustele lääkärisi, sairaanhoitajasi tai apteekkarisi kanssa siitä, miten Ozempic injektoidaan oikein.

Käytä tämän kynän lääkettä vain lääkärin määräyksen mukaisesti.

Aloita tarkistamalla kynäsi varmistaaksesi, että kynä sisältää Ozempic 0,25 mg. Katso sitten alla olevia kuvia oppiaksesi tuntemaan kynäsi ja neulan eri osat.

Jos olet sokea tai heikkonäköinen etkä voi lukea kynän annosikkunaa, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka tietää, miten Ozempic-esitäytettyä kynää käytetään.

Kynäsi on esitäytetty kynä, jossa on kierrettävä annosvalitsin. Kynä sisältää 2 mg semaglutidia ja voit valita vain

0,25 mg annoksia. Yksi käyttämätön kynä sisältää neljä 0,25 mg annosta. Kun nämä neljä annosta on injektoitu, kynään jää vielä liuosta. Kynä on hävitettävä.

Käytä laatikon kannen sisäpuolella olevaa taulukkoa seurataksesi, kuinka monta injeksiota olet saanut ja milloin olet antanut injektiot.

Kynäsi on suunniteltu käytettäväksi 30G, 31G ja 32G kertakäyttöneulojen kanssa, joiden enimmäispituus on 8 mm.

NovoFine Plus -neulat sisältyvät pakkaukseen.

### Tärkeää tietoa

Kiinnitä erityistä huomiota näihin huomautuksiin, koska ne ovat tärkeitä kynän turvallisessa käytössä.

#### 1. Vaihda kynäsi uusi neula

Tarkista kynäsi nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää Ozempic 0,25 mg. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä injektoitavaa lääkettä. Väärän lääkkeen käyttö voi olla haitallista terveydellesi. Poista kynän korkki.

Tarkista, että kynän liuos on kirkas ja väritön. Katso kynän ikkunasta. Jos liuos näyttää samealta tai värilliseltä, älä käytä kynää.

Ota uusi neula.

Tarkista paperinen suojus ja ulompi neulansuojus vaurioiden varalta, sillä ne voivat vaikuttaa steriiliyteen. Käytä uutta neulaa, jos näet vaurioita.

Poista paperinen suojus.

Varmista, että kiinnität neulan oikein.

Paina neula suoraan kynään.  
Kierrä se tiukasti kiinni.

Neulassa on neulansuojus ja neulakorkki. Sinun on poistettava molemmat. Jos et poista molempia, et pistä liuosta.

Poista ulompi neulansuojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä injektioon jälkeen poistaaksesi neulan turvallisesti kynästä.

Poista sisempi neulakorkki ja hävitä se. Jos yrität laittaa sen takaisin, voit vahingossa pistää itsesi neulalla.

Neulan kärkeen voi ilmestyä pisara liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun on silti tarkistettava virtaus, kun käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Katso vaihe 2 'Tarkista virtaus jokaisen uuden kynän kanssa'.

Kiinnitä uusi neula kynään vasta, kun olet valmis antamaan injektioon.

Käytä jokaista injektiota varten aina uutta neulaa.

Näin voidaan estää neulojen tukkeutuminen, kontaminaatio, infektio, liuoksen vuotaminen ja epätarkka annostelu.

Älä koskaan käytä vääntynyttä tai vaurioitunutta neulaa.

## 2. Tarkista jokaisen uuden kynän kanssa virtaus

Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 'Aseta annoksesi'. Tarkista virtaus vain ennen ensimmäistä injektiota jokaisen uuden kynän kanssa.

Käännä annoksenasetusnuppia tarkistusviivaan (\*\* =) suoraan '0' jälkeen. Varmista, että tarkistusviiva on linjassa annososoittimen kanssa.

Pidä kynää neula ylöspäin suunnattuna.

Paina annostelupainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes annosikkuna näyttää jälleen '0'. Numeron '0' tulee olla linjassa annososoittimen kanssa. Neulan kärkeen pitäisi nyt ilmestyä pisara liuosta.

Neulan kärkeen voi jäädä pieni pisara, mutta sitä ei injektoida. Jos pisaraa ei ilmesty, toista vaihe 2 'Tarkista jokaisen uuden kynän kanssa virtaus' enintään 6 kertaa. Jos pisaraa ei vielääkään ilmesty, vaihda neula ja toista vaihe 2 'Tarkista jokaisen uuden kynän kanssa virtaus' vielä kerran. Hävitä kynä ja käytä uutta, jos pisaraa ei vielääkään ilmesty.

Tarkista aina, että neulan kärkeen ilmestyy pisara ennen kuin käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistat, että liuos virtaa. Jos pisaraa ei ilmesty, et injektoida lääkettä, vaikka annosikkunassa näkyisi jokin muu numero. Tämä voi viitata tukkeutuneeseen tai vaurioituneeseen neulaan. Jos et tarkista virtausta ennen jokaista ensimmäistä injektiota uudella kynällä, et ehkä saa määrättyä annosta ja Ozempicin toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

## 3. Aseta annoksesi

Käännä annoksenasetusnuppia asettaaksesi 0,25 mg.

Jatka kääntämistä, kunnes annosikkuna pysähtyy ja näyttää 0,25 mg.

Vain annosikkuna ja annososoitin osoittavat, että 0,25 mg on asetettu. Voit asettaa vain 0,25 mg annosta kohden. Annoksenasetusnuppi tekee erilaisen napsahdusäänen, kun sitä käännetään eteenpäin, taaksepäin tai ohi 0,25 mg. Älä laske kynän napsahduksia.

Ennen kuin injektoit tämän lääkkeen, käytä aina annosikkunaa ja annososoitinta nähdäksesi, että 0,25 mg on asetettu. Älä laske kynän napsahduksia. Vain 0,25 mg annoksia voidaan asettaa annoksenasetusnupilla. 0,25 mg:n tulee olla tarkasti linjassa annososoittimen kanssa varmistaaksesi, että saat oikean annoksen.

#### 4. Injektoi annoksesi

Pistä neula ihoosi tavalla, jonka lääkärisi tai sairaanhoitajasi on sinulle näyttänyt. Varmista, että näet annosikkunan. Älä peitä sitä sormillasi. Tämä voi keskeyttää injektion.

Paina annostuspainiketta ja pidä se painettuna. Katso, kuinka annosikkuna palaa takaisin 'O':aan. Numero 'O' tulee olla linjassa annososoittimen kanssa. Saatat kuulla tai tuntea napsahduksen.

Pidä annostuspainike painettuna samalla kun pidät neulaa ihossasi.

Laske hitaasti kuuteen samalla kun pidät annostuspainiketta painettuna. Jos neula otetaan pois ihosta aikaisemmin, saatat nähdä pienen suihkun liuosta tulevan neulan kärjestä. Tässä tapauksessa koko annosta ei ole injektoitu.

Ota neula pois ihostasi. Voit sitten vapauttaa annostuspainikkeen. Jos pistoskohta alkaa vuotaa verta, paina sitä kevyesti.

Injektion jälkeen saatat nähdä pisaran liuosta neulan kärjessä. Tämä on normaalia eikä vaikuta annokseesi.

Katso aina annosikkunaa, jotta tiedät kuinka monta mg injektoit. Pidä annostuspainike painettuna, kunnes annosikkuna palaa takaisin 'O':aan.

Miten tunnistattukossa olevan tai vaurioituneen neulan

- Jos annostuspainikkeen jatkuvasta painamisesta huolimatta annosikkuna ei palaa 'O':aan, olet saattanut käyttää tukossa olevaatai vaurioitunutta neulaa.
- Tässä tapauksessa et ole saanut lääkettä, vaikka annosikkunan numero olisi muuttunut alkuperäisestä annoksestasi. Miten toimia tukossa olevan

neulan kanssa

Vaihda neula kuten kohdassa 5 'Injektion jälkeen' on kuvattu ja toista kaikki vaiheet alkaen kohdasta 1 'Uuden neulan asettaminen kynään'. Varmista, että asetat tarvittavan kokoisen annoksen. Aseta tarvitsemasi annos.

Älä koske annosikkunaan injektion aikana. Tämä voi keskeyttää injektion.

#### 5. Injektion jälkeen

Poista neula aina jokaisen injektion jälkeen ja hävitä se injektion helpottamiseksi ja tukkeutuneen neulan välttämiseksi. Jos neula on tukossa, lääkettä ei injektoida.

Aseta ulompi neulansuojus tasaiselle alustalle ja ohjaa neulan kärki siihen koskematta neulaan tai suojukseen sormillasi.

Kun neula on peitetty, paina varovasti ulompi neulansuojus kokonaan neulan päälle. Kierrä neula irti ja hävitä se huolellisesti lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Aseta kynän korkki takaisin kynään jokaisen käytön jälkeen, jotta liuos suojataan valolta.

Kun kynä on hävitettävä, tee se ilman neulaa lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan yritä asettaa sisäistä neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itsesi neulalla. Poista aina neula kynästäsi välittömästi jokaisen injektion jälkeen. Näin voidaan estää tukkeutuneet neulat, kontaminaatio, infektio, liuksen vuoto ja epätarkka annostelu.

Muita tärkeitä tietoja

Pidä kynäsi ja neulasi aina poissa muiden, erityisesti lasten, näkyvistä ja ulottuvilta.

Älä koskaan jaa kynääsi tai neulojasi muiden ihmisten kanssa. Hoitajien on oltava erittäin varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja pisto- onnettomuuksien ja ristikontaminaation välttämiseksi. Hoitajien on oltava erittäin varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja pisto- onnettomuuksien ja ristikontaminaation estämiseksi.

Huolla kynäsi

Käsittele kynääsi huolellisesti. Karkea käsittely tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa epätarkkaa annostelua. Tällöin tämän lääkkeen aiottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä jätä kynää autoon tai muuhun paikkaan, jossa voi olla liian kuuma tai kylmä.

Älä injektoida Ozempicia, joka on ollut jäätyneenä. Jos teet niin, lääkkeen toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä injektoida Ozempicia, joka on altistunut suoralle auringonvalolle. Jos teet niin, lääkkeen toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä altista kynääsipölylle, lialle tai kosteudelle.

Älä pese, upota tai voitele kynääsi. Kynä voidaan puhdistaa miedolla tiskiaineella kostutetulla liinalla.

Älä pudota kynääsi tai kolauta sitä kovaa pintaa vasten. Jos pudotat kynän tai epäilet ongelmaa, aseta uusi neula ja tarkista annosteluennon injektointia.

Älä yritätäyttää kynääsi uudelleen.

Älä yritä korjata tai purkaa kynääsi.