

## Prospect: informații pentru pacient

Ozempic 0,25 mg soluție injectabilă în stilou preumplut  
semaglutid

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.
- Aveți întrebări? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

### Conținutul acestui prospect

1. Ce este Ozempic și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### 1. Ce este Ozempic și pentru ce se utilizează acest medicament?

Substanța activă din Ozempic este semaglutid. Ajută organismul să reducă nivelul de zahăr din sânge, doar dacă zahărul din sânge este prea ridicat, și poate ajuta la prevenirea unei afecțiuni cardiace la pacienții cu diabet de tip 2. De asemenea, poate ajuta la încetinirea deteriorării funcției renale la pacienții cu diabet de tip 2 într-un mod care depășește simpla reducere a nivelului de zahăr din sânge.

Ozempic este utilizat pentru tratamentul adulților (de la 18 ani în sus) cu diabet de tip 2 atunci când dieta și exercițiile fizice nu sunt suficiente:

- ca tratament de sine stătător – când nu puteți utiliza metformină (un alt medicament pentru diabet) sau
- cu alte medicamente pentru diabet – dacă acestea nu sunt suficiente pentru a vă regla nivelurile de zahăr din sânge. Acestea pot fi medicamente pe care le luați pe cale orală sau le injectați, cum ar fi insulina.

Este important să continuați cu dieta și exercițiile fizice așa cum v-a fost indicat de medicul, farmacistul sau asistenta dumneavoastră.

#### 2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Contactați medicul, farmacistul sau asistenta înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament nu este același cu insulina și nu trebuie să-l utilizați dacă:

aveți diabet de tip 1 – o afecțiune în care corpul dumneavoastră nu produce insulină  
ați dezvoltat cetoacidoză diabetică – o complicație a diabetului cu glicemie ridicată,  
dificultăți de respirație, confuzie, sete excesivă, respirație cu miros dulce sau un gust  
dulce sau metalic în gură.

Ozempic nu este insulină și, prin urmare, nu trebuie utilizat ca un înlocuitor al insulinei.

Dacă știți că urmează să suferiți o operație în care veți fi sub anestezie (adormit), spuneți medicului dumneavoastră că utilizați Ozempic.

Efecte asupra sistemului digestiv

În timpul tratamentului cu acest medicament, puteți avea greață, vărsături sau diaree. Aceste efecte secundare pot provoca deshidratare (pierderea de lichide). Este important să beți mult pentru a preveni deshidratarea. Acest lucru este deosebit de important dacă aveți probleme renale. Contactați medicul dacă aveți întrebări sau sunteți îngrijorat.

Durere severă și persistentă în abdomen care poate fi cauzată de pancreatită acută

Contactați imediat medicul dacă aveți durere severă și persistentă în zona abdominală. Acest lucru poate indica pancreatită acută (inflamația pancreasului). Consultați secțiunea 4 pentru semnele de avertizare ale unui pancreas inflamant.

Glicemie scăzută (hipoglicemie)

Dacă utilizați acest medicament împreună cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, acest lucru poate crește riscul de glicemie scăzută (hipoglicemie). Consultați secțiunea 4 pentru semnele de avertizare ale unei glicemii scăzute. Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă monitorizați glicemia. Acest lucru va ajuta medicul să decidă dacă doza de derivat de sulfoniluree sau insulină trebuie ajustată pentru a reduce riscul de glicemie scăzută.

Afecțiune oculară diabetică (retinopatie)

Dacă aveți o afecțiune oculară cauzată de diabet și utilizați insulină, acest medicament poate duce la o deteriorare a vederii dumneavoastră, ceea ce poate necesita tratament. Informați medicul dacă aveți o afecțiune oculară diabetică sau dacă aveți probleme oculare în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă aveți o afecțiune oculară diabetică posibil instabilă, utilizarea Ozempic 2 mg nu este recomandată.

Schimbări bruște ale vederii dumneavoastră

Dacă brusc nu mai vedeți sau vedeți mai puțin rapid în timpul tratamentului cu acest medicament, contactați imediat medicul dumneavoastră pentru sfaturi. Acest lucru poate fi cauzat de un efect secundar foarte rar numit neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) (vezi secțiunea 4: Reacții adverse grave). Medicul dumneavoastră vă poate

trimite pentru un examen oftalmologic și poate fi necesar să opriți tratamentul cu acest medicament.

Copii și adolescenți până la 18 ani

Acest medicament nu este recomandat copiilor și adolescenților sub 18 ani deoarece siguranța și eficacitatea în acest grup de vârstă nu au fost încă stabilite.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați, pe lângă Ozempic, și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în curând? Spuneți acest lucru medicului sau farmacistului dumneavoastră. Acest lucru se aplică și medicamentelor pe bază de plante sau altor medicamente pe care le-ați cumpărat fără prescripție medicală.

Spuneți medicului, farmacistului sau asistentei dumneavoastră în special dacă utilizați medicamente care conțin una dintre următoarele substanțe active:

Warfarină sau alte medicamente similare, administrate pe cale orală, care împiedică coagularea sângelui (anticoagulante orale). Este posibil să fie necesar să vi se testeze sângele mai des pentru a verifica cât de repede se coagulează sângele dumneavoastră. Sau dacă utilizați insulină. Medicul dumneavoastră vă va spune cum să reduceți doza de insulină și vă va recomanda să vă verificați glicemia mai des pentru a preveni hiperglicemia (nivel ridicat de zahăr în sânge) și cetoacidoza diabetică (o complicație a diabetului care apare atunci când organismul nu poate descompune glucoza din cauza insuficienței de insulină).

Sarcina și alăptarea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii deoarece nu se știe dacă este dăunător pentru copilul nenăscut. Prin urmare, se recomandă utilizarea contracepției în timpul utilizării acestui medicament. Dacă doriți să rămâneți gravidă, discutați cu medicul dumneavoastră despre cum trebuie ajustat tratamentul, deoarece trebuie să opriți utilizarea acestui medicament cu cel puțin 2 luni înainte. Dacă rămâneți gravidă în timpul utilizării acestui medicament, contactați imediat medicul dumneavoastră, deoarece tratamentul dumneavoastră trebuie schimbat.

Nu utilizați acest medicament dacă alăptați, deoarece nu se știe dacă ajunge în laptele matern.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Este puțin probabil ca Ozempic să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Dacă utilizați acest medicament în combinație cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, puteți avea glicemie scăzută (hipoglicemie) care vă poate reduce capacitatea de concentrare. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje atunci când aveți simptome de glicemie scăzută. Consultați secțiunea 2 'Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?' pentru informații despre un risc crescut de glicemie scăzută și secțiunea 4 pentru simptomele de avertizare ale glicemiei scăzute. Contactați medicul dumneavoastră pentru mai multe informații.

Ozempic conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză, ceea ce înseamnă că este în esență 'fără sodiu'.

### 3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta dumneavoastră.

Cât de mult din acest medicament trebuie să folosesc?

Doza inițială este de 0,25 mg o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni.

După patru săptămâni, medicul dumneavoastră va crește doza la 0,5 mg o dată pe săptămână.

Dacă glicemia dumneavoastră nu este suficient controlată cu o doză de 0,5 mg o dată pe săptămână, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să creșteți doza la 1 mg o dată pe săptămână.

Dacă glicemia dumneavoastră nu este suficient controlată cu o doză de 1 mg o dată pe săptămână, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să creșteți doza la 2 mg o dată pe săptămână.

Nu schimbați doza decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus să faceți acest lucru.

Cum se administrează acest medicament?

Ozempic se administrează ca o injecție subcutanată. Nu injectați în venă sau mușchi.

Cele mai bune locuri pentru injectare sunt partea din față a coapselor, partea din față a taliei (abdomen) sau brațul superior.

Înainte de a folosi stiloul pentru prima dată, lăsați medicul sau asistenta să vă arate cum să folosiți stiloul.

Instrucțiuni detaliate de utilizare se găsesc pe spatele acestui prospect.

Când utilizați acest medicament?

Utilizați acest medicament o dată pe săptămână, de preferință în aceeași zi a fiecărei săptămâni.

Vă puteți injecta în orice moment al zilei – indiferent de mese.

Pentru a vă ajuta să vă amintiți că trebuie să injectați acest medicament doar o dată pe săptămână, se recomandă să notați ziua săptămânii aleasă (de exemplu, o miercuri) pe cutie și să scrieți data pe cutie de fiecare dată când ați injectat acest medicament.

Dacă este necesar, puteți schimba ziua injecției săptămânale a acestui medicament, atâta timp cât este la cel puțin 3 zile după ultima injecție a acestui medicament. După selectarea unei noi zile de dozare, doza trebuie continuată o dată pe săptămână.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă ați utilizat mai mult Ozempic decât ar trebui. Puteți avea reacții adverse, cum ar fi greață.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Dacă uitați să injectați o doză și:

dacă au trecut 5 zile sau mai puțin de când ar fi trebuit să utilizați Ozempic, utilizați-l imediat ce vă amintiți. Apoi, injectați următoarea doză ca de obicei, în ziua planificată. Dacă au trecut mai mult de 5 zile de când ar fi trebuit să utilizați Ozempic, săriți peste doza uitată. Apoi, injectați următoarea doză ca de obicei, în ziua planificată. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă opriți utilizarea acestui medicament

Nu opriți utilizarea acestui medicament fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă opriți utilizarea, nivelul zahărului din sânge poate crește.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le manifestă.

Reacții adverse grave

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

complicații ale afecțiunilor oculare diabetice (retinopatie) – spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme oculare în timpul tratamentului cu acest medicament, cum ar fi modificări ale vederii.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 utilizatori)

inflamația pancreasului (pancreatită acută), care poate provoca dureri severe și persistente în abdomen și spate. Trebuie să contactați imediat medicul dacă aveți aceste simptome.

Rar (apar la mai puțin de 1 din 1.000 utilizatori)

reacții alergice severe (reacții anafilactice, angioedem). Solicitați imediat ajutor medical și informați medicul cât mai curând posibil dacă aveți simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, buzelor, limbii și/sau gâtului cu dificultăți la înghițire și bătăi rapide ale inimii.

Foarte rar (apar la mai puțin de 1 din 10.000 utilizatori)

o afecțiune medicală a ochiului numită neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) care poate face ca, fără durere, să vedeți mai puțin sau deloc cu unul dintre ochi. Contactați imediat medicul dacă observați că nu mai vedeți brusc sau vedeți mai puțin treptat (vezi secțiunea 2: 'Schimbări bruște ale vederii').

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile)

Obstrucție intestinală. O formă severă de constipație cu simptome precum dureri abdominale, balonare, vărsături, etc.

Alte reacții adverse

Foarte frecvent (apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori)

greață – aceasta dispare de obicei după un timp  
diaree – aceasta dispare de obicei după un timp  
glicemie scăzută (hipoglicemie), dacă acest medicament este utilizat împreună cu medicamente care conțin un derivat de sulfoniluree sau insulină

Frecvent (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

vărsături

glicemie scăzută (hipoglicemie), dacă acest medicament este utilizat împreună cu medicamente antidiabetice orale altele decât derivați de sulfoniluree sau insulină

Semnele de avertizare ale unei glicemii scăzute pot apărea brusc. Acestea pot include: transpirație rece, piele rece și palidă, dureri de cap, bătăi rapide ale inimii, greață sau senzație intensă de foame, modificări ale vederii, senzație de somnolență sau slăbiciune, senzație de nervozitate, anxietate sau confuzie, dificultăți de concentrare sau tremurături. Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați glicemia scăzută și ce să faceți dacă aveți aceste semne de avertizare.

Glicemia scăzută este mai probabil să apară dacă utilizați și un derivat de sulfoniluree sau insulină. Medicul dumneavoastră poate reduce doza acestor medicamente înainte de a începe să utilizați acest medicament.

indigestie

gastrită – simptomele includ dureri de stomac, greață sau vărsături  
reflux sau arsuri la stomac – cunoscut și sub denumirea de boală de reflux

gastroesofagian (BRGE)

dureri abdominale

senzație de balonare în abdomen

constipație

erucția

calculi biliari

amețeli

oboseală

scădere în greutate

scăderea apetitului

flatulență

creșterea enzimelor pancreatice (cum ar fi lipaza și amilaza)

dureri de cap.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

mâncarea sau băutura au un gust diferit de cel obișnuit

puls rapid

reacții la locul injectării – cum ar fi vânătăi, durere, iritație, mâncărime și erupții cutanate

reacții alergice cum ar fi erupții cutanate, mâncărime sau urticarie

alimentele rămân mai mult timp decât normal în stomac (întârzierea golirii stomacului).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru se aplică și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemul național de raportare

menționat în anexa V. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este menționată pe eticheta stiloului și pe cutia de carton după EXP. Aceasta include o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Înainte de utilizare:

Păstrați în frigider (2°C–8°C). Nu păstrați la congelator. Țineți departe de elementul de răcire. Păstrați capacul pe stilou pentru a-l proteja de lumină.

După deschidere:

Dacă păstrați stiloul sub 30°C sau în frigider (2°C–8°C) (nu în apropierea elementului de răcire), îl puteți păstra timp de 6 săptămâni. Nu păstrați Ozempic la congelator. Dacă a fost înghețat, nu mai trebuie utilizat. Păstrați stiloul când nu îl folosiți cu capacul pe el pentru a-l proteja de lumină.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că soluția nu este limpede și incoloră sau aproape incoloră.

Nu aruncați medicamentele pe chiuvetă sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea sunt distruse responsabil și nu ajung în mediu.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este semaglutida. Un ml de soluție injectabilă conține 1,34 mg semaglutidă. Un stilou preumplut conține 2 mg semaglutidă în 1,5 ml soluție. Fiecare doză conține 0,25 mg semaglutidă în 0,19 ml. Celelalte substanțe din acest medicament sunt: dihidrat de dinatrium fosfat, propilenglicol, fenol, apă pentru injecții, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului). Vezi și secțiunea 2, 'Ozempic conține sodiu'.

Cum arată Ozempic și ce conține un ambalaj?

Ozempic este o soluție limpede și incoloră sau aproape incoloră pentru injecție într-un stilou preumplut. Fiecare stilou preumplut conține 1,5 ml soluție, destinat pentru 4 doze de 0,25 mg.

Ozempic 0,25 mg soluție injectabilă este disponibil în următoarea mărime de ambalaj: 1 stilou și 4 ace de unică folosință NovoFine Plus.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd  
Danemarca

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Alte surse de informații

Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene pentru Medicamente: <http://www.ema.europa.eu>.

Instrucțiuni de utilizare

Ozempic 0,25 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut  
semaglutid

Instrucțiuni pentru utilizarea Ozempic 0,25 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza stiloul preumplut Ozempic.

Discutați cu medicul, asistenta sau farmacistul despre cum să injectați corect Ozempic.

Utilizați medicamentul din acest stilou doar conform prescripției.

Începeți prin a verifica stiloul pentru a vă asigura că stiloul conține Ozempic 0,25 mg. Apoi, consultați imaginile de mai jos pentru a cunoaște diferitele părți ale stiloului și ale acului.

Dacă sunteți orb sau aveți deficiențe de vedere și nu puteți citi fereastra de afișare a dozei de pe stilou, nu utilizați acest stilou fără ajutor. Cereți ajutorul unei persoane cu vedere bună și care știe cum să folosească stiloul preumplut Ozempic.

Stiloul dumneavoastră este un stilou preumplut cu buton rotativ de setare a dozei. Stiloul conține 2 mg semaglutid și puteți selecta doar doze de 0,25 mg. Un stilou neutilizat conține patru doze de 0,25 mg. După ce aceste patru doze au fost injectate, va rămâne soluție în stilou. Stiloul trebuie aruncat.

Utilizați tabelul de pe partea interioară a capacului cutiei pentru a ține evidența câte injecții ați avut și când ați administrat injecțiile.

Stiloul dumneavoastră este proiectat pentru utilizare cu ace de unică folosință de 30G, 31G și 32G cu o lungime maximă de 8 mm.

Ace NovoFine Plus sunt incluse în pachet.

Informații importante

Acordați o atenție deosebită acestor observații deoarece sunt importante pentru utilizarea în siguranță a stiloului.

1. Montarea unui ac nou pe stiloul dumneavoastră

Verificați numele și eticheta colorată a stiloului dumneavoastră pentru a vă asigura că acesta conține Ozempic 0,25 mg. Acest lucru este deosebit de important dacă utilizați mai mult de un tip de medicament injectabil. Utilizarea unui medicament greșit poate fi dăunătoare pentru sănătatea dumneavoastră.

Scoateți capacul stiloului.

Verificați dacă soluția din stilou este limpede și incoloră. Priviți prin fereastra stiloului. Dacă soluția pare tulbure sau colorată, nu trebuie să folosiți stiloul.

Luați un ac nou.

Verificați dacă plăcuța de hârtie și capacul exterior al acului sunt deteriorate, acestea pot afecta sterilitatea. Folosiți un ac nou dacă observați vreo deteriorare.

Îndepărtați plăcuța de hârtie.

Asigurați-vă că atașați corect acul.

Apăsăți acul drept pe stilou.

Rotiți-l pentru a-l fixa.

Acul are un capac și un dop. Trebuie să le îndepărtați pe ambele. Dacă nu le îndepărtați pe ambele, nu veți injecta soluția. Scoateți capacul exterior al acului și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Veți avea nevoie de el după injecție pentru a scoate acul în siguranță de pe stilou.

Îndepărtați dopul interior al acului și aruncați-l. Dacă încercați să-l puneți la loc, v-ați putea înțepa accidental cu acul.

O picătură de soluție poate apărea la vârful acului. Acest lucru este normal, dar trebuie să verificați totuși fluxul dacă folosiți un stilou nou pentru prima dată. Consultați pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou'.

Atașați un ac nou pe stilou doar când sunteți gata să administrați injecția.

Folosiți întotdeauna un ac nou pentru fiecare injecție.

Utilizare pentru fiecare întotdeauna un ac nou pentru injecție.

Astfel pot fi prevenite acele înfundate, contaminarea, infecția, scurgerea soluției și dozarea inexactă.

Nu folosiți niciodată un ac îndoit sau deteriorat.

## 2. Verificați fluxul la fiecare stilou nou

Dacă stiloul dumneavoastră este deja în uz, treceți la pasul 3 'Setarea dozei'. Verificați fluxul doar înainte de prima injecție cu fiecare stilou nou.

Rotiți butonul de setare a dozei la linia de control (\*\* =) direct după '0'. Asigurați-vă că linia de control este aliniată cu săgeata indicatoare a dozei.

Țineți stiloul cu acul îndreptat în sus.

Apăsați butonul de administrare și mențineți-l apăsat până când fereastra de citire a dozei revine la '0'. Cifra '0' trebuie să fie aliniată cu săgeata indicatoare a dozei. Acum ar trebui să apară o picătură de soluție la vârful acului.

Poate rămâne o mică picătură la vârful acului, dar aceasta nu va fi injectată. Dacă nu apare nicio picătură, repetați pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou' de maximum 6 ori. Dacă tot nu apare nicio picătură, înlocuiți acul și repetați pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou' încă o dată. Aruncați stiloul și folosiți unul nou dacă nici atunci nu apare nicio picătură de soluție.

Verificați întotdeauna dacă apare o picătură la vârful acului înainte de a folosi pentru prima dată un stilou nou. Astfel vă asigurați că soluția curge. Dacă nu apare nicio picătură, nu injectați medicamentul, chiar dacă apare un alt număr în fereastra de citire a dozei. Acest lucru poate indica un ac blocat sau deteriorat. Dacă nu verificați fluxul înainte de fiecare primă injecție cu un stilou nou, este posibil să nu primiți doza prescrisă și efectul dorit al Ozempic poate lipsi. 3. Setarea dozei dumneavoastră

Rotiți butonul de setare a dozei pentru a seta 0,25 mg.

Continuați să rotiți până când fereastra de citire a dozei se oprește și indică 0,25 mg.  
Continuați să rotiți până când fereastra de citire a dozei se oprește și indică 0,25 mg.

Înainte de a injecta acest medicament, folosiți întotdeauna fereastra de citire a dozei și săgeata indicatoare a dozei pentru a vedea că 0,25 mg este setat. Nu numărați numărul de clicuri ale stiloului. Doar doze de 0,25 mg pot fi setate cu butonul de setare a dozei. 0,25 mg trebuie să fie exact aliniat cu săgeata indicatoare a dozei pentru a vă asigura că primiți doza corectă.

Înainte de a injecta acest medicament, utilizați întotdeauna fereastra de citire a dozei și săgeata indicatoare a dozei pentru a vedea că este setată doza de 0,25 mg. Nu numărați clicurile stiloului. Doar doze de 0,25 mg pot fi setate cu butonul de setare a dozei. 0,25 mg trebuie să fie exact aliniat cu săgeata indicatoare a dozei pentru a vă asigura că primiți doza corectă.

#### 4. Injectați doza dumneavoastră

Asigurați-vă că puteți vedea fereastra de citire a dozei. Nu o acoperiți cu degetele. Acest lucru poate întrerupe injecția.  
Asigurați-vă că puteți vedea fereastra de citire a dozei. Nu o acoperiți cu degetele. Acest lucru poate întrerupe injecția.

Apăsați butonul de administrare și mențineți-l apăsat.  
Uitați-vă cum fereastra de citire a dozei revine la '0'. Cifra '0' trebuie să fie aliniată cu săgeata indicatoare a dozei. Este posibil să auziți sau să simțiți un clic.

Continuați să apăsați butonul de administrare în timp ce mențineți acul în piele.

Numărați încet până la 6 în timp ce mențineți butonul de administrare apăsat.  
Dacă acul este scos din piele mai devreme, este posibil să vedeți un jet de soluție ieșind din vârful acului. În acest caz, nu a fost injectată întreaga doză.

Scoateți acul din piele. Puteți apoi să eliberați butonul de administrare. Dacă locul injectării începe să sângereze, apăsați ușor pe el.

După injectare, este posibil să vedeți o picătură de soluție la vârful acului. Acest lucru este normal și nu afectează doza dumneavoastră.

Uitați-vă întotdeauna la fereastra de citire a dozei, astfel încât să știți câte mg injectați. Mențineți butonul de administrare apăsat până când fereastra de citire a dozei revine la '0'.

Cum recunoașteți un ac blocat sau deteriorat

- Dacă după apăsarea continuă a butonului de administrare fereastra de citire a dozei nu ajunge la '0', este posibil să fi folosit un ac blocat sau deteriorat.
- În acest caz, nu ați primit niciun medicament, chiar dacă numărul din fereastra de citire a dozei s-a schimbat față de doza pe care ați setat-o inițial.

Cum să acționați în cazul unui ac blocat

Înlocuiți acul așa cum este descris în pasul 5 'După injecția dumneavoastră' și repetați toți pașii începând cu pasul 1 'Furnizați stiloul cu un ac nou'. Asigurați-vă că setați doza completă de care aveți nevoie. Setați doza completă de care aveți nevoie.

Nu atingeți fereastra de citire a dozei în timpul injectării. Acest lucru poate întrerupe injecția.

## 5. După injecția dumneavoastră

Îndepărtați întotdeauna acul după fiecare injecție și aruncați-l pentru a facilita injecția și pentru a preveni blocarea acului. Dacă acul este blocat, nu se va injecta niciun medicament.

Așezați capacul exterior al acului pe o suprafață plană și introduceți vârful acului în el, fără a atinge acul sau capacul cu degetele.

Când acul este acoperit, apăsați ușor capacul exterior al acului complet pe ac. Desfaceți acul și aruncați-l cu grijă așa cum v-a fost indicat de medicul, asistenta, farmacistul sau autoritățile locale.

Puneți capacul stiloului înapoi pe stilou după fiecare utilizare, pentru a proteja soluția de lumină.

Când stiloul trebuie aruncat, faceți acest lucru fără un ac pe el conform instrucțiunilor medicului, asistentei, farmacistului sau autorităților locale.

Nu încercați niciodată să puneți capacul interior al acului înapoi pe ac. V-ați putea înțepa. V-ați putea înțepa cu acul.

Îndepărtați întotdeauna imediat acul de pe stilou după fiecare injecție.

Astfel pot fi prevenite blocarea acelor, contaminarea, infecția, scurgerile de soluție și dozarea inexactă.

## Alte informații importante

Păstrați întotdeauna stiloul și acele departe de vedere și de accesul altor persoane, în special al copiilor.

Nu împărțiți niciodată stiloul sau acele cu alte persoane.

Îngrijitorii trebuie să fie foarte atenți când manipulează acele folosite pentru a preveni accidentele de înțepare și contaminarea încrucișată.

### Întreținerea stiloului dumneavoastră

Tratați stiloul cu grijă. Manipularea dură sau utilizarea incorectă poate cauza dozare inexactă. În acest caz, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Nu lăsați stiloul într-o mașină sau într-un alt loc unde poate fi prea cald sau prea rece. Nu injectați Ozempic care a fost înghețat. Dacă faceți acest lucru, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Nu injectați Ozempic care a fost expus la lumina directă a soarelui. Dacă faceți acest lucru, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Nu expuneți stiloul dumneavoastră lapraf, murdărie sau umiditate.

Nu spălați, scufundați sau ungeți stiloul dumneavoastră. Stiloul poate fi curățat cu un detergent de vase ușor pe o cârpă umedă. Medicamentul pe o cârpă umedă.

Nu lăsați stiloul să cadă sau să lovească o suprafață dură. Dacă scăpați stiloul sau suspectați o problemă, trebuie să puneți un ac nou și să verificați fluxul înainte de a injecta.

Nu încercați să reumpleți stiloul dumneavoastră.

Nu încercați să reparați sau să demontați stiloul dumneavoastră.