

Prospecto: información para el paciente

Ozempic 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada semaglutida

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.
- ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.
- No comparta este medicamento con otras personas, ya que ha sido recetado solo para usted. Puede ser perjudicial para otros, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.
- ¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es Ozempic y para qué se utiliza este medicamento?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo debe usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Ozempic y para qué se utiliza este medicamento?

El principio activo de Ozempic es semaglutida. Ayuda a su cuerpo a reducir el nivel de azúcar en sangre, solo si el azúcar en sangre es demasiado alto, y puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas en pacientes con diabetes tipo 2. También puede ayudar a retrasar el deterioro de la función renal en pacientes con diabetes tipo 2 de una manera que va más allá de solo reducir el azúcar en sangre.

Ozempic se utiliza para el tratamiento de adultos (de 18 años o más) con diabetes tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes:

como tratamiento único – cuando no puede usar metformina (otro medicamento para la diabetes) o

con otros medicamentos para la diabetes – si estos no son suficientes para regular sus niveles de azúcar en sangre. Estos pueden ser medicamentos que toma por vía oral o que se inyectan, como la insulina.

Es importante que continúe con su dieta y ejercicio como le ha indicado su médico, farmacéutico o enfermero.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

Es alérgico a alguno de los componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de usar este medicamento.

Este medicamento no es lo mismo que la insulina y no debe usarlo si:

tiene diabetes tipo 1 – una condición en la que su cuerpo no produce insulina
ha desarrollado cetoacidosis diabética – una complicación de la diabetes con alto nivel de azúcar en sangre, dificultad para respirar, confusión, sed excesiva, aliento con olor dulce o un sabor dulce o metálico en la boca.

Ozempic no es insulina y, por lo tanto, no debe usarse como sustituto de la insulina.

Si sabe que va a someterse a una operación en la que estará bajo anestesia (dormido), informe a su médico que está usando Ozempic.

Efectos en el sistema digestivo

Durante el tratamiento con este medicamento, puede experimentar náuseas, vómitos o diarrea. Estos efectos secundarios pueden causar deshidratación (pérdida de líquidos). Es importante que beba mucho para evitar la deshidratación. Esto es especialmente importante si tiene problemas renales. Consulte a su médico si tiene preguntas o si está preocupado.

Dolor de estómago grave y persistente que puede ser consecuencia de pancreatitis aguda
Póngase en contacto inmediatamente con su médico si tiene dolor grave y persistente en la zona del estómago. Esto puede indicar pancreatitis aguda (inflamación del páncreas). Consulte la sección 4 para conocer los signos de advertencia de una inflamación del páncreas.

Bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia)

Si utiliza este medicamento junto con un derivado de sulfonilurea o insulina, puede aumentar el riesgo de tener un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia). Consulte la sección 4 para conocer los signos de advertencia de un nivel bajo de azúcar en sangre. Su médico puede pedirle que controle su nivel de azúcar en sangre. Esto ayudará a su médico a decidir si se debe ajustar la dosis del derivado de sulfonilurea o de la insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia.

Enfermedad ocular diabética (retinopatía)

Si tiene una enfermedad ocular como consecuencia de la diabetes y utiliza insulina, este medicamento puede provocar un empeoramiento de su visión, lo que podría requerir tratamiento. Informe a su médico si tiene una enfermedad ocular diabética o si experimenta problemas oculares durante el tratamiento con este medicamento. Si tiene una posible enfermedad ocular diabética inestable, no se recomienda el uso de Ozempic 2 mg.

Cambios repentinos en su visión

Si de repente deja de ver o ve menos durante el tratamiento con este medicamento, póngase en contacto inmediatamente con su médico para obtener asesoramiento. Esto podría ser causado por un efecto secundario muy raro llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) (ver sección 4: Efectos secundarios graves). Su médico puede derivarlo a un examen ocular y es posible que deba interrumpir el tratamiento con este medicamento.

Niños y adolescentes hasta 18 años

Este medicamento no se recomienda para niños y adolescentes menores de 18 años porque la seguridad y eficacia en este grupo de edad no han sido establecidas.

¿Está tomando otros medicamentos?

¿Está tomando otros medicamentos además de Ozempic, lo ha hecho recientemente o existe la posibilidad de que tome otros medicamentos pronto? Informe a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los medicamentos a base de hierbas u otros medicamentos que haya comprado sin receta.

Informe a su médico, farmacéutico o enfermero especialmente si está tomando medicamentos que contengan alguna de las siguientes sustancias activas:

Warfarina u otros medicamentos similares que se toman por vía oral para prevenir la coagulación de la sangre (anticoagulantes orales). Es posible que deba hacerse pruebas de sangre con más frecuencia para controlar la rapidez con la que su sangre coagula.

O si está usando insulina. Su médico le indicará cómo reducir la dosis de insulina y le recomendará que controle su nivel de azúcar en sangre con más frecuencia para prevenir la hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre) y la cetoacidosis diabética (una complicación de la diabetes que ocurre cuando el cuerpo no puede descomponer la glucosa porque no hay suficiente insulina).

Embarazo y lactancia

¿Está embarazada, cree que podría estarlo, desea quedar embarazada o está amamantando? Póngase en contacto con su médico antes de usar este medicamento.

Este medicamento no debe usarse durante el embarazo ya que no se sabe si es perjudicial para el bebé no nacido. Por lo tanto, se recomienda el uso de anticonceptivos durante el uso de este medicamento. Si desea quedar embarazada, consulte con su médico cómo debe ajustarse el tratamiento, ya que debe dejar de usar este medicamento al menos 2 meses antes. Si queda embarazada mientras usa este medicamento, póngase en contacto con su médico de inmediato, ya que su tratamiento debe cambiarse.

No use este medicamento si está amamantando, ya que no se sabe si pasa a la leche materna.

Aptitud para conducir y el uso de máquinas

Es poco probable que Ozempic afecte su capacidad para conducir y operar máquinas. Si usa este medicamento en combinación con una sulfonilurea o insulina, puede experimentar niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia), lo que puede disminuir su capacidad de concentración. No conduzca ni use máquinas si experimenta síntomas de niveles bajos de azúcar en sangre. Consulte la sección 2 '¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?' para obtener información sobre el mayor riesgo de niveles bajos de azúcar en

sangre y la sección 4 para los síntomas de advertencia de niveles bajos de azúcar en sangre. Comuníquese con su médico para obtener más información.

Ozempic contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, esencialmente 'libre de sodio'.

3. ¿Cómo usar este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico le haya indicado. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

¿Cuánto de este medicamento debo usar?

La dosis inicial es de 0,25 mg una vez por semana, durante cuatro semanas.

Después de cuatro semanas, su médico aumentará la dosis a 0,5 mg una vez por semana.

Si su nivel de azúcar en sangre no está suficientemente controlado con una dosis de 0,5 mg una vez por semana, su médico podría aconsejarle aumentar la dosis a 1 mg una vez por semana.

Si su nivel de azúcar en sangre no está suficientemente controlado con una dosis de 1 mg una vez por semana, su médico podría aconsejarle aumentar la dosis a 2 mg una vez por semana.

No cambie su dosis a menos que su médico se lo indique.

¿Cómo se administra este medicamento?

Ozempic se administra como una inyección subcutánea. Inyecte el no en una vena o músculo.

Los mejores lugares para inyectar son la parte frontal de sus muslos, la parte frontal de su cintura (abdomen) o su parte superior del brazo.

Antes de usar el bolígrafo por primera vez, su médico o enfermero le mostrará cómo usarlo.

Las instrucciones detalladas para el uso se encuentran en la parte posterior de este prospecto.

¿Cuándo debe usar este medicamento?

Use este medicamento una vez por semana, si es posible cada semana en el mismo día.

Puede inyectarse en cualquier momento del día, independientemente de las comidas.

Para ayudarle a recordar que debe inyectarse este medicamento solo una vez por semana, se recomienda anotar el día de la semana elegido (por ejemplo, un miércoles) en la caja y cada vez que se inyecte este medicamento escribir la fecha en la caja.

Si es necesario, puede cambiar el día de su inyección semanal de este medicamento, siempre que sea al menos 3 días después de su última inyección de este medicamento. Después de seleccionar un nuevo día de dosificación, la dosificación debe continuar una vez por semana.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

Póngase en contacto inmediatamente con su médico si ha usado más Ozempic de lo que debería. Puede experimentar efectos secundarios, como náuseas.

¿Ha olvidado usar este medicamento?

Si olvida inyectarse una dosis y:

han pasado 5 días o menos desde que debería haber usado Ozempic, úselo tan pronto como lo recuerde. Luego inyecte su próxima dosis como de costumbre en su día programado.

han pasado más de 5 días desde que debería haber usado Ozempic, omita la dosis olvidada. Luego inyecte su próxima dosis como de costumbre en su día programado.

No use una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Si deja de usar este medicamento

No deje de usar este medicamento sin discutirlo con su médico. Si deja de usarlo, su nivel de azúcar en sangre puede aumentar.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos secundarios graves

Frecuente (afecta a menos de 1 de cada 10 usuarios)

complicaciones de la enfermedad ocular diabética (retinopatía) – informe a su médico si experimenta problemas oculares durante el tratamiento con este medicamento, como cambios en la visión.

Poco frecuente (afecta a menos de 1 de cada 100 usuarios)

inflamación del páncreas (pancreatitis aguda), que puede causar dolor intenso y persistente en el abdomen y la espalda. Debe contactar a su médico de inmediato si experimenta estos síntomas.

Raro (afecta a menos de 1 de cada 1,000 usuarios)

reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas, angioedema). Busque ayuda médica de inmediato e informe a su médico lo antes posible si presenta síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta con dificultad para tragar y un ritmo cardíaco rápido.

Muy raro (afecta a menos de 1 de cada 10,000 usuarios)

una afección médica del ojo llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) que puede hacer que, sin dolor alguno, vea menos o nada con uno de sus ojos. Contacte a su médico de inmediato si nota que de repente no ve nada o ve menos gradualmente (ver sección 2: 'Cambios repentinos en su visión').

Desconocido (no puede determinarse con los datos disponibles)

Obstrucción intestinal. Una forma grave de obstrucción con síntomas como dolor abdominal, hinchazón, vómitos, etc.

Otros efectos secundarios

Muy frecuente (afecta a más de 1 de cada 10 usuarios)

náuseas – generalmente desaparecen después de un tiempo

diarrea – generalmente desaparece después de un tiempo

bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia), si este medicamento se usa junto con medicamentos que contienen un derivado de sulfonilurea o insulina

Frecuente (afecta a menos de 1 de cada 10 usuarios)

vómitos

bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia), si este medicamento se utiliza junto con medicamentos antidiabéticos orales distintos de los derivados de sulfonilurea o insulina

Los síntomas de advertencia de un bajo nivel de azúcar en sangre pueden aparecer de repente. Estos pueden incluir: sudor frío, piel fría y pálida, dolor de cabeza, ritmo cardíaco rápido, náuseas o sentir mucha hambre, cambios en la visión, sentirse somnoliento o débil, sentirse nervioso, ansioso o confundido, tener dificultad para concentrarse o temblores. Su médico le indicará cómo tratar el bajo nivel de azúcar en sangre y qué hacer si experimenta estos síntomas de advertencia.

Es más probable que ocurra un bajo nivel de azúcar en sangre si también está usando un derivado de sulfonilurea o insulina. Su médico puede reducir la dosis de estos medicamentos antes de que comience a usar este medicamento.

trastorno digestivo (indigestión)

estómago inflamado (gastritis) – los síntomas incluyen dolor de estómago, náuseas o vómitos

reflujo o acidez estomacal – también conocido como enfermedad por reflujo

gastroesofágico (ERGE)

dolor abdominal

hinchado sensación en el abdomen

estreñimiento

eructos

cálculos biliares

mareo

fatiga

pérdida de peso

menos apetito

formación de gases (flatulencia)

aumento de enzimas pancreáticas (como lipasa y amilasa)

dolor de cabeza.

A veces (ocurren en menos de 1 de cada 100 usuarios)

la comida o bebida sabe diferente de lo normal

pulso rápido

reacciones en el lugar de la inyección, como moretones, dolor, irritación, picazón y erupción cutánea

reacciones alérgicas como erupción cutánea, picazón o urticaria
los alimentos permanecen más tiempo de lo normal en el estómago (vaciamiento gástrico retardado).

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, comuníquese con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto también se aplica a posibles efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del sistema nacional de notificación como se menciona en el apéndice V. Al informar sobre efectos secundarios, puede ayudarnos a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad. Esta se encuentra en la etiqueta del bolígrafo y en la caja de cartón después de EXP. Se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.

Antes de usar:

Conservar en el refrigerador (2°C–8°C). No congelar. Mantener alejado del elemento refrigerante. Mantenga la tapa del bolígrafo en el bolígrafo para protegerlo de la luz.

Después de usar:

Ozempic 0,5 mg (4 dosis bolígrafo)

Si almacena el bolígrafo por debajo de 30°C o en el refrigerador (2°C–8°C) (no cerca del elemento refrigerante), puede conservarlo durante 6 semanas. No congele Ozempic. Si el medicamento ha estado congelado, no debe usarse.

Ozempic 0,5 mg (8 dosis bolígrafo)

Si almacena el bolígrafo por debajo de 30°C o en el refrigerador (2°C–8°C) (no cerca del elemento refrigerante), puede conservarlo durante 8 semanas. No congele Ozempic. Si el medicamento ha estado congelado, no debe usarse.

Guarde el bolígrafo cuando no lo use con la tapa puesta para protegerlo de la luz.

No use este medicamento si nota que la solución no es clara e incolora o casi incolora.

No tire los medicamentos por el desagüe o en el inodoro y no los deseche en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Si desecha los medicamentos de manera adecuada, se destruyen de manera responsable y no llegan al medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

¿Qué sustancias contiene este medicamento?

La sustancia activa de este medicamento es semaglutida.

1,5 ml: Un ml de solución para inyección contiene 1,34 mg de semaglutida. Una pluma precargada contiene 2 mg de semaglutida en 1,5 ml de solución. Cada dosis contiene 0,5 mg de semaglutida en 0,37 ml.

3 ml: Un ml de solución para inyección contiene 0,68 mg de semaglutida. Una pluma precargada contiene 2 mg de semaglutida en 3 ml de solución. Cada dosis contiene 0,5 mg de semaglutida en 0,74 ml.

3 ml: Un ml de solución para inyección contiene 1,34 mg de semaglutida. Una pluma precargada contiene 4 mg de semaglutida en 3 ml de solución. Cada dosis contiene 0,5 mg de semaglutida en 0,37 ml.

Los otros componentes de este medicamento son: dihidrogenofosfato de disodio, propilenglicol, fenol, agua para inyecciones, ácido clorhídrico/hidróxido de sodio (para ajuste de pH). Véase también sección 2, 'Ozempic contiene sodio'.

¿Cómo se presenta Ozempic y cuánto contiene cada envase?

Ozempic es una solución inyectable clara e incolora o casi incolora en una pluma precargada.

1,5 ml: Cada pluma precargada contiene 1,5 ml de solución, destinada a 4 dosis de 0,5 mg.

3 ml: Cada pluma precargada contiene 3 ml de solución, destinada a 4 dosis de 0,5 mg. 3 ml:

Cada pluma precargada contiene 3 ml de solución, destinada a 8 dosis de 0,5 mg.

Ozempic 0,5 mg solución para inyección está disponible en los siguientes tamaños de envase:

1 pluma y 4 agujas desechables NovoFine Plus.

1 pluma y 8 agujas desechables NovoFine Plus.

3 plumas y 12 agujas desechables NovoFine Plus.

No todos los tamaños de envase mencionados se comercializan.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dinamarca

Este prospecto fue aprobado por última vez en

Otras fuentes de información

Más información sobre este medicamento está disponible en el sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos: <http://www.ema.europa.eu>.

Instrucciones de uso

Ozempic 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada y proporciona 4 dosis de semaglutida

Instrucciones para el uso de Ozempic 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar su pluma precargada de Ozempic. Consulte con su médico, enfermero o farmacéutico sobre cómo inyectar correctamente Ozempic.

Comience revisando su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic 0,5 mg. Luego, observe las imágenes a continuación para familiarizarse con las diferentes partes de su pluma y aguja.

Si es ciego o tiene problemas de visión y no puede leer la ventana de dosis en la pluma, no use esta pluma sin ayuda. Pida ayuda a una persona con buena visión que sepa cómo usar la pluma precargada de Ozempic.

Su pluma es una pluma precargada con un botón giratorio para ajustar la dosis. La pluma contiene 2 mg de semaglutida y solo puede seleccionar dosis de 0,5 mg. Una pluma sin usar contiene cuatro dosis de 0,5 mg.

Use la tabla en el interior de la tapa de la caja para llevar un registro de cuántas inyecciones ha tenido y cuándo las ha administrado.

Su pluma está diseñada para usarse con agujas desechables de 30G, 31G y 32G con una longitud máxima de 8 mm. Las agujas NovoFine Plus se incluyen en el paquete.

Nota: Su pluma puede tener un tamaño diferente al de la pluma que se muestra en la imagen. Estas instrucciones se aplican a todas las plumas de Ozempic 0,5 mg.

Importante información

Preste especial atención a estas notas porque son importantes para el uso seguro de la pluma.

1. Colocar una nueva aguja en su pluma

Verifique el nombre y la etiqueta de color de su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic 0,5 mg. Esto es especialmente importante si usa más de un tipo de medicamento inyectable. El uso de un medicamento incorrecto puede ser perjudicial para su salud.

Retire la tapa de la pluma.

Verifique que la solución en la pluma sea clara e incolora. Mire a través de la ventana de la pluma. Si la solución se ve turbia o coloreada, no debe usar la pluma.

Tome una nueva aguja.

Verifique la placa de papel y la tapa exterior de la aguja en busca de daños, ya que pueden afectar la esterilidad. Use una nueva aguja si observa algún daño.

Retire el papel cubierta.

Asegúrese de fijar correctamente la aguja.

Presione la aguja directamente sobre el bolígrafo.

Gire esta firmemente.

La aguja tiene una tapa y un capuchón. Debe quitar ambos. Si no los quita, no inyectará la solución.

Retire la tapa exterior de la aguja y guárdela para su uso posterior. La necesitará después de la inyección para retirar la aguja del bolígrafo de manera segura.

Retire el capuchón interior de la aguja y deséchelo. Si intenta volver a colocarlo, podría pincharse accidentalmente con la aguja.

Una gota de solución puede aparecer en la punta de la aguja. Esto es normal, pero aún debe verificar el flujo si está usando un nuevo bolígrafo por primera vez. Vea el paso 2 'Verifique el flujo con cada nuevo bolígrafo'.

Coloque una nueva aguja en el bolígrafo solo cuando esté listo para administrar la inyección.

Use siempre una nueva aguja para cada inyección.

Así se pueden prevenir agujas obstruidas, contaminación, infección, fugas de la solución y dosificación inexacta. doseren worden voorkomen.

Nunca use una aguja doblada o dañada.

2. Verifique el flujo con cada nuevo bolígrafo

Si su bolígrafo ya está en uso, pase al paso 3 'Configurar su dosis'. Verifique el flujo solo antes de su primera inyección con cada nuevo bolígrafo. Draai de dosisinstelknop naar de controlestreep (

* * =)directamente después de '0'. Asegúrese de que la línea de control esté alineada con la flecha indicadora de dosis. Sostenga el bolígrafo con la aguja apuntando hacia arriba.

Mantenga el bolígrafo con la aguja apuntando hacia arriba.

Puede quedar una pequeña gota en la punta de la aguja, pero no se inyectará.

Si no aparece una gota, repita el paso 2 'Verifique el flujo con cada nuevo bolígrafo' un máximo de 6 veces. Si aún no aparece una gota, reemplace la aguja y repita el paso 2 'Verifique el flujo con cada nuevo bolígrafo' una vez más.

Deseche el bolígrafo y use uno nuevo si aún no aparece una gota de solución.

Siempre verifique que aparezca una gota en la punta de la aguja antes de usar un nuevo bolígrafo por primera vez. Así se asegura de que la solución fluya.

Si no aparece una gota, no inyecte el medicamento, incluso si aparece otro número en la ventana de lectura de dosis. Esto puede indicar una aguja obstruida o dañada.

Si no aparece una gota, no inyecte el medicamento, incluso si aparece otro número en la ventana de lectura de dosis. Esto puede indicar una aguja obstruida o dañada.

Si no verifica el suministro antes de cada primera inyección con un nuevo bolígrafo, es posible que no reciba la dosis prescrita y el efecto deseado de Ozempic puede no ocurrir.

3. Configurar de su dosis

Gire el selector de dosis para ajustar a 0,5 mg. Continúe girando hasta que la ventana de lectura de dosis se detenga y muestre 0,5 mg.

Solo la ventana de lectura de dosis y la flecha indicadora de dosis indican que se ha ajustado a 0,5 mg. Solo puede ajustar a 0,5 mg por dosis. Si su bolígrafo contiene menos de 0,5 mg, la ventana de lectura de dosis se detendrá antes de que se muestre 0,5.

El selector de dosis hace un sonido de clic diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o más allá de 0,5 mg. No cuente el número de clics del bolígrafo
El botón de ajuste de dosis emite un sonido de clic diferente cuando se gira hacia adelante, hacia atrás o más allá de 0,5 mg. No cuente el número de clics del bolígrafo.

Antes de inyectar este medicamento, utilice siempre la ventana de lectura de dosis y la flecha indicadora de dosis para el número de clics del bolígrafo.

No contar ¿Cuánta solución queda?

Para ver cuánta solución queda, use la ventana de lectura de dosis: gire el selector de dosis hasta que

la ventana de lectura de dosis se detenga.

Para ver cuánta solución queda, use la ventana de lectura de dosis: gire el botón de ajuste de dosis hasta la ventana de lectura de dosis se detiene.

Si se muestra 0,5, entonces hay al menos 0,5 mg en su pluma.

Si la ventana de dosis se detiene antes de indicar 0,5 mg, no hay suficiente solución para una dosis completa de 0,5 mg.

Si no hay suficiente solución en su pluma para una dosis completa, no use la pluma. Use una nueva pluma de Ozempic.

4. Inyectar su dosis

Inserte la aguja en su piel de la manera que su médico o enfermero le ha mostrado. Asegúrese de poder ver la ventana de dosis. No la cubra con los dedos. Esto puede la inyección ser interrumpido.

Presione el botón de administración y manténgalo presionado. Observe cómo la ventana de lectura de dosis vuelve a '0'. El número '0' debe estar alineado con la flecha indicadora de dosis. Usted escucha o siente ahora posiblemente un clic ..

Cuente lentamente hasta 6 mientras mantiene el bo

tón de administración presionado. Si la aguja se retira de la piel antes, puede ver un chorro de solución salir de la punta de la aguja.

Si la aguja se retira antes de la piel, puede ver un chorro de solución salir de la punta de la aguja. ese ese caso es no la completa dosis inyectada.

Retire la aguja de su piel. Puede soltar el botón de administración. Si el lugar de la inyección sangra, presione suavemente.

Después de inyectar, puede ver una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal y no afecta su dosis.

Siempre mire la ventana de lectura de dosis para saber cuántos mg está inyectando. Mantenga presionado el botón de administración hasta que la ventana de lectura de dosis vuelva a '0'.

Cómo reconocer una aguja obstruida o dañada

- Si después de presionar continuamente el botón de administración la ventana de lectura de dosis no llega a '0', es posible que haya usado una aguja obstruida o dañada.
- En ese caso, no ha recibido ningún medicamento, incluso si el número en la ventana de lectura de dosis ha cambiado con respecto a la dosis que originalmente había configurado.

Cómo manejar una aguja obstruida

Reemplace la aguja como se describe en el paso 5 'Después de su inyección' y repita todos los pasos desde el paso 1 'Colocar una nueva aguja en su pluma'. Asegúrese de que la dosis que necesita esté ajustada.

No toque la ventana de lectura de dosis durante la inyección. Esto puede interrumpir la inyección.

5. Después de su inyección

Después de cada inyección, siempre retire la aguja y deséchela para facilitar la inyección y evitar que la aguja se obstruya. Si la aguja está obstruida, no se inyectará ningún medicamento.

Coloque el capuchón exterior de la aguja sobre una superficie plana y guíe la punta de la aguja en él, sin tocar la aguja o el capuchón con los dedos.

Cuando la aguja esté cubierta, presione suavemente el capuchón exterior de la aguja completamente sobre la aguja.

Desenrosque la aguja y deséchela cuidadosamente como le haya indicado su médico, enfermero, farmacéutico o las autoridades locales.

Coloque la tapa de la pluma de nuevo en su pluma después de cada uso, para proteger la solución de la luz.

Si la pluma está vacía, deséchela sin una aguja según las instrucciones de su médico, enfermero, farmacéutico o las autoridades locales.

Nunca intente volver a colocar el capuchón interior de la aguja. Podría pincharse con la aguja. Siempre retire inmediatamente la aguja de su pluma después de cada inyección. Esto puede prevenir agujas obstruidas, contaminación, infección, fuga de la solución y dosificación inexacta.

Mantenimiento de su pluma

Trate su pluma con el cuidado necesario. El manejo brusco o el uso incorrecto pueden causar una dosificación inexacta. En ese caso, el efecto deseado de este medicamento puede no lograrse.

No deje la pluma en un coche u otro lugar donde haga demasiado calor o demasiado puede estar frío.

No debe inyectar Ozempic que ha estado congelado. Si lo hace, el efecto deseado de este medicamento puede no ocurrir.

No debe inyectar Ozempic que ha estado expuesto a la luz solar directa. Si lo hace, el efecto deseado de este medicamento puede no ocurrir.

No esponga su pluma a polvo, suciedad o humedad.

No lave, sumerja ni lubrique su pluma. La pluma se puede limpiar con un detergente suave en un paño húmedo.

No deje caer su pluma ni la golpee contra una superficie dura. Si deja caer la pluma o sospecha un problema, debe colocar una nueva aguja y verificar el suministro antes de inyectar.

No intente rellenar su pluma. Una vez que la pluma esté vacía, debe desecharse.

No intente reparar o desarmar su pluma.

Instrucciones de uso

Ozempic 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada y proporciona 8 dosis semaglutida

Instrucciones para el uso de Ozempic 0,5 mg solución para inyección en una pluma precargada

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar su pluma precargada de Ozempic. Hable con su médico, enfermero o farmacéutico sobre cómo inyectar correctamente Ozempic.

Comience revisando su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic 0,5 mg. Luego, observe las imágenes a continuación para familiarizarse con las diferentes partes de su pluma y aguja.

Si es ciego o tiene problemas de visión y no puede leer la ventana de dosis en la pluma, no use esta pluma sin ayuda. Pida ayuda a una persona con buena visión que sepa cómo usar la pluma precargada de Ozempic.

Su pluma es una pluma precargada con un botón giratorio para ajustar la dosis. La pluma contiene 4 mg de semaglutida y solo puede seleccionar dosis de 0,5 mg. Una pluma no utilizada contiene ocho dosis de 0,5 mg.

Después de inyectar las dosis previstas, quedará solución en la pluma. La pluma debe desecharse.

Use la tabla en el interior de la tapa de la caja para llevar un registro de cuántas inyecciones ha recibido y cuándo ha administrado las inyecciones.

Su pluma está diseñada para usarse con agujas desechables de 30G, 31G y 32G con una longitud máxima de 8 mm. Las agujas NovoFine Plus se incluyen en el paquete.

Información importante

Preste especial atención a estas notas porque son importantes para el uso seguro de la pluma.

1. Colocar una nueva aguja en su pluma

Verifique el nombre y la etiqueta de color de su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic 0,5 mg. Esto es especialmente importante si usa más de un tipo de medicamento inyectable. El uso de un medicamento incorrecto puede ser perjudicial para su salud.

Retire la tapa de la pluma.

Verifique que la solución en la pluma sea clara e incolora. Mire a través de la ventana de la pluma. Si la solución parece turbia o coloreada, no debe usar la pluma.

Tome una nueva aguja.

Revise la cubierta de papel y la tapa exterior de la aguja para detectar daños, ya que pueden afectar la esterilidad. Use una nueva aguja si hay algún daño visible.

Retire el papel cubierta.

Asegúrese de que fija correctamente la aguja.

Presione la aguja directamente en el bolígrafo.

Gire esto firmemente.

La aguja tiene una tapa y un capuchón. Debe quitar ambos. Si no quita ambos, entonces no inyectará solución.

Retire la tapa exterior de la aguja y guárdela para su uso posterior. La necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la pluma de manera segura.

Retire la tapa interior de la aguja y deséchela. Si intenta volver a colocarla, podría pincharse accidentalmente con la aguja. *uk aan de naald kunnen prikken.*

Una gota de solución puede aparecer en la punta de la aguja. Esto es normal, pero aún debe verificar el flujo si está usando un nuevo bolígrafo por primera vez. Vea el paso 2 'Verifique el flujo en cada nuevo bolígrafo'. *ij elke nieuwe pen de toevoer'.*

Coloque una nueva aguja en el bolígrafo solo cuando esté listo para administrar la inyección.

Gebruik voor elke in Siempre use una nueva aguja para cada inyección.

Esto puede prevenir agujas obstruidas, contaminación, infección, fuga de solución y dosificación inexacta.

Nunca use una aguja doblada o dañada.

2. Controleer bij elke nieuwe pen de toevoer

Si su bolígrafo ya está en uso, vaya al paso 3 'Configure su dosis'. Verifique el flujo solo antes de su primera inyección con cada nuevo bolígrafo. *inyección con cada nuevo bolígrafo.*

Gire el botón de ajuste de dosis hacia la línea de control () justo después de '0'.

Verifique que la línea de control esté alineada con la flecha indicadora de dosis.

Mantenga la pluma con la aguja apuntando hacia arriba.

Er kan een kleine druppel aan de naaldpunt achterblijven, ma

ar die wordt niet geïnjecteerd. ar que no se inyecta.
pen de toevoer' maximaal 6 keer. Als er nog steeds geen druppel verschijnt, vervangt u de
naald en herhaalt u stap 2 'Controleer bij elke nieuabrimos el suministro una vez más.
Deseche la pluma y use una nueva si aún no aparece una gota de solución.

Siempre verifique que aparezca una gota en la punta de la aguja antes de usar una nueva
pluma por primera vez. Así sabrá con certeza que la solución fluye.

Si no aparece una gota, no inyectará medicamento, incluso si aparece otro número en la
ventana de lectura de dosis. Esto puede indicar una aguja obstruida o dañada.

Si no verifica el suministro antes de cada primera inyección con una nueva pluma, es posible
que no reciba la dosis prescrita y el efecto deseado de Ozempic puede no ocurrir.

3. Configuración de su dosis

Gire el botón de ajuste de dosis para establecer 0,5 mg. Siga girando hasta que la ventana de
lectura de dosis se detenga y muestre 0,5 mg.

Solo la ventana de lectura de dosis y la flecha indicadora de dosis indican que se ha
establecido 0,5 mg.

Solo puede establecer 0,5 mg por dosis. Si su pluma contiene menos de 0,5 mg, la ventana
de lectura de dosis se detiene antes de que se muestre 0,5.

El botón de ajuste de dosis hace un sonido de clic diferente cuando se gira hacia adelante,
hacia atrás o más allá de 0,5 mg. No cuente el número de clics de la pluma.

Antes de inyectar este medicamento, siempre use la ventana de lectura de dosis y la flecha
indicadora de dosis para ver que se ha establecido 0,5 mg. No cuente
el número de clics de la pluma. el número de clics del bolígrafo.

¿Cuánta solución queda?

¿Cuánta solución queda?

Para ver cuánta solución queda, use la ventana de lectura de dosis: gire el botón de
ajuste de dosis hasta que la ventana de lectura de dosis se detenga.

Si se muestra 0,5, entonces queda al menos 0,5 mg en su pluma.

Si la ventana de lectura de dosis se detiene antes de indicar 0,5 mg, no hay suficiente
solución para una dosis completa de 0,5 mg.

Si no hay suficiente solución en su pluma para una dosis completa, no use la pluma. Use una
nueva pluma de Ozempic.

4. Su dosis inyectar

Inserte la aguja en su piel de la manera que su médico o enfermero le ha mostrado.
Asegúrese de que pueda ver la ventana de lectura de dosis. No la cubra con los dedos.
Esto puede la inyección ser interrumpido.

Presione el botón de administración y manténgalo presionado. Observe cómo la
ventana de lectura de dosis vuelve a '0'. El número '0' debe estar alineado con la flecha
indicadora de dosis. U escucha of siente ahora posiblemente un clic.

Siga presionando el botón de administración mientras mantiene la aguja en su piel.

Cuente lentamente hasta 6 mientras mantiene el botón de administración presionado.

Si la aguja se retira de la piel antes, puede ver un chorro de solución salir de la punta de la aguja. En que caso es no la dosis completa inyectada.

Retire la aguja de su piel. Puede soltar el botón de administración.

Si el lugar de la inyección sangra, presione suavemente.

Después de inyectar, puede ver una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal y no afecta su dosis.

Siempre mire la ventana de lectura de dosis para saber cuántos mg está inyectando. Mantenga presionado el botón de administración hasta que la ventana de lectura de dosis vuelva a '0'.

Cómo reconocer una aguja obstruida o dañada

- Si después de presionar continuamente el botón de administración la ventana de lectura de dosis no llega a '0', es posible que haya usado una aguja obstruida o dañada.
- En ese caso, no ha recibido ningún medicamento, incluso si el número en la ventana de lectura de dosis ha cambiado con respecto a la dosis que había configurado originalmente.

Cómo actuar en caso de una aguja obstruida Reemplace la aguja como se describe en el paso 5 'Después de su inyección' y repita todos los pasos desde el paso 1 'Colocar una nueva aguja en su pluma'. Asegúrese de establecer la dosis completa que necesita.

No toque la ventana de lectura de dosis durante la inyección. Esto puede interrumpir la inyección.

5. Después de su inyección

Después de cada inyección, siempre retire la aguja y deséchela para facilitar la inyección y evitar que la aguja se obstruya. Si la aguja está obstruida, no se inyectará medicamento.

Coloque la tapa exterior de la aguja sobre una superficie plana y guíe la punta de la aguja en ella, sin tocar la aguja o la tapa con los dedos.

Cuando la aguja esté cubierta, presione suavemente la tapa exterior completamente sobre la aguja.

Desenrosque la aguja y deséchela cuidadosamente como le haya indicado su médico, enfermero, farmacéutico o autoridades locales.

Coloque la tapa de la pluma de nuevo en su pluma después de cada uso, para proteger la solución de la luz.

Si la pluma está vacía, deséchela sin una aguja según las instrucciones de su médico, enfermero, farmacéutico o autoridades locales.

Nunca intente volver a colocar la tapa interior de la aguja. Podría pincharse con la aguja. siempre retire inmediatamente la aguja de su pluma después de cada inyección. Así se pueden evitar agujas obstruidas, contaminación, infección, fuga de la solución y dosificación inexacta. Así se pueden prevenir agujas obstruidas, contaminación, infección, fuga de la solución y dosificación inexacta.

importantes importante información

Mantenga su pluma y agujas siempre fuera de la vista y el alcance de otros, especialmente de los niños.

Nunca comparta su pluma o sus agujas con otras personas.

Los cuidadores deben ser muy cuidadosos al manejar agujas usadas para evitar accidentes por pinchazos y contaminación cruzada.

Mantenimiento de su pluma

Trate su pluma con el cuidado necesario. Un manejo brusco o un uso incorrecto puede causar una dosificación inexacta. En ese caso, el efecto deseado de este medicamento puede no lograrse.

No deje la pluma en un coche u otro lugar donde pueda estar demasiado caliente o demasiado frío.

No debe inyectar Ozempic que haya estado congelado. Si lo hace, el efecto deseado de este medicamento puede no lograrse.

No debe inyectar Ozempic que haya estado expuesto a la luz solar directa. Si lo hace, el efecto deseado de este medicamento puede no lograrse.

No exponga su pluma al polvo, suciedad o humedad.

No lave, sumerja o lubrique su pluma. La pluma puede limpiarse con un detergente suave en un paño húmedo.

No deje caer su pluma ni la golpee contra una superficie dura. Si deja caer la pluma o sospecha un problema, debe colocar una nueva aguja y verificar el suministro antes de inyectar.

No intente volver a llenar su pluma. Una vez que la pluma esté vacía, debe desecharse.

No intente reparar o desarmar su pluma.