

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Ozempic 0,5 mg tirpalas injekcijai užpildytame švirkšte  
semaglutidas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jei turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė kuri nors iš 4 skyriuje nurodytų šalutinių poveikių? Arba ar pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Turinys iš šio pakuotės lapelio

1. Kas yra Ozempic ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Ozempic ir kam šis vaistas vartojamas?

Veiklioji medžiaga Ozempic yra semaglutidas. Jis padeda sumažinti cukraus kiekį kraujyje tik tada, kai cukraus kiekis yra per didelis, ir gali padėti išvengti širdies ligų pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu. Taip pat gali padėti sulėtinti inkstų funkcijos blogėjimą pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu, daugiau nei tik sumažinant cukraus kiekį kraujyje.

Ozempic vartojamas suaugusiųjų (nuo 18 metų ir vyresnių) 2 tipo cukrinio diabeto gydymui, kai dieta ir fizinis aktyvumas nėra pakankami:

kaip vienintelis gydymas – kai negalite vartoti metformino (kito vaisto nuo diabeto) arba

su kitais vaistais nuo diabeto – jei jie nepakankamai reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai gali būti vaistai, kuriuos vartojate per burną (oraliniu būdu) arba injekcijomis, kaip insulinas.

Svarbu, kad tęstumėte savo dietą ir fizinį aktyvumą, kaip nurodė jūsų gydytojas, vaistininkas ar slaugytoja.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoja.

Šis vaistas nėra tas pats kaip insulinas ir jo negalima vartoti, jei:

sergate 1 tipo cukriniu diabetu – būkle, kai jūsų kūnas negamina insulino  
jums išsivystė diabetinė ketoacidozė – diabeto komplikacija su aukštu cukraus kiekiu  
kraujyje, sunkumu kvėpuoti, sumišimu, per dideliu troškuliu, saldžiu kvapu iš burnos  
arba saldžiu ar metaliniu skoniu burnoje.

Ozempic nėra insulinas ir todėl negali būti naudojamas kaip insulino pakaitalas.

Jei žinote, kad jums bus atliekama operacija, kurios metu būsite laikomas narkoze (miegosite), pasakykite savo gydytojui, kad vartojate Ozempic.

Poveikis virškinimo sistemai

Gydymo šiuo vaistu metu galite jausti pykinimą, vėmimą ar viduriavimą. Šalutinis poveikis gali sukelti dehidrataciją (skysčių netekimą). Svarbu gerti daug skysčių, kad išvengtumėte dehidratacijos. Tai ypač svarbu, jei turite inkstų problemų. Jei turite klausimų ar nerimaujate, kreipkitės į savo gydytoją.

Sunkus ir nuolatinis pilvo skausmas, kuris gali būti ūminio pankreatito pasekmė  
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei jaučiate stiprų ir nuolatinį skausmą pilvo srityje. Tai gali rodyti ūminį pankreatitą (kasos uždegimą). Žr. 4 skyrių dėl kasos uždegimo įspėjamųjų požymių.

Mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija)

Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamido dariniu ar insulinu, tai gali padidinti mažo cukraus kiekio kraujyje (hipoglikemijos) riziką. Žr. 4 skyrių dėl mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamųjų požymių. Gydytojas gali paprašyti jus stebėti cukraus kiekį kraujyje. Tai padės gydytojui nuspręsti, ar reikia koreguoti sulfonilkarbamido darinio ar insulino dozę, siekiant sumažinti mažo cukraus kiekio riziką.

Diabetinė akių liga (retinopatija)

Jei turite akių ligą dėl diabeto ir vartojate insuliną, šis vaistas gali pabloginti jūsų regėjimą, kas gali reikalauti gydymo. Informuokite gydytoją, jei turite diabetinę akių ligą arba jei gydymo šiuo vaistu metu patiriate akių problemas. Jei turite galimai nestabilią diabetinę akių ligą, Ozempic 2 mg vartojimas nerekomenduojamas.

Staigūs regėjimo pokyčiai

Jei staiga nieko nematote arba greitai prarandate regėjimą gydymo šiuo vaistu metu, nedelsdami kreipkitės į gydytoją patarimo. Tai gali būti labai reta šalutinė reakcija, vadinama neareritine priekinės išeminės optinės neuropatijos (NAION) (žr. 4 skyrių: Sunkios šalutinės reakcijos). Gydytojas gali jus nukreipti akių tyrimui ir galbūt reikės nutraukti gydymą šiuo vaistu.

Vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams ir jaunuoliams iki 18 metų, nes šios amžiaus grupės saugumas ir veiksmingumas dar nėra nustatyti.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Ozempic, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad netrukus vartosite kitus vaistus? Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui. Tai taip pat taikoma vaistažolių preparatams ar kitiems vaistams, kuriuos įsigijote be recepto.

Pasakykite savo gydytojui, vaistininkui ar slaugytojai, ypač jei vartojate vaistus, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų:

Varfarinas ar kiti panašūs, per burną vartojami vaistai, kurie slopina kraujo krešėjimą (geriamieji antikoagulantai). Jūsų kraujas gali būti dažniau tiriamas, kad būtų patikrinta, kaip greitai jis kreša.

Arba jei vartojate insuliną. Gydytojas jums pasakys, kaip sumažinti insulino dozę ir patars dažniau tikrinti cukraus kiekį kraujyje, kad išvengtumėte hiperglikemijos (didelio cukraus kiekio kraujyje) ir diabetinės ketoacidozės (diabeto komplikacijos, kai organizmas negali suskaidyti gliukozės dėl nepakankamo insulino kiekio).

Nėštumas ir žindymas

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, norite pastoti ar žindote? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju.

Šis vaistas neturėtų būti vartojamas nėštumo metu, nes nežinoma, ar jis kenkia negimusiam kūdikiui. Todėl rekomenduojama naudoti kontracepciją vartojant šį vaistą. Jei norite pastoti, pasitarkite su gydytoju, kaip reikia koreguoti gydymą, nes šio vaisto vartojimą reikia nutraukti bent 2 mėnesius iš anksto. Jei pastojate vartodami šį vaistą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes jūsų gydymas turi būti pakeistas.

Nevartokite šio vaisto, jei žindote, nes nežinoma, ar jis patenka į motinos pieną.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų naudojimas

Mažai tikėtina, kad Ozempic paveiks jūsų vairavimo gebėjimus ir gebėjimą valdyti mašinas. Jei vartojate šį vaistą kartu su sulfonilkarbamido dariniu ar insulinu, galite patirti mažą cukraus kiekį kraujyje (hipoglikemiją), dėl kurios gali sumažėti jūsų koncentracija. Nevairuokite automobilio ir nenaudokite mašinų, kai jaučiate mažo cukraus kiekio kraujyje simptomus. Daugiau informacijos apie padidėjusią mažo cukraus kiekio kraujyje riziką rasite 2 skyriuje „Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?“ ir 4 skyriuje apie mažo cukraus kiekio kraujyje įspėjamuosius simptomus. Daugiau informacijos kreipkitės į savo gydytoją.

Ozempic sudėtyje yra natrio

Šis vaistas turi mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) per dozę, tai reiškia, kad jis iš esmės yra „be natrio“.

### 3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją.

Kiek šio vaisto turėčiau vartoti?

Pradinė dozė yra 0,25 mg kartą per savaitę, keturias savaites.

Po keturių savaitių jūsų gydytojas padidins dozę iki 0,5 mg kartą per savaitę.

Jei jūsų cukraus kiekis kraujyje nėra pakankamai kontroliuojamas vartojant 0,5 mg dozę kartą per savaitę, jūsų gydytojas gali patarti padidinti dozę iki 1 mg kartą per savaitę.

Jei jūsų cukraus kiekis kraujyje nėra pakankamai kontroliuojamas vartojant 1 mg dozę kartą per savaitę, jūsų gydytojas gali patarti padidinti dozę iki 2 mg kartą per savaitę.

Nepakeiskite savo dozės, nebent jūsų gydytojas jums tai nurodė.

Kaip šis vaistas yra skiriamas?

Ozempic skiriamas kaip poodinė injekcija (subkutaninė injekcija). Injekuokite jį ne į vietą vena arba raumuo.

Geriausios vietos injekcijai yra jūsų šlaunų priekinė dalis, juosmens priekinė dalis (pilvas) arba viršutinė ranka.

Prieš naudodami švirkštilį pirmą kartą, leiskite gydytojui ar slaugytojai parodyti, kaip jį naudoti.

Išsamias naudojimo instrukcijas rasite šio pakuotės lapelio gale.

Kada vartoti šį vaistą?

Vartokite šį vaistą kartą per savaitę, jei įmanoma, kiekvieną savaitę tą pačią dieną.

Galite susišvirkšti bet kuriuo paros metu – nepriklausomai nuo valgio.

Kad padėtumėte prisiminti, jog šį vaistą reikia švirkšti tik kartą per savaitę, rekomenduojama pasirinktos savaitės dieną (pavyzdžiui, trečiadienį) užrašyti ant dėžutės ir kiekvieną kartą, kai susišvirkšciate šį vaistą, užrašyti datą ant dėžutės.

Jei reikia, galite pakeisti savo savaitinės injekcijos dieną, jei tik tai yra bent 3 dienos po paskutinės šio vaisto injekcijos. Pasirinkus naują dozavimo dieną, dozavimą reikia tęsti kartą per savaitę.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Nedelsdami susisieki su gydytoju, jei vartojote daugiau Ozempic, nei reikėtų. Gali pasireikšti šalutinis poveikis, pavyzdžiui, pykinimas.

Ar pamiršote vartoti šį vaistą?

Jei pamiršote susišvirkšti dozę ir:

praėjo 5 dienos ar mažiau nuo tada, kai turėjote vartoti Ozempic, vartokite jį, kai tik prisiminsite. Tada susišvirkškite kitą dozę kaip įprasta numatytą dieną.

praėjo daugiau nei 5 dienos nuo tada, kai turėjote vartoti Ozempic, praleiskite praleistą dozę. Tada susišvirkškite kitą dozę kaip įprasta numatytą dieną. Nenaudokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Nenustokite vartoti šio vaisto nepasitarę su gydytoju. Jei nustosite vartoti, jūsų cukraus kiekis kraujyje gali padidėti.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Susisieki su gydytoju, vaistininku ar slaugytoja.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali sukelti šalutinį poveikį, nors ne visi jį patiria.

##### Sunkus šalutinis poveikis

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

diabetinės akių ligos komplikacijos (retinopatija) – pasakykite savo gydytojui, jei gydymo šiuo vaistu metu atsiranda akių problemų, tokių kaip regėjimo pokyčiai.

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

kasos uždegimas (ūminis pankreatitas), kuris gali sukelti stiprų nuolatinį pilvo ir nugaros skausmą. Jei patiriate šiuos simptomus, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1 000 vartotojų)

sunkios alerginės reakcijos (anafilaksinės reakcijos, angioedema). Nedelsdami kreipkitės į medicinos pagalbą ir kuo greičiau informuokite savo gydytoją, jei atsiranda simptomų, tokių kaip kvėpavimo sunkumai, veido, lūpų, liežuvio ir/ar gerklės patinimas, sunkumas ryti ir greitas širdies plakimas.

Labai retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų)

medicininė akių būklė, vadinama neareritine priekinės išeminės optinės neuropatija (NAION), kuri gali sukelti, kad be jokio skausmo, matote mažiau arba visai nematote viena akimi. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebite, kad staiga nieko nematote arba lėtai matote blogiau (žr. 2 skyrių: 'Staigūs regėjimo pokyčiai').

Nežinoma (negali būti nustatyta pagal turimus duomenis)

Žarnų užsikimšimas. Sunkus užkietėjimas su tokiais simptomais kaip pilvo skausmas, pilvo pūtimas, vėmimas ir kt.

##### Kitas šalutinis poveikis

Labai dažnai (pasireiškia daugiau nei 1 iš 10 vartotojų)

pykinimas – paprastai praeina po kurio laiko  
viduriavimas – paprastai praeina po kurio laiko  
mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), jei šis vaistas vartojamas kartu su vaistais, kurių sudėtyje yra sulfonilkarbamido darinių arba insulino

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

vėmimas  
mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija), kai šis vaistas vartojamas kartu su geriamaisiais antidiabetiniais vaistais, išskyrus sulfonilkarbamido darinius ar insuliną

Įspėjamieji mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai gali pasireikšti staiga. Tai gali būti: šaltas prakaitas, šalta blyški oda, galvos skausmas, greitas širdies plakimas, pykinimas arba stiprus alkis, regėjimo pokyčiai, mieguistumas ar silpnumas, nervingumas, nerimas ar sumišimas, sunkumai susikaupti ar drebulys.

Jūsų gydytojas pasakys, kaip gydyti mažą cukraus kiekį kraujyje ir ką daryti, jei pasireiškia šie įspėjamieji požymiai.

Mažas cukraus kiekis kraujyje greičiausiai pasireiškš, jei taip pat vartojate sulfonilkarbamido darinius ar insuliną. Jūsų gydytojas gali sumažinti šių vaistų dozę prieš pradėdant vartoti šį vaistą.

virškinimo sutrikimas (nevirškinimas)  
skrandžio uždegimas (gastritas) – simptomai yra skrandžio skausmas, pykinimas ar vėmimas  
refliuksas arba rėmuo – dar vadinamas gastroezofaginio refliukso liga (GERL)  
pilvo skausmas  
pilvo pūtimas jausmas pilve vidurių užkietėjimas  
raugėjimas  
tulžies akmenys  
galvos svaigimas  
nuovargis  
nuovargis  
svorio netekimas  
mažiau apetitas  
dujų susidarymas (vidurių pūtimas)  
kasos fermentų padidėjimas (pvz., lipazė ir amilazė)  
galvos skausmas.

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)  
maistas ar gėrimai skonis kitoks nei įprastai  
greitas pulsas  
reakcijos injekcijos vietoje – tokios kaip mėlynės, skausmas, dirginimas, niežulys ir odos bėrimas  
alerginės reakcijos, tokios kaip odos bėrimas, niežulys ar dilgėlinė  
maistas ilgiau nei įprastai lieka skrandyje (uždelstas skrandžio ištuštinimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją. Tai taip pat taikoma galimam šalutiniam poveikiui, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinį poveikį per nacionalinę pranešimų sistemą, nurodytą priede V. Pranešdami apie šalutinius poveikius, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant švirkštiklio etiketės ir kartoninės dėžutės po EXP. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Prieš naudojimą:

Laikyti šaldytuve (2°C–8°C). Nelaikyti šaldiklyje. Laikyti atokiau nuo šaldymo elemento. Laikykite švirkštiklio dangtelį ant švirkštiklio, kad apsaugotumėte nuo šviesos.

Po naudojimo:

Ozempic 0,5 mg (4 dozių švirkštiklis)

Jei laikote švirkštiklį žemiau 30°C arba šaldytuve (2°C–8°C) (ne šalia šaldymo elemento), galite jį laikyti 6 savaites. Ozempic nelaikyti šaldiklyje. Jei vaistas buvo užšaldytas, jo nebegalima naudoti.

Ozempic 0,5 mg (8 dozių švirkštiklis)

Jei laikote švirkštiklį žemiau 30°C arba šaldytuve (2°C–8°C) (ne šalia šaldymo elemento), galite jį laikyti 8 savaites. Ozempic nelaikyti šaldiklyje. Jei vaistas buvo užšaldytas, jo nebegalima naudoti.

Laikykite švirkštiklį, kai jo nenaudojate, su uždėtu dangteliu, kad apsaugotumėte nuo šviesos.

Nenaudokite šio vaisto, jei pastebėjote, kad tirpalas nėra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis.

Neleiskite vaistų į kriauklę ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevarojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie sunaikinami atsakingai ir nepatenka į aplinką.

## 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra semaglutidas.

1,5 ml: Viename ml injekcinio tirpalo yra 1,34 mg semaglutido. Vienkartiniame švirkšte yra 2 mg semaglutido 1,5 ml tirpalo. Kiekviena dozė turi 0,5 mg semaglutido 0,37 ml.

3 ml: Viename ml injekcinio tirpalo yra 0,68 mg semaglutido. Vienkartiniame švirkšte yra 2 mg semaglutido 3 ml tirpalo. Kiekviena dozė turi 0,5 mg semaglutido 0,74 ml.

3 ml: Viename ml injekcinio tirpalo yra 1,34 mg semaglutido. Vienkartiniame švirkšte yra 4 mg semaglutido 3 ml tirpalo. Kiekviena dozė turi 0,5 mg semaglutido 0,37 ml.

Kitos šio vaisto medžiagos yra: dinatrio fosfato dihidratas, propilenglikolis, fenolis, injekcinis vanduo, druskos rūgštis/natrio hidroksidas (pH reguliavimui). Žr. taip pat skyrių 2, 'Ozempic turi natrio'.

Kaip atrodo Ozempic ir kiek jo yra pakuotėje?

Ozempic yra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis injekcinis tirpalas vienkartiname švirkšte.

1,5 ml: Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 1,5 ml tirpalo, skirto 4 dozėms po 0,5 mg.

3 ml: Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 3 ml tirpalo, skirto 4 dozėms po 0,5 mg. 3 ml: Kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 3 ml tirpalo, skirto 8 dozėms po 0,5 mg.

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas yra prieinamas šiose pakuotėse:

1 švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos.

1 švirkštiklis ir 8 NovoFine Plus vienkartinės adatos.

3 švirkštikliai ir 12 NovoFine Plus vienkartinių adatų.

Ne visos nurodytos pakuotės yra parduodamos.

Prekybos leidimo turėtojas ir gamintojas  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd  
Danija

Ši pakuotės lapelė paskutinį kartą patvirtinta

Kiti informacijos šaltiniai

Daugiau informacijos apie šį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros svetainėje:  
<http://www.ema.europa.eu>.

Naudojimo instrukcijos

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje ir pateikia 4 semaglutido dozes

Ozempic 0,5 mg injekcinio tirpalo naudojimo instrukcijos užpildytame švirkštiklyje

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami savo Ozempic užpildytą švirkštiklį. Pasitarkite su savo gydytoju, slaugytoju ar vaistininku, kaip teisingai suleisti Ozempic. Pradėkite nuo švirkštiklio patikrinimo, kad įsitikintumėte, jog švirkštiklis turi Ozempic 0,5 mg. Tada peržiūrėkite žemiau pateiktus poveikslėlius, kad susipažintumėte su įvairiomis švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar silpnaregis ir negalite perskaityti dozės langelio ant švirkštiklio, nenaudokite šio švirkštiklio be pagalbos. Paprašykite pagalbos asmens, kuris turi gerą regėjimą ir žino, kaip naudoti Ozempic užpildytą švirkštiklį.

Jūsų švirkštiklis yra užpildytas švirkštiklis su sukamuoju dozės nustatymo mygtuku. Švirkštiklis turi 2 mg semaglutido ir galite pasirinkti tik 0,5 mg dozes. Vienas nenaudotas švirkštiklis turi keturias 0,5 mg dozes.

Naudokite lentelę dėžutės dangtelio viduje, kad stebėtumėte, kiek injekcijų atlikote ir kada jas atlikote.

Jūsų švirkštiklis yra skirtas naudoti su 30G, 31G ir 32G vienkartinėmis adatomis maksimalus ilgis 8 mm. NovoFine Plus adatos yra įtrauktos į pakuotę.

Atkreipkite dėmesį: Jūsų švirkštiklis gali būti kitokio dydžio nei švirkštiklis, parodytas paveikslėlyje. Šios instrukcijos taikomos visiems Ozempic 0,5 mg švirkštikliams.

Svarbi informacija

Skirkite ypatingą dėmesį šioms pastaboms, nes jos yra svarbios saugiam švirkštiklio naudojimui.

1. Naujos adatos uždėjimas ant švirkštiklio

Patikrinkite savo švirkštiklio pavadinimą ir spalvotą etiketę, kad įsitikintumėte, jog jis turi Ozempic 0,5 mg. Tai ypač svarbu, jei naudojate daugiau nei vieną injekcinį vaistą. Netinkamo vaisto naudojimas gali būti žalingas jūsų sveikatai. Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

Patikrinkite, ar tirpalas švirkštiklyje yra skaidrus ir bespalvis. Pažiūrėkite per švirkštiklio langelį. Jei tirpalas atrodo drumstas ar spalvotas, nenaudokite švirkštiklio.

Paimkite vieną naujas adatas.

Patikrinkite popierinį dangtelį ir išorinį adatos dangtelį dėl pažeidimų, nes tai gali turėti įtakos sterilumui. Naudokite naują adatą, jei matote kokių nors pažeidimų. Nuimkite tas popierinį dangtelį.

Įsitikinkite, kad adata tinkamai pritvirtinta.

Paspauskite adatą tiesiai ant švirkštimo priemonės. Pasukite ją saugiai.

Ant adatos yra dangtelis ir apsauginis gaubtelis. Turite pašalinti abu. Jei nepašalinsite abiejų, neiššvirkšite tirpalo.

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui. Jums jo reikės po injekcijos, kad saugiai nuimtumėte adatą nuo švirkštimo priemonės.

Nuimkite vidinį adatos gaubtelį ir išmeskite jį. Jei bandysite jį vėl uždėti, galite netyčia įsidurti adata.

Ant adatos galiuko gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai yra normalu, bet vis tiek turite patikrinti tiekimą, jei pirmą kartą naudojate naują švirkštimo priemonę. Žiūrėkite 2 žingsnį 'Patikrinkite tiekimą su kiekviena nauja švirkštimo priemone'.

Pritvirtinkite naują adatą prie švirkštimo priemonės tik tada, kai esate pasiruošę atlikti injekciją.

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą.

Taip galima išvengti užsikimšusių adatų, užteršimo, infekcijos, nutekėjimo vandenos tirpalo ir netikslaus dozavimo.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

## 2. Patikrinkite kiekvieno naujo švirkštiklio tiekimą

Jei jūsų švirkštiklis jau naudojamas, pereikite prie 3 žingsnio „Nustatykite savo dozę“. Patikrinkite tiekimą tik prieš pirmą injekciją su kiekvienu nauju švirkštikliu. Pasukite dozės nustatymo mygtuką iki kontrolinės linijos ( \* \* = )tiesiai po „0“. Patikrinkite, ar kontrolinė linija yra vienoje linijoje su dozės rodykle. Laikykite švirkštiklį su adata nukreipta į viršų.

Laikykite rašiklį su adata nukreipta į viršų.

Gali likti mažas lašas ant adatos galo, bet jis nebus sušvirkštas.

Jei lašas nepasirodo, pakartokite 2 žingsnį „Patikrinkite kiekvieno naujo švirkštiklio tiekimą“ ne daugiau kaip 6 kartus. Jei lašas vis dar nepasirodo, pakeiskite adatą ir dar kartą pakartokite 2 žingsnį „Patikrinkite kiekvieno naujo švirkštiklio tiekimą“.

Išmeskite švirkštiklį ir naudokite naują, jei vis dar nepasirodo tirpalo lašas.

Visada patikrinkite, ar adatos gale pasirodo lašas, prieš pirmą kartą naudodami naują švirkštiklį. Tai užtikrins, kad tirpalas teka.

Jei lašas nepasirodo, jūs nesušvirkščiate vaisto, net jei dozės langelyje pasirodo kitas skaičius. Tai gali reikšti užsikimšusią ar pažeistą adatą.

Jei lašas nepasirodo, vaisto nešvirkškite, net jei dozės langelyje rodomas kitas skaičius. Tai gali reikšti užsikimšusią arba pažeistą adatą.

Jei prieš kiekvieną pirmąją injekciją su nauju švirkštikliu nepatikrinsite tiekimo, galite negauti paskirtos dozės ir Ozempic gali neveikti taip, kaip tikėtasi.

### 3. Nustatyti iš jūsų dozę

Pasukite dozės nustatymomygtuką, kad nustatytumėte 0,5 mg.  
Tęskite sukimą, kol dozės langelis sustos ir rodys 0,5 mg.

Tik dozės langelis ir dozės rodyklė rodo, kad nustatyta 0,5 mg. Galite nustatyti tik 0,5 mg dozę. Jei jūsų švirkštiklyje yra mažiau nei 0,5 mg, dozės langelis sustos prieš rodydamas 0,5. Dozės nustatymo mygtukas skleidžia kitokį spragtelėjimo garsą, kai jis sukamas pirmyn, atgal arba per 0,5 mg. Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Prieš injekuodami šį vaistą, visada naudokite dozės langelį ir dozės rodyklę, kad pamatytumėte, jog nustatyta 0,5 mg.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų.

Dozės nustatymo mygtuku galima nustatyti tik 0,5 mg dozes. 0,5 mg turi tiksliai sutapti su dozės rodykle, kad būtumėte tikri, jog gaunate teisingą dozę.

### Kiek tirpalo liko?

Norėdami pamatyti, kiek tirpalo liko, naudokite dozės langelį: pasukite dozės nustatymo mygtuką, kol dozės langelis sustos.

Jei rodoma 0,5, tai reiškia, kad jūsų švirkštiklyje yra bent 0,5 mg.

Jei dozės langelis sustoja prieš rodydamas 0,5 mg, tai reiškia, kad tirpalo nepakanka pilnai 0,5 mg dozei.

Jei jūsų švirkštiklyje nepakanka tirpalo pilnai dozei, nenaudokite švirkštiklio. Naudokite naują Ozempic švirkštiklį. 4.

### 4. dozės suleidimas suleisti

Įsitikinkite, kad galite matyti dozės langelį. Neuždenkite jo pirštais. Tai

Įsitikinkite, kad galite matyti dozės langelį. Neuždenkite jo pirštais. injekcijai vykti sklandžiai. injekcija tampa pertraukiamas.

Paspauskite vartojimo mygtuką ir laikykite jį nuspaustą. Stebėkite, kaip dozės langelis vėl rodo „0“. Skaičius „0“ turi būti vienoje linijoje su dozės rodykle. Jūs girdite ar jaučiate dabar galbūt spragtelėjimą ..





Padėkite išorinį adatos dangtelį ant lygaus paviršiaus ir įveskite adatos galiuką į jį, neliesdami adatos ar dangtelio pirštais.

Kai adata yra uždengta, atsargiai užspauskite išorinį adatosdangtelį visiškai ant adatos. Atsukite adatą ir atsargiai išmeskite ją, kaip nurodė jūsų gydytojas, slaugytoja, vaistininkas ar vietos valdžios institucijos.

Po kiekvieno naudojimo uždėkite švirkštiklio dangtelį atgal, kad apsaugotumėte tirpalą nuo šviesos.

Kai švirkštiklis yra tuščias, išmeskite jį be adatos pagal gydytojo, slaugytojos, vaistininko ar vietos valdžios institucijų nurodymus.

Niekada nebandykite uždėti vidinio adatos dangtelio atgal ant adatos. Galitesusidurti su adata.

Visada nedelsdami nuimkite adatą nuo švirkštiklio po kiekvienos injekcijos.

Taip galima išvengti adatos užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo.

### Švirkštiklio priežiūra

Rūpinkitės savo švirkštikliu atsargiai. Netinkamas naudojimas ar grubus elgesys gali sukelti netikslų dozavimą. Tokiu atveju vaisto poveikis gali nepasireikšti.

Neužmirškite švirkštiklio automobilyje ar kitoje vietoje, kur per karšta ar per gali būti šalta.

Ozempic, kuris buvo užšaldytas, negalima injekuoti. Jei tai padarysite, gali nepasireikšti numatytas šio vaisto poveikis.

Ozempic, kuris buvo veikiamas tiesioginių saulės spindulių, negalima injekuoti. Jei tai padarysite, gali nepasireikšti numatytas šio vaisto poveikis.

Neleiskite savo rašikliusidurti su dulkėmis, purvu ar drėgme.

Neskalaukite, nemerkite ar netepkite savo rašiklio. Rašiklį galima valyti drėgna šluoste su švelniu plovikliu.vaistą ant drėgnos šluostės.

Neleiskite savo švirkštimo priemonės nukristi ar atsitrenkti į kietą paviršių. Jei švirkštimo priemonė nukrito arba įtariate problemą, turite įdėti naują adatą ir patikrinti tiekimą.Nebandykite iš naujo užpildyti savo rašiklio. Kai rašiklis yra tuščias, jį reikia Nebandykite iš naujo užpildyti savo švirkštimo priemonės. Kai švirkštimo priemonė yra tuščia, ją reikia išmesti.kiaušinis išmestas.

Naudojimo instrukcijos

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame rašiklyje ir suteikia 8 dozes

semaglutidas

semaglutidas

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami savo Oz

empic užpildytą rašiklį.empic užpildytas švirkštiklis naudotas.

Pasitarkite su savo gydytoju, slaugytoju ar vaistininku, kaip teisingai sušvirkšti Ozempic.njekuoti.

Pradėkite nuo savo švirkštimo priemonės patikrinimo, kad įsitikintumėte, jog joje yra Ozempic 0,5 mg. Tada peržiūrėkite toliau pateiktus paveikslėlius, kad susipažintumėte su įvairiomis jūsų švirkštimo priemonės ir adatos dalimis.

Jei esate aklas ar silpnaregis ir negalite perskaityti dozės langelio ant švirkštimo priemonės, nenaudokite šios švirkštimo priemonės be pagalbos. Paprašykite pagalbos asmens, kuris turi gerą regėjimą ir žino, kaip naudoti Ozempic užpildytą švirkštimo priemonę.

Jūsų švirkštimo priemonė yra užpildyta švirkštimo priemonė su sukamuoju dozės nustatymo mygtuku. Švirkštimo priemonėje yra 4 mg semaglutido ir galite pasirinkti tik 0,5 mg dozės. Viena nepanaudota švirkštimo priemonė turi aštuonias 0,5 mg dozės.

Po to, kai sušvirkščiamos numatytos dozės, švirkštimo priemonėje liks tirpalo. Švirkštimo priemonę reikia išmesti.

Naudokite lentelę dėžutės dangtelio viduje, kad stebėtumėte, kiek injekcijų atlikote ir kada jūs atlikote injekcijas.

Jūsų švirkštimo priemonė yra skirta naudoti su 30G, 31G ir 32G vienkartinėmis adatomis, kurių maksimalus ilgis yra 8 mm. NovoFine Plus adatos yra pakuotėje.

#### Svarbi informacija

Atkreipkite ypatingą dėmesį į šias pastabas, nes jos yra svarbios saugiam švirkštimo priemonės naudojimui.

#### 1. Pakeiskite savo švirkštimo priemonės adatą

Patikrinkite savo švirkštimo priemonės pavadinimą ir spalvotą etiketę, kad įsitikintumėte, jog joje yra Ozempic 0,5 mg. Tai ypač svarbu, jei naudojate daugiau nei vieną injekcinį vaistą. Netinkamo vaisto naudojimas gali būti žalingas jūsų sveikatai. Nuimkite švirkštimo priemonės dangtelį.

Patikrinkite, ar tirpalas švirkštimo priemonėje yra skaidrus ir bespalvis. Pažvelkite per švirkštimo priemonės langelį. Jei tirpalas atrodo drumstas ar spalvotas, švirkštimo priemonės naudoti negalima.

Paimkite vienas nauja adata.

Patikrinkite popierinį dangtelį ir išorinį adatos dangtelį dėl pažeidimų, nes jie gali turėti įtakos sterilumui. Naudokite naują adatą, jei yra kokie nors pažeidimai.

Pašalinkite popierinį dangtelį apsauginę plokštelę.

teisingai pritvirtinate adatą. Paspauskite adatą tiesiai ant švirkštimo priemonės.

Pasukite ją

tvirtai. Ant adatos yra adatos dangtelis ir adatos gaubtelis. Turite pašalinti abu. Jei nepašalinsite abiejų, tada nešvirkšite tirpalo.

Antgalis ir dangtelis yra ant adatos. Jūs turite pašalinti abu. Jei nepašalinsite abiejų, tada nešvirkškite tirpalo.

Nuimkite išorinį adatos dangtelį ir pasilikite jį vėlesniam naudojimui. Jums jo reikės po injekcijos, kad saugiai nuimtumėte adatą nuo švirkštimo priemonės.

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir išmeskite jį. Jei bandysite jį vėl uždėti, galite netyčia įsidurti adata.

Ant adatos galiuko gali pasirodyti lašas tirpalo. Tai yra normalu, tačiau vis tiek turite patikrinti tiekimą, kai pirmą kartą naudojate naują švirkštimo priemonę. Žiūrėkite 2 žingsnį „Patikrinkite kiekvienos naujos švirkštimo priemonės tiekimą“.

Naują adatą ant švirkštimo priemonės uždėkite tik tada, kai esate pasiruošę atlikti injekciją.

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą.

Taip galima išvengti užsikimšusių adatų, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

## 2. Patikrinkite kiekvienos naujos švirkštimo priemonės tiekimą

Jeigu jūsų švirkštimo priemonė jau naudojama, pereikite prie 3 žingsnio „Nustatykite savo dozę“. Tiekimą patikrinkite tik prieš pirmą injekciją su kiekviena nauja švirkštimo priemone.

Pasukite dozės nustatymo mygtuką iki kontrolinės linijos ( ) tiesiai po „0“. Patikrinkite, ar kontrolinė linija yra vienoje linijoje su dozės rodykle.

Laikykite švirkštimopriemonę su adata nukreipta į viršų.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį nuspaustą, kol dozės langelis vėl rodys „0“. Skaičius „0“ turi būti vienoje linijoje su dozės rodykle. Dabar ant adatos galiuko turi pasirodyti tirpalo lašas.

Ant adatos galiuko gali likti mažas lašas, tačiau jis nebus sušvirkštas.

Jeigu lašas nepasirodo, pakartokite 2 žingsnį „Patikrinkite kiekvienos naujos švirkštimo priemonės tiekimą“ ne daugiau kaip 6 kartus. Jei lašas vis tiek nepasirodo, pakeiskite adatą ir pakartokite 2 žingsnį „Patikrinkite kiekvienos naujos dar kartą atidarykite tiekimą“.

Išmeskite švirkštimo priemonę ir naudokite naują, jei vis dar nepasirodo nė lašo tirpalo.

Visada patikrinkite, ar ant adatos galo atsiranda lašas, prieš pirmą kartą naudodami naują švirkštimo priemonę. Taip būsite tikri, kad tirpalas teka.

Jeigu lašas nepasirodo, jūs nesuleidžiate vaisto, net jei dozės langelyje rodomas kitas skaičius. Tai gali reikšti, kad adata užsikimšusi arba pažeista.

Jeigu prieš kiekvieną pirmą injekciją su nauja švirkštimo priemone netikrinsite tiekimo, galite negauti paskirtos dozės ir Ozempic poveikis gali nepasireikšti.

## 3. Nustatykite savo dozę

Pasukite dozės nustatymo ratuką, kad nustatytumėte 0,5 mg. Sukite, kol dozės langelis sustos ir rodys 0,5 mg.

Tik dozės langelis ir dozės rodyklė rodo, kad nustatyta 0,5 mg.

Galite nustatyti tik 0,5 mg dozę. Jei jūsų švirkštimo priemonėje yra mažiau nei 0,5 mg, dozės langelis sustos prieš rodant 0,5.

Dozės nustatymo ratukas skleidžia kitokį spragtelėjimo garsą, kai jis sukamas į priekį, atgal arba per 0,5 mg. Neskaičiuokite švirkštimo priemonės spragtelėjimų.

Prieš suleisdami šį vaistą, visada naudokite dozės langelį ir dozės rodyklę, kad pamatytumėte, jog nustatyta 0,5 mg. Neskaičiuokite

Neskaičiuokite rašiklio paspaudimų skaičius.

Dozės nustatymo mygtuku galima nustatyti tik 0,5 mg dozės. 0,5 mg turi būti tiksliai vienoje linijoje su dozės rodykle, kad būtumėte tikri, jog gaunate teisingą dozę.

Kiek tirpalo liko?

Norėdami pamatyti, kiek tirpalo dar liko, naudokite dozės langelį: sukite dozės nustatymo mygtuką, kol langelis sustos.

Jei rodoma 0,5, tai reiškia, kad jūsų švirkšte dar yra bent 0,5 mg tirpalo.

Jei dozės langelis sustoja prieš rodydamas 0,5 mg, tai reiškia, kad tirpalo nepakanka pilnai 0,5 mg dozei.

Jei jūsų švirkšte nepakanka tirpalo pilnai dozei, nenaudokite švirkšto. Naudokite naują Ozempic švirkštą. 4.

#### 4. dozės suleidimas suleisti

Įsitikinkite, kad galite matyti dozės langelį. Neuždenkite jo pirštais. Tai

Įsitikinkite, kad galite matyti dozės langelį. Neuždenkite jo pirštais. matyti dozę de injekcija tampa nutrauktas.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį nuspaustą. Stebėkite, kaip dozės langelis vėl rodo '0'. Skaičius '0' turi būti vienoje linijoje su dozės rodykle. Jūs girdite ar jaučiate dabar galbūt spragtelėjimą ..

Lėtai skaičiuokite iki 6, laikydami nuspaustą do

zavimo mygtuką. Jei adata ištraukiama anksčiau, galite pamatyti, kaip iš adatos galo išteka tirpalo srovė.

Jei adata anksčiau ištraukiama iš odos, galite pamatyti, kaip iš adatos galo išteka tirpalo srovė. In kad atvejis yra ne pilna dozė suleista suleista.

tada atleisti dozavimo mygtuką. Jei injekcijos vieta pradeda kraujuoti, švelniai paspauskite.

Po injekcijos galite pamatyti tirpalo lašą ant adatos galo. Tai normalu ir neturi įtakos jūsų dozei.

Visada žiūrėkite į dozės langelį, kad žinotumėte, kiek mg injekuojate. Laikykite dozavimo mygtuką nuspaustą, kol dozės

langelis vėl parodys '0'. Kaip atpažinti užsikimšusią ar pažeistą

adatą plona adata

- ar pažeistą adatą. Tokiu atveju jūs negavote vaisto, net jei skaičius dozės langelyje pasikeitė, palyginti su doze, kurią
- Tokiu atveju jums nebuvo skirta vaisto, net jei skaičius dozės langelyje pasikeitė, palyginti su doze, kuri kurią iš pradžių nustatėte.

Kaip elgtis užsikimšus adatai Pakeiskite adatą, kaip aprašyta 5 žingsnyje „Po injekcijos“, ir pakartokite visus veiksmus nuo 1 žingsnio „Naujos adatos uždėjimas ant švirkštimo priemonės“. Įsitikinkite, kad nustatėte visą reikiamą dozę.

Nelieskite dozės langelio injekcijos metu. Tai gali nutraukti injekciją.

## 5. Po injekcijos

Po kiekvienos injekcijos visada nuimkite adatą ir išmeskite ją, kad būtų lengviau atlikti injekciją ir išvengti adatos užsikimšimo. Jei adata užsikimšusi, vaistas nebus sušvirkštas. Vaistas nebus sušvirkštas.

Padėkite išorinį adatos dangtelį ant lygaus paviršiaus ir įveskite adatos galiuką į jį, neliesdami adatos ar dangtelio pirštais.

Kai adata yra uždengta, atsargiai uždėkite išorinį adatos dangtelį visiškai ant adatos. Visiškai uždėkite dangtelį ant adatos. Uždėkite švirkštimo priemonės dangtelį atgal ant švirkštimo priemonės po kiekvieno naudojimo, kad apsaugotumėte tirpalą nuo šviesos.

Kai švirkštimo priemonė yra tuščia, išmeskite ją be adatos pagal gydytojo, slaugytojo, vaistininko ar vietos valdžios nurodymus.

Niekada nebandykite uždėti vidinio adatos dangtelio atgal ant adatos. Galite įsidurti adata.

Galite įsidurti adata. Visada nedelsdami nuimkite adatą nuo švirkštimo priemonės po kiekvienos injekcijos. Taip galima išvengti adatos užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo. Taip galima išvengti užsikimšusių adatų, užteršimo, infekcijos, tirpalo nutekėjimo ir netikslaus dozavimo.

## Svarbūs svarbus informacija

Visada laikykite savo švirkštimo priemonę ir adatas vaikams ir kitiems asmenims nepasiekiamoje vietoje. kitiems, ypač vaikams. Niekada nesidalinkite savo švirkštimo priemone ar savo adatomis su kitais žmonėmis. Globėjai turi būti labai atsargūs tvarkydami panaudotas adatas, kad išvengtų dūrių nelaimingų atsitikimų ir kryžminės infekcijos.

## Jūsų švirkštimo priemonės priežiūra

Rūpinkitės savo švirkštimo priemone atsargiai. Netinkamas naudojimas ar grubus elgesys gali sukelti netikslią dozę. Tokiu atveju šio vaisto numatytas poveikis gali nepasireikšti.

Neužmirškite švirkštimo priemonės automobilyje ar kitoje vietoje, kur gali būti per karšta ar per šalta.

Ozempic, kuris buvo užšaldytas, negalima injekuoti. Jei tai padarysite, gali nepasireikšti šio vaisto numatytas poveikis.

Ozempic, kuris buvo veikiamas tiesioginių saulės spindulių, negalima injekuoti. Jei tai padarysite, gali nepasireikšti šio vaisto numatytas poveikis.

Neleiskite savo švirkštimo priemonei susidurti su dulkėmis, purvu ar drėgme. Neskalkaukite, nemerkitė ar netepkite savo švirkštimo priemonės. Švirkštimo priemonę galima valyti su švelniu plovikliu ant drėgnos šluostės.

Neleiskite savo švirkštimo priemonei nukristi ar atsitrenkti į kietą paviršių. Jei švirkštimo priemonė nukrito arba įtariate problemą, turite įdėti naują adatą ir patikrinti tiekimą prieš injekciją.

Neleiskite savo švirkšto nukristi ar atsitrenkti į kietą paviršių. Jei švirkštas nukrito arba įtariate problemą, turite įdėti naują adatą ir patikrinti tiekimą. Suvyniokite prieš injekciją. Nebandykite iš naujo užpildyti savo rašiklio. Kai rašiklis yra tuščias, jį reikia išmesti. Nebandykite taisyti ar išardyti savo rašiklio.