

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ozempic 1 mg süstelahus eeltäidetud süstlas
semaglutiid

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teie jaoks olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Ozempicu toimeaine on semaglutiid. See aitab teie kehal alandada veresuhkru taset ainult siis, kui veresuhkur on liiga kõrge, ja see võib aidata ennetada südamehaigusi 2. tüüpi diabeediga patsientidel. Samuti võib see aidata aeglustada neerufunktsiooni halvenemist 2. tüüpi diabeediga patsientidel viisil, mis ületab ainult veresuhkru taseme alandamise.

Ozempicut kasutatakse täiskasvanute (alates 18-aastastest) 2. tüüpi diabeedi raviks, kui dieet ja kehaline aktiivsus ei ole piisavad:

ainukasutusena – kui te ei tohi kasutada metformiini (teine diabeediravim) või koos teiste diabeediravimitega – kui need ei ole piisavad teie veresuhkru taseme reguleerimiseks. Need võivad olla ravimid, mida võtate suu kaudu (oraalselt) või süstite, nagu insuliin.

On oluline, et jätkate oma dieedi ja kehalise tegevusega nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile öelnud.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist.

See ravim ei ole sama mis insuliin ja te ei tohi seda kasutada, kui:

teil on 1. tüüpi diabeet – seisund, kus teie keha ei tooda insuliini

teil on tekkinud diabeetiline ketoatsidoos – diabeedi tüsistus, mille korral on kõrge veresuhkur, hingamisraskused, segasus, liigne janu, magus lõhn hingeõhus või magus või metalliline maitse suus.

Ozempic ei ole insuliin ja seetõttu ei tohi seda kasutada insuliini asendajana.

Kui teate, et peate läbima operatsiooni, mille käigus teid hoitakse narkoosis (unes), rääkige oma arstile, et kasutate Ozempic'ut.

Mõjud seedesüsteemile

Selle ravimiga ravi ajal võib teil esineda iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust. Need kõrvaltoimed võivad põhjustada dehüdratsiooni (vedelikukaotust). On oluline, et joote palju, et vältida dehüdratsiooni. See on eriti oluline, kui teil on neeruprobleeme. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on küsimusi või muresid.

Tõsine ja püsiv kõhuvalu, mis võib olla ägeda pankreatiidi tagajärg

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil on tõsine ja püsiv valu kõhupiirkonnas. See võib viidata ägedale pankreatiidile (põletikuline kõhunääre). Vaadake jaotist 4, et saada teavet põletikulise kõhunäärme hoiatavate sümptomite kohta.

Madal veresuhkur (hüpoglükeemia)

Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib see suurendada madala veresuhkru (hüpoglükeemia) riski. Vaadake jaotist 4, et saada teavet madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Teie arst võib paluda teil kontrollida oma veresuhkru taset. See aitab teie arstil otsustada, kas sulfonüüluurea derivaadi või insuliini annust tuleb kohandada, et vähendada madala veresuhkru riski.

Diabeetiline silmahaigus (retinopaatia)

Kui teil on diabeedi tõttu silmahaigus ja kasutate insuliini, võib see ravim põhjustada teie nägemise halvenemist, mis võib vajada ravi. Teavitage oma arsti, kui teil on diabeetiline silmahaigus või kui teil tekivad selle ravimiga ravi ajal silmaprobleemid. Kui teil on võimalik ebastabiilne diabeetiline silmahaigus, ei ole soovitatav kasutada Ozempic 2 mg.

Äkilised muutused teie nägemises

Kui te ravi ajal selle ravimiga äkki ei näe midagi või näete kiiresti halvemini, võtke kohe ühendust oma arstiga nõu saamiseks. Selle põhjuseks võib olla väga haruldane kõrvaltoime, mida nimetatakse mitteamerteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optiliseks neuropaatia (NAION) (vt lõik 4: Tõsised kõrvaltoimed). Teie arst võib suunata teid silmauuringule ja võib-olla peate lõpetama selle ravimiga ravi.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Seda ravimit ei soovitata alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, kuna selle vanuserühma ohutus ja efektiivsus ei ole veel kindlaks tehtud.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Ozempic'ule veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka taimsete ravimite või teiste retseptita ostetud ravimite kohta.

Rääkige oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele eriti siis, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad ühte järgmistest toimeainetest:

Varfariin või muud sarnased suu kaudu manustatavad ravimid, mis takistavad vere hüübimist (suukaudsed antikoagulandid). Teie verd võib-olla tuleb sagedamini testida, et kontrollida, kui kiiresti teie veri hüübib.

Või kui te kasutate insuliini. Teie arst ütleb teile, kuidas insuliini annust vähendada ja soovib teil sagedamini kontrollida oma veresuhkrut, et vältida hüperglükeemiat (kõrge veresuhkur) ja diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, mis tekib, kui keha ei suuda glükoosi lagundada, kuna insuliini on ebapiisavalt).

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate end olevat rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke siis enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna ei ole teada, kas see on kahjulik sündimata lapsele. Seetõttu on soovitatav kasutada rasestumisvastaseid vahendeid selle ravimi kasutamise ajal. Kui soovite rasestuda, arutage oma arstiga, kuidas ravi kohandada, kuna peate selle ravimi kasutamise lõpetama vähemalt 2 kuud ette. Kui rasestute selle ravimi kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga, sest teie ravi tuleb muuta.

Ärge kasutage seda ravimit, kui toidate last rinnaga, kuna ei ole teada, kas see satub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

On ebatõenäoline, et Ozempic mõjutab teie autojuhtimisvõimet ja masinate käsitlemise võimet. Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib teil tekkida madal veresuhkur (hüpoglükeemia), mis võib vähendada teie keskendumisvõimet. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui teil esinevad madala veresuhkru sümptomid. Vaadake lõik 2 'Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?' teabe saamiseks suurenenud madala veresuhkru riski kohta ja lõik 4 madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma arstiga.

Ozempic sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju seda ravimit ma pean kasutama?

Algannus on 0,25 mg üks kord nädalas, nelja nädala jooksul.

Pärast nelja nädalat suurendab teie arst annust 0,5 mg-ni üks kord nädalas.
Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 0,5 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 1 mg-ni üks kord nädalas.
Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 1 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 2 mg-ni üks kord nädalas.

Ärge muutke oma annust, kui arst pole seda öelnud.

Kuidas seda ravimit manustatakse?

Ozempic manustatakse nahaaluse süstina (subkutaanne süst). Ärge süstige seda veeni ega lihasesse.

Parimad kohad süstimiseks on reie esikülg, talje esikülg (kõht) või õlavars.

Enne pliiatsi esmakordset kasutamist näitab teie arst või õde, kuidas pliiatsit kasutada.

Üksikasjalikud kasutusjuhised leiate selle infolehe tagaküljelt.

Millal seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit üks kord nädalas, võimalusel iga nädal samal päeval.

Võite end süstida igal ajal päeval – sõltumata söögikordadest.

Et aidata teil meeles pidada, et süstite seda ravimit ainult üks kord nädalas, on soovitatav märkida valitud nädalapäev (näiteks kolmapäev) karbile ja kirjutada iga kord, kui olete ravimit süstinud, kuupäev karbile.

Vajadusel võite muuta oma iganädalase süsti päeva, kui see on vähemalt 3 päeva pärast viimast süsti. Pärast uue annustamispäeva valimist tuleb annustamist jätkata üks kord nädalas.

Kas olete kasutanud liiga palju seda ravimit?

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui olete kasutanud rohkem Ozempic'ut kui peaks. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu iiveldus.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?

Kui unustate annuse süstida ja:

kui Ozempic'i oleks pidanud kasutama 5 päeva või vähem aega tagasi, kasutage seda kohe, kui meelde tuleb. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

kui Ozempic'i oleks pidanud kasutama rohkem kui 5 päeva tagasi, jätke vahele jäänud annus vahele. Seejärel süstige oma järgmine annus nagu tavaliselt oma planeeritud päeval.

Ärge kasutage kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga konsulteerimata. Kui lõpetate kasutamise, võib teie veresuhkru tase tõusta.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Sageli (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10-st)

diabeetilise silmahaiguse tüsistused (retinopaatia) – rääkige oma arstile, kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal silmaprobleemid, nagu nägemise muutused.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l inimesel 100-st)

kõhunäärme põletik (äge pankreatiit), mis võib põhjustada tugevat püsivat valu kõhus ja seljas. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 1 000-st)

tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem). Otsige kohe meditsiinilist abi ja teavitage oma arsti nii kiiresti kui võimalik, kui teil tekivad sümptomid nagu hingamisraskused, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, neelamisraskused ja kiire südametegevus.

Väga harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)

silmahaigus nimega mittearteriiline eesmine isheemiline optiline neuropaatia (NAION), mis võib põhjustada, et te ei näe ühe silmaga enam midagi või näete vähem, ilma igasuguse valuta. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate, et te ei näe äkki midagi või näete aeglaselt halvemini (vt jaotis 2: 'Äkilised muutused teie nägemises').

Pole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

Sooleummistus. Tõsine ummistuse vorm, millega kaasnevad sellised kaebused nagu kõhuvalu, puhitus, oksendamine jne.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli (esinevad rohkem kui 1-l inimesel 10-st)

iiveldus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast

kõhulahtisus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast

madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliini sisaldavate ravimitega

Sageli (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10-st)

oksendamine

madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos teiste suukaudsete diabeediravimitega peale sulfonüüluurea derivaatide või insuliini

Madala veresuhkru hoiatavad sümptomid võivad tekkida äkki. Need võivad olla: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, kiire südametegevus, iiveldus või tugev nälgitunne, nägemise muutused, unisuse või nõrkuse tunne, närvilisuse, ärevuse või segaduse tunne, keskendumisraskused või värisemine.

Teie arst ütleb teile, kuidas madalat veresuhkrut ravida ja mida teha, kui teil need hoiatavad sümptomid tekivad.

Madal veresuhkur on tõenäolisem, kui kasutate ka sulfonüüluurea derivaate või insuliini. Teie arst võib nende ravimite annust vähendada enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.

seedehäired (düspepsia)
põletikuline magu (gastriit) – sümptomiteks on muu hulgas kõhuvalu, iiveldus või oksendamine
refluks või kõrvetised – tundud ka kui gastroösofageaalne refluks (GERD)
kõhuvalu
kõhupuhitus
kõhukinnisus
rõhitsemine
sapikivid
peapööritus
väsimus
kaalulangus
vähenenud söögiisu
gaaside teke (kõhupuhitus)
kõhunäärme ensüümide taseme tõus (nagu lipaas ja amülaas)
peavalu.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st)
toit või jook maitseb erinevalt kui tavaliselt
kiire pulss
süstekoha reaktsioonid – nagu verevalumid, valu, ärritus, sügelus ja nahalööve
allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, sügelus või nõgestõbi
toit püsib maos kauem kui tavaliselt (aeglustunud mao tühjenemine).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pliiatsi etiketil ja karbil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis (2°C–8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida eemal külmaelemendist. Hoidke pliiatsikork pliiatsil, et kaitsta seda valguse eest.

Pärast kasutamist:

Ozempic 1 mg (4 annuse pliiats)

Kui hoiate pliiatsit alla 30°C või külmkapis (2°C–8°C) (mitte külmaelemendi lähedal), saate seda säilitada 6 nädalat. Ozempicut ei tohi hoida sügavkülmas. Kui ravim on külmunud, ei tohi seda enam kasutada.

Ozempic 1 mg (8 annuse pliiats)

Kui hoiate pliiatsit alla 30°C või külmkapis (2°C–8°C) (mitte külmaelemendi lähedal), saate seda säilitada 8 nädalat. Ozempicut ei tohi hoida sügavkülmas. Kui ravim on külmunud, ei tohi seda enam kasutada.

Hoidke pliiatsit, kui te seda ei kasuta, koos pliiatsikorgiga, et kaitsta seda valguse eest.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus ei ole selge ja värvitu või peaaegu värvitu.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on semaglutiin.

Üks ml süstelahust sisaldab 1,34 mg semaglutiini. Üks eeltäidetud pliiats sisaldab 4 mg semaglutiini 3 ml lahuses. Iga annus sisaldab 1 mg semaglutiini 0,74 ml-s.

Üks ml süstelahust sisaldab 2,68 mg semaglutiini. Üks eeltäidetud pliiats sisaldab 8 mg semaglutiini 3 ml lahuses. Iga annus sisaldab 1 mg semaglutiini 0,37 ml-s.

Selle ravimi muud ained on: dinaatriumfosfaatdihüdraat, propüleenglükool, fenool, süstevesi, soolhape/naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks). Vaadake ka jaotist 2, 'Ozempic sisaldab naatriumi'.

Kuidas Ozempic välja näeb ja kui palju on pakendis?

Ozempic on selge ja värvitu või peaaegu värvitu süstelahus eeltäidetud süstlas.

Iga eeltäidetud süstal sisaldab 3 ml lahust, mõeldud 4 annuseks 1 mg.

Iga eeltäidetud süstal sisaldab 3 ml lahust, mõeldud 8 annuseks 1 mg.

Ozempic 1 mg süstelahus on saadavaljärgmistes pakendisuurustes:

1 süstal ja 4 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela.

1 süstal ja 8 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela

3 süstalt ja 12 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela.

Kõiki nimetatud pakendisuurusi ei turustata.

Müügiloa hoidja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

Tootja

Ozempic 1 mg (4 annust ja 8 annust)

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

Ozempic 1 mg (4 annust)
Novo Nordisk Production SAS
45, Avenue d'Orléans
28000 Chartres
Prantsusmaa

Seda pakendi infolehte uuendati viimati

Muud teabeallikad

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa Ravimiameti veebisaidilt:
<http://www.ema.europa.eu>.

Kasutusjuhised

Ozempic 1 mg süstelahus eeltäidetud süstlas ja annab 4 annust semaglutidi

Ozempic 1 mg süstelahuse kasutusjuhised eeltäidetud süstlas

Lugege neid juhiseid hoolikalt enne, kui kasutate oma Ozempic eeltäidetud süstalt. Arutage oma arsti, õe või apteekriga, kuidas Ozempic'it õigesti süstida. Alustage oma süstla kontrollimisest, et veenduda, et süstal sisaldab Ozempic 1 mg. Seejärel vaadake allolevaid pilte, et tutvuda oma süstla ja nõela erinevate osadega. Kui olete pime või vaegnägija ja ei saa süstla annuse akent lugeda, ärge kasutage seda süstalt ilma abita. Paluge abi inimeselt, kellel on hea nägemine ja kes teab, kuidas Ozempic eeltäidetud süstalt kasutada.

Teie süstal on eeltäidetud süstal pööratava annuse seadistamise nupuga. Süstal sisaldab 4 mg semaglutidi ja saate valida ainult 1 mg annuseid. Üks kasutamata süstal sisaldab neli 1 mg annust.

Kasutage karbi kaane siseküljel olevat tabelit, et jälgida, mitu süsti olete teinud ja millal olete süstid teinud.

Teie pliiats on mõeldud kasutamiseks 30G, 31G ja 32G ühekordselt kasutatavate nõeltega, mille maksimaalne pikkus on 8 mm. NovoFine Plus nõelad on pakendis kaasas.

Oluline teave
Pöörake nendele märkustele erilist tähelepanu, kuna need on olulised pliiatsi ohutuks kasutamiseks.

1. Uue nõela paigaldamine pliiatsile

Kontrollige oma pliiatsi nime ja värvilist etiketti, et veenduda, et see sisaldab Ozempic 1 mg. See on eriti oluline, kui kasutate rohkem kui ühte süstitavat ravimit. Vale ravimi kasutamine võib olla teie tervisele kahjulik. Eemaldage pliiatsi kork.

Kontrollige, kas pliiatsis olev lahus on selge ja värvitu. Vaadake läbi pliiatsi akna. Kui lahus tundub hägune või värviline, ei tohi te pliiatsit kasutada.

Võtke uus nõel.

Kontrollige paberkatte ja välimise nõelakorgi kahjustusi, need võivad mõjutada steriilsust. Kasutage uut nõela, kui on näha mingeid kahjustusi. Eemaldage paberkate.

Veenduge, et kinnitate nõela õigesti.

Suruge nõel otse pliiatsile.
Keerake see kinni.

Nõelal on nõelakork ja nõelakate. Te peate mõlemad eemaldama. Kui te ei eemalda mõlemat, siis te lahust ei süsti.

Eemaldage välimine nõelakork ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks. Teil on seda vaja pärast süstimist, et nõel pliiatsilt ohutult eemaldada.

Eemaldage sisemine nõelakork ja visake see ära. Kui proovite seda tagasi panna, võite end kogemata nõelaga torgata.

Nõelaotsale võib ilmuda tilk lahust. See on normaalne, kuid peate siiski kontrollima voolu, kui kasutate uut pliiatsit esimest korda. Vaadake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi voolu'.

Kinnitage uus nõel pliiatsile alles siis, kui olete valmis süsti tegema.

Kasutage iga süsti jaoks alati uut nõela.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Ärge kunagi kasutage kõverat või kahjustatud nõela.

2. Kontrollige iga uue pliiatsi voolu

Kui teie pliiats on juba kasutusel, minge sammu 3 'Seadistage oma annus'. Kontrollige voolu ainult enne iga uue pliiatsi esimest süsti.

Pöörake annuse seadistusnuppkontrolljoonele (** =) kohe pärast '0'. Kontrollige, et kontrollijoon oleks ühel joonel annuse näidikuga.

Hoidke pliiatsit nõelaga ülespoole suunatuna.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all, kuni annuse lugemisaken on jälle '0'.

Number '0' peab olema ühel joonel annuse näidikuga. Nõelaotsale peaks nüüd ilmuma tilk lahust.

Nõelaotsale võib jääda väike tilk, kuid seda ei süstita. Kui tilka ei ilmu, korrake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi voolu' kuni 6 korda. Kui tilka ikka ei ilmu, vahetage nõel ja korrake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi voolu' veel kord. Visake pliiats ära ja kasutage uut, kui lahuse tilka ikka ei ilmu.

Kontrollige alati, kas nõelaotsale ilmub tilk, enne kui kasutate uut pliiatsit esimest korda. Nii olete kindel, et lahus voolab. Kui tilka ei ilmu, ei süsti te ravimit, isegi kui annuse lugemisaknas ilmub mõni muu number. See võib viidata ummistunud või kahjustatud nõelale. Kui te ei kontrolli voolu enne iga uue pliiatsi esimest süsti, ei pruugi te saada ettenähtud annust ja Ozempicu soovitud toime võib puududa.

3. Teie annuse seadistamine

Pöörakeannuse seadistusnuppu, et seada 1 mg.
Jätkake keeramist, kuni annuseakna näidik peatub ja näitab 1 mg.

Ainult annuseakna ja annusenäidiku nool näitavad, et 1 mg on seadistatud. Saate seadistada ainult 1 mg annuse kohta. Kui teie pliiatsis on vähem kui 1 mg, peatub annuseaken enne kui 1 kuvatakse. enne 1 kuvatakse.

Enne selle ravimi süstimist kasutage alati annuseakent ja annusenäidiku noolt, et

näha, et 1 mg on seadistatud. Ärge loendage pliiatsi klõpse. pliiatsi klikkide arv.

Et näha, kui palju lahust on veel alles, kasutage annuseakent: keerake annuse seadistamise nuppu, kuni

annuseaken peatub. Kui kuvatakse 1, siis on veel vähemalt 1 mg teie pliiatsis. Kui annuseaken peatub enne, kui see näitab 1 mg, on lahust liiga vähe, et saada täisannus 1 mg.

Kui teie pliiatsis on liiga vähe lahust täisannuse jaoks, ärge kasutage pliiatsit. Kasutage uut Ozempic pliiatsit.

4. Teie annuse süstimine

4. Süstige oma annus

Sisestage nõel oma nahka nii, nagu arst või õde teile näidanud on. Veenduge, et näete annuse akent. Ärge katke seda sõrmedega. See võib süstimise katkestada.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all. Vaadake, kuidas annuse aken naaseb tagasi '0' peale. Number '0' peab olema joondatud annuse noolega. Võite kuulda või tunda klõpsu.

Hoidke manustamisnuppu all, kui nõel on teie nahas..

Lugege aeglaselt kuue sekundini, hoides manustamisnuppu all. Kui nõel eemaldatakse nahast varem, võite näha, kuidas lahuse jugake nõelaotsast välja tuleb. Sel juhul ei ole kogu annust süstitud.

Eemaldage nõel oma nahast. Seejärel võite manustamisnupu vabastada.

Kui süstekoht hakkab veritsema, vajutage sellele õrnalt.

Pärast süstimist võite näha nõelaotsal lahuse tilka. See on normaalne ega mõjuta teie annust.

Jälgige alati annuse akent, et teaksite, kui palju mg te süstite. Hoidke manustamisnuppu all, kuni annuseaken naaseb tagasi 'O' peale.

Kuidas tuvastada ummistunud või kahjustatud nõela

- Kui pärast manustamisnupu pidevat vajutamist ei naase annuse aken 'O' peale, olete võib-olla kasutanud ummistunud või kahjustatud nõela.
- Sel juhul ei ole te ravimit saanud, isegi kui annuse akna number on muutunud võrreldes algselt seatud annusega. mida te algselt seadistate.

Kuidas toimida ummistunud nõela korrald

Vahetage nõel vastavalt juhistele jaotises 5 'Pärast süstimist' ja korrake kõiki samme alates sammust 1 'Pange oma pliatsile uus nõel'. Veenduge, et määrate vajaliku kogu doosi.

Ärge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

5. Pärast süstimist

Eemaldage alati nõel pärast iga süstimist ja visake see ära, et hõlbustada süstimist ja vältida nõela ummistumist. Kui nõel on ummistunud, ei süstita ravimit.

Asetage välimine nõelakate tasasele pinnale ja juhtige nõel sinna sisse, ilma et puudutaksite nõela või katet sõrmedega.

Kui nõel on kaetud, vajutage ettevaatlikult välimine nõelakate täielikult nõelale. Keerake nõel lahti ja visake see hoolikalt ära vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Pange pliatsikork pärast iga kasutamist tagasi pliatsile, et kaitsta lahust valguse eest.

Kui pliats on tühi, visake see ära ilma nõelata vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Ärge kunagi proovige sisemist nõelakatet tagasi nõelale panna. Võite end nõelaga torkida.f võivad nõelaga torkida.

Eemaldage alati kohe nõel oma pliatsilt pärast iga süstimist.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Muud olulised andmed

Hoidke oma pliats ja nõelad alati teiste, eriti laste, silma alt ja käeulatusest eemal.

Ärge kunagi jagage oma pliatsit või nõelu teiste inimestega.

Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitlemisel olema väga ettevaatlikud, et vältida torkeõnnetusi ja ristnakatumist.

Teie pliatsi hooldamine

Käsitlege oma pliiatsit hoolikalt. Karm käsitsemine või vale kasutamine võib põhjustada ebatäpse annustamise. Sellisel juhul võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke pliiatsit autosse või muusse kohta, kus võib olla liiga soe või külm. Külmunud Ozempicut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Otsese päikesevalguse käes olnud Ozempicut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke oma pliiatsitolmu, mustuse või niiskuse kätte.

Ärge peske, kastke ega määrige oma pliiatsit. Pliiatsit võib puhastada niiske lapiga ja kerge pesuvahendiga. Ravimit niiskele lapile.

Ärge laske pliiatsil maha kukkuda ega kõvale pinnale lüüa. Kui lasete pliiatsil maha kukkuda või kahtlustate probleemi, peate paigaldama uue nõela ja kontrollima varustust oma pliiatsit uuesti täita.

Proovige Kasutusjuhised

Ozempic 1 mg süstelahus eeltäidetud pliiatsis, mis annab 8 annust semaglutiidi

Ozempic 1 mg süstelahuse kasutusjuhised eeltäidetud pliiatsis

Ozempic 1 mg süstelahus eeltäidetud süstlas ja annab 8 annust semaglutiidi

Kasutusjuhised Ozempic 1 mg süstelahuse jaoks eeltäidetud süstlas

Lugege neid juhiseid hoolikalt enne, kui kasutate oma Ozempic eeltäidetud pen-süstalt.

Arutage oma arsti, õe või apteekriga, kuidas Ozempic'it õigesti süstida.

Alustage oma pen-süstla kontrollimisest, et veenduda, et pen sisaldab Ozempic 1 mg. Seejärel vaadake allolevaid pilte, et tutvuda oma pen-süstla ja nõela erinevate osadega.

Kui olete pime või vaegnägija ja ei saa pen-süstla annuse akent lugeda, ärge kasutage seda pen-süstalt ilma abita. Paluge abi inimeselt, kellel on hea nägemine ja kes teab, kuidas Ozempic eeltäidetud pen-süstalt kasutada.

Teie pen-süstal on eeltäidetud pen-süstal pööratava annuse seadistamise nupuga. Pen sisaldab 8 mg semaglutiidi ja saate valida ainult 1 mg annuseid. Üks kasutamata pen-süstal sisaldab kaheksa 1 mg annust.

Pärast ettenähtud annuste süstimist jääb pen-süstlasse veel lahust. Pen-süstal tuleb ära visata.

Kasutage karbi kaane siseküljel olevat tabelit, et jälgida, mitu süsti olete teinud ja millal olete süstid teinud.

Teie pen-süstal on mõeldud kasutamiseks 30G, 31G ja 32G ühekordselt kasutatavate nõeltega, mille maksimaalne pikkus on 8 mm.

NovoFine Plus nõelad on pakendis kaasas.

Oluline teave

Pöörake nende märkustele erilist tähelepanu, kuna need on olulised pen-süstla ohutuks kasutamiseks.

1. Uue nõela paigaldamine pen-süstlale

Kontrollige oma pen-süstla nime ja värvilist etiketti, et veenduda, et see sisaldab Ozempic 1 mg. See on eriti oluline, kui kasutate rohkem kui ühte tüüpi süstitavat ravimit. Vale ravimi kasutamine võib olla teie tervisele kahjulik. Eemaldage pen-süstla kork.

Kontrollige, kas pen-süstlas olev lahus on selge ja värvitu. Vaadake läbi pen-süstla akna. Kui lahus tundub hägune või värviline, ei tohi te pen-süstalt kasutada.

Võtke uus nõel.

Kontrollige paberist katteplaati ja välimist nõelakorki kahjustuste suhtes, need võivad mõjutada steriilsust. Kasutage uut nõela, kui on näha mingeid kahjustusi. Eemaldage paberist katteplaat.

Veenduge, et kinnitate nõela õigesti.

Suruge nõel otse sule peale.

Keerake see kinni.

Nõelal on nõelakork ja nõelakate. Te peate mõlemad eemaldama. Kui te ei eemalda mõlemat, siis te ei süsti lahust.

Eemaldage välimine nõelakork ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks. Teil on seda vaja pärast süstimist, et nõel ohutult sule küljest eemaldada.

Eemaldage sisemine nõelakate ja visake see ära. Kui proovite seda tagasi panna, võite end kogemata nõelaga torgata.

Nõela otsa võib ilmuda tilk lahust. See on normaalne, kuid peate siiski kontrollima voolu, kui kasutate uut sule esimest korda. Vaadake sammu 2 'Kontrollige iga uue sule voolu'.

Kinnitage uus nõel sule külge alles siis, kui olete valmis süsti tegema.

Kasutage iga süsti jaoks alati uut nõela.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Ärge kunagi kasutage kõverat või kahjustatud nõela.

2. Kontrollige iga uue sule voolu

Kui teie sule on juba kasutusel, minge sammu 3 'Seadistage oma annus'. Kontrollige voolu ainult enne iga uue sule esimest süsti.

Keerake annuse seadistusnuppkontrolljoonele (** =) kohe pärast '0'. Kontrollige, et kontrolljoon oleks ühel joonel annuse näidikuga.

Hoidke sule nõelaga ülespoole suunatuna.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all, kuni annuse lugemisaken on jälle '0'. Number '0' peab olema ühel joonel annuse näidikuga. Nõela otsa peaks nüüd ilmuma tilk lahust.

Nõelaotsale võib jääda väike tilk, kuid seda ei süstita. Kui tilka ei ilmu, korrake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu' maksimaalselt 6 korda. Kui tilka ikka ei ilmu, vahetage nõel ja korrake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliiatsi puhul voolu' veel kord. Visake pliiats ära ja kasutage uut, kui lahuse tilka ikka ei ilmu.

Kontrollige alati, kas nõelaotsale ilmub tilk, enne kui kasutate esimest korda uut pliiatsit. Nii olete kindel, et lahus voolab. Kui tilka ei ilmu, ei süsti te ravimit, isegi kui annuseaknas ilmub teine number. See võib viidata ummistunud või kahjustatud nõelale. Kui te ei kontrolli voolu enne iga esimest süsti uue pliiatsiga, ei pruugi te saada ettenähtud annust ja Ozempicu soovitud toime võib puududa.

3. Teie annuse seadistamine

Keerakeannuse seadistamise nuppu, et seada 1 mg.
Jätkake keeramist, kuni annuseaken peatub ja näitab 1 mg.

Ainult annuseaken ja annusenäidiknäitavad, et 1 mg on seadistatud.

Saate seada ainult 1 mg annuse kohta. Kui teie pliiatsis on vähem kui 1 mg, peatub annuseaken enne, kui 1 kuvatakse.

Annuse seadistamise nupp teeb teistsugust klõpsuheli, kui seda keeratakse edasi, tagasi või üle 1 mg. Ärge loendage pliiatsi klõpse.

Enne selle ravimi süstimist kasutage alati annuseakent ja annusenäidikut, et näha, et 1 mg on seadistatud.

Ärge loendage pliiatsi klõpse.

Annuse seadistamise nupuga saab seada ainult 1 mg annuseid. 1 mg peab olema täpselt ühel joonel annusenäidikuga, et olla kindel, et saate õige annuse.

Et näha, kui palju lahust on veel alles, kasutage annuseakent: keerake annuse seadistamise nuppu, kuni annuseakna lugemine peatub.

Kui kuvatakse 1, siis on teie pliiatsis veel vähemalt 1 mg.

Kui annuseakna lugemine peatub enne, kui see näitab 1 mg, on lahust liiga vähe, et saada täisannus 1 mg.

Kui teie pliiatsis pole piisavalt lahust täisannuse jaoks, ärge kasutage pliiatsit. Kasutage uut Ozempic pliiatsit.

4. Teie annuse süstimine

Sisestage nõel oma nahka nii, nagu arst või õde teile näidanud on.

Veenduge, et näete annuseakent. Ärge katke seda sõrmedega. See võib süstimist katkestada.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all.

Vaadake, kuidas annuseaken naaseb '0' juurde. Number '0' peab olema joondatud annuse näidikuga. Võite kuulda või tunda klõpsu.

Hoidke manustamisnuppu all, kui nõel on teie nahas.

Lugege aeglaselt kuue-ni, hoides manustamisnuppu all.

Kui nõel eemaldatakse nahast varem, võite näha lahuse joa tulemas nõelaotsast. Sel juhul ei ole kogu annus süstitud.

Eemaldage nõel oma nahast. Seejärel võite manustamisnupu vabastada.

Kui süstekoht hakkab veritsema, vajutage sellele õrnalt.

Pärast süstimist võite näha nõelaotsal lahuse tilka. See on normaalne ega mõjuta teie annust.

Jälgige alati annuseakent, et teaksite, kui palju mg te süstite. Hoidke manustamisnuppu all, kuni annuseaken naaseb '0' juurde.

Kuidas ära tunda ummistunud või kahjustatud nõelaummistunud või kahjustatud nõel

- Sellisel juhul ei ole te ravimit manustanud, isegi kui annuse akna number on muutunud võrreldes algselt seatud annusega. Kuidas toimida ummistunud nõela korral
- Vahetage nõel vastavalt sammule 5 'Pärast süstimist' ja korrake kõiki samme alates sammust 1 'Pange oma pliiatsile uus nõel'. Veenduge, et seadistate vajaliku koguanuse. Ärge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

5. Pärast süstimist Eemaldage alati nõel pärast iga süstimist ja visake see ära, et hõlbustada süstimist ja vältida ummistunud nõela. Kui nõel on ummistunud, ei süstita ravimit.

Asetage välimine nõelakork tasasele pinnale ja juhtige nõel sinna sisse, ilma et puudutaksite nõela või korki oma sõrmedega. Kui nõel on kaetud, vajutage ettevaatlikult välimine nõelakork täielikult nõelale.

Keerake nõel lahti ja visake see hoolikalt ära vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhisteile.

5. Pärast teie süsti

Kui pliiats on tühi, visake see ära ilma nõelata vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhisteile.

Ärge kunagi proovige sisemist nõelakorki tagasi nõelale panna. Võite end nõelaga torgata.

Kuidas ära tunda ummistunud või kahjustatud nõela

Kui pärast manustamisnupu pidevat vajutamist ei jõua annuse akna näit '0'-ni, olete võib-olla kasutanud ummistunud või kahjustatud nõela.

Sellisel juhul ei ole te ravimit manustanud, isegi kui annuse akna number on muutunud võrreldes algselt seatud annusega.

Kuidas toimida ummistunud nõela korral

Vahetage nõel vastavalt sammule 5 'Pärast süstimist' ja korrake kõiki samme alates sammust 1 'Pange oma pliatsile uus nõel'. Veenduge, et seadistate vajaliku koguanuse. Ärge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

Eemaldage alati nõel oma pliatsist kohe pärast iga süsti.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, nakkust, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Muud olulised andmed

Hoidke oma pliats ja nõelad alati teiste, eriti laste, silma alt ja käeulatusest eemal.

Ärge kunagi jagage oma pliatsit või nõelu teiste inimestega.

Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitsemisel olema väga ettevaatlikud, et vältida torkeõnnetusi ja ristnakkust.

Teie pliatsi hooldamine

Käsitsege oma pliatsit hoolikalt. Karm käsitsemine või vale kasutamine võib põhjustada ebatäpse doseerimise. Sellisel juhul võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke pliatsit autosse või muusse kohta, kus see võib olla liiga soe või liiga külm. Külmunud Ozempic'ut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Otsese päikesevalguse käes olnud Ozempic'ut ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke oma pliatsitolmu, mustuse või niiskuse kätte.

Ärge peske, kastke ega määrige oma pliatsit. Pliatsit võib puhastada niiske lapiga, millele on lisatud kerget pesuainet. Ravimit niiskele lapile.

Ärge laske pliatsil maha kukkuda ega kõvale pinnale lüüa. Kui lasete pliatsil maha kukkuda või kahtlustate probleemi, peate paigaldama uue nõela ja kontrollima varustust rullige enne süstimist.

Proovige oma pliatsit mitte uuesti täita.

Ärge proovige oma pliatsit parandada ega lahti võtta.