

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Ozempic 1 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä
semaglutidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Jos saat jonkin haittavaikutuksen, joka mainitaan kohdassa 4, tai haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Ozempic on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Ozempic on ja mihin sitä käytetään?

Ozempicin vaikuttava aine on semaglutidi. Se auttaa kehoasi alentamaan verensokeritasoa vain silloin, kun verensokeri on liian korkea, ja se voi auttaa estämään sydänsairauksia tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Se voi myös auttaa hidastamaan munuaisten toiminnan heikkenemistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla tavalla, joka menee pidemmälle kuin pelkkä verensokerin alentaminen.

Ozempicia käytetään aikuisten (18-vuotiaiden ja sitä vanhempien) tyypin 2 diabeteksen hoitoon, kun ruokavalio ja liikunta eivät riitä:

itsenäisenä hoitona – kun et voi käyttää metformiinia (toinen diabeteslääke) tai muiden diabeteslääkkeiden kanssa – jos ne eivät riitä säätämään verensokeritasojasi. Nämä voivat olla lääkkeitä, jotka otat suun kautta (oraalisesti) tai injektioit, kuten insuliini.

On tärkeää, että jatkat ruokavaliotasi ja liikuntaa lääkärisi, apteekkarisi tai sairaanhoitajasi ohjeiden mukaisesti.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tämä lääke ei ole sama kuin insuliini, eikä sitä saa käyttää, jos:

sinulla on tyypin 1 diabetes – tila, jossa kehosi ei tuota insuliinia
olet kehittänyt diabeettisen ketoasidoosin – diabeteksen komplikaatio, johon liittyy korkea verensokeri, hengitysvaikeudet, sekavuus, liiallinen jano, makea hengitys tai makea tai metallinen maku suussa.

Ozempic ei ole insuliini, eikä sitä saa käyttää insuliinin korvikkeena.

Jos tiedät, että sinulle tehdään leikkaus, jossa sinut pidetään nukutuksessa (unessa), kerro lääkärillesi, että käytät Ozempicia.

Vaikutukset ruoansulatusjärjestelmään

Tämän lääkkeen käytön aikana voit kokea pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Nämä haittavaikutukset voivat aiheuttaa kuivumista (nestehukka). On tärkeää juoda runsaasti kuivumisen estämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos sinulla on munuaisongelmia. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on kysyttävää tai olet huolissasi.

Vakava ja jatkuva vatsakipu, joka voi johtua akuutista haimatulehduksesta
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on vakavaa ja jatkuvaa kipua vatsan alueella. Tämä voi viitata akuuttiin haimatulehdukseen (tulehtunut haima). Katso kohta 4 haimatulehduksen varoitusmerkeistä.

Matala verensokeri (hypoglykemia)

Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, se voi lisätä matalan verensokerin (hypoglykemian) riskiä. Katso kohta 4 matalan verensokerin varoitusmerkeistä. Lääkärisi voi pyytää sinua tarkistamaan verensokerisi. Tämä auttaa lääkäriäsi päättämään, onko sulfonyyliureajohdannaisen tai insuliinin annosta tarpeen muuttaa matalan verensokerin riskin vähentämiseksi.

Diabeettinen silmäsairaus (retinopatia)

Jos sinulla on diabeteksen aiheuttama silmäsairaus ja käytät insuliinia, tämä lääke voi aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä, mikä saattaa vaatia hoitoa. Ilmoita lääkärillesi, jos sinulla on diabeettinen silmäsairaus tai jos koet silmäongelmia tämän lääkkeen käytön aikana. Jos sinulla on mahdollisesti epävakaa diabeettinen silmäsairaus, Ozempic 2 mg:n käyttöä ei suositella.

Äkilliset muutokset näkökyvyssäsi

Jos et yhtäkkiä näe mitään tai näkösi heikkenee nopeasti tämän lääkkeen käytön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi saadaksesi neuvoja. Tämä voi johtua erittäin harvinaisesta haittavaikutuksesta, jota kutsutaan ei-arteriittiseksi etummaisiksi iskeemiseksi optikusneuropatiaksi (NAION) (katso kohta 4: Vakavat haittavaikutukset). Lääkärisi voi ohjata sinut silmätutkimukseen ja saatat joutua lopettamaan tämän lääkkeen käytön.

Lapset ja nuoret alle 18 vuotta

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska turvallisuutta ja tehoa tässä ikäryhmässä ei ole vielä vahvistettu.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Ozempicin lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai aiotko pian käyttää muita lääkkeitä? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi. Tämä koskee myös rohdosvalmisteita tai muita lääkkeitä, jotka olet ostanut ilman reseptiä.

Kerro lääkärillesi, apteekkarillesi tai sairaanhoitajallesi erityisesti, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät seuraavia vaikuttavia aineita:

Varfariini tai muut vastaavat suun kautta otettavat lääkkeet, jotka estävät veren hyytymistä (oraaliset antikoagulantit). Verta on ehkä testattava useammin sen selvittämiseksi, kuinka nopeasti veri hyytyy.

Tai jos käytät insuliinia. Lääkärisi kertoo, kuinka voit vähentää insuliiniannostasi ja suosittelee, että tarkistat verensokerisi useammin hyperglykemian (korkea verensokeri) ja diabeettisen ketoasidoosin (diabeteksen komplikaatio, joka ilmenee, kun keho ei pysty hajottamaan glukoosia riittämättömän insuliinin vuoksi) estämiseksi.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Tätä lääkettä ei saa käyttää raskauden aikana, koska ei tiedetä, onko se haitallista syntymättömälle lapselle. Siksi ehkäisyn käyttöä suositellaan tämän lääkkeen käytön aikana. Jos haluat tulla raskaaksi, keskustele lääkärisi kanssa siitä, miten hoitoa tulee muuttaa, koska sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö vähintään 2 kuukautta etukäteen. Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana, ota heti yhteyttä lääkäriisi, koska hoitosi on muutettava.

Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät, koska ei tiedetä, päätyykö se äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

On epätodennäköistä, että Ozempic vaikuttaa ajokykyysi ja kykyysi käyttää koneita. Jos käytät tätä lääkettä yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa, saatat saada matalan verensokerin (hypoglykemia), mikä voi heikentää keskittymiskykyäsi. Älä aja autoa tai käytä koneita, kun sinulla on matalan verensokerin oireita. Katso kohta 2 'Milloin sinun tulee olla erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?' saadaksesi tietoa matalan verensokerin lisääntyneestä riskistä ja kohta 4 matalan verensokerin varoitusoireista. Ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi lisätietoja.

Ozempic sisältää natriumia

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohden, eli se on käytännössä 'natriumvapaa'.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkariisi tai sairaanhoitajaasi.

Kuinka paljon tätä lääkettä minun pitäisi käyttää?

Aloitussuositus on 0,25 mg kerran viikossa, neljän viikon ajan.

Neljä viikon jälkeen lääkärisi nostaa annoksen 0,5 mg:aan kerran viikossa.

Jos verensokerisi ei ole riittävästi hallinnassa 0,5 mg:n annoksella kerran viikossa, lääkärisi saattaa suositella annoksen nostamista 1 mg:aan kerran viikossa.

Jos verensokerisi ei ole riittävästi hallinnassa 1 mg:n annoksella kerran viikossa, lääkärisi saattaa suositella annoksen nostamista 2 mg:aan kerran viikossa.

Älä muuta annostasi, ellei lääkärisi ole niin kehottanut.

Miten tätä lääkettä annetaan?

Ozempic annetaan ihonalaisena injektiona (subkutaaninen injektio). Älä injektioi sitä laskimoon tai lihakseen.

Parhaat paikat injektointiin ovat reiden etupuoli, vyötärön etupuoli (vatsa) tai olkavarsi.

Ennen kuin käytät kynää ensimmäistä kertaa, anna lääkärisi tai sairaanhoitajasi näyttää, miten kynää käytetään.

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät tämän pakkausselosteen takaa.

Milloin käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä kerran viikossa, mahdollisuuksien mukaan joka viikko samana päivänä.

Voit injektoida itsesi mihin aikaan päivästä tahansa – riippumatta aterioista.

Jotta muistaisit, että injektioit tätä lääkettä vain kerran viikossa, on suositeltavaa merkitä valittu viikonpäivä (esimerkiksi keskiviikko) laatikkoon ja kirjoittaa päivämäärä laatikkoon aina, kun olet injektoinut lääkkeen.

Tarvittaessa voit muuttaa viikoittaisen injektioipäiväsi, kunhan se on vähintään 3 päivää edellisen injektion jälkeen. Uuden annostuspäivän valinnan jälkeen annostusta tulee jatkaa kerran viikossa.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos olet käyttänyt enemmän Ozempicia kuin pitäisi. Saatat saada haittavaikutuksia, kuten pahoinvointia.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Jos unohdat injektoida annoksen ja:

jos on kulunut 5 päivää tai vähemmän siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Ozempicia, käytä se heti kun muistat. Sen jälkeen injektioi seuraava annos tavalliseen tapaan suunniteltuna päivänäsi.

jos on kulunut yli 5 päivää siitä, kun sinun olisi pitänyt käyttää Ozempicia, jätä unohtunut annos väliin. Sen jälkeen injektioi seuraava annos kuten tavallisesti suunniteltuna päivänäsi.

Älä käytä kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta siitä lääkärisi kanssa. Jos lopetat käytön, verensokeritasosi voi nousta.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

Yleinen (esiintyy alle yhdellä 10 käyttäjästä)

diabeettisen silmätautiin komplikaatiot (retinopatia) – kerro lääkäriillesi, jos saat silmäoireita tämän lääkkeen käytön aikana, kuten näön muutoksia.

Joskus (esiintyy alle yhdellä 100 käyttäjästä)

haimatulehdus (akuutti pankreatiitti), joka voi aiheuttaa vakavaa jatkuvaa kipua vatsassa ja selässä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos koet näitä oireita.

Harvinainen (esiintyy alle yhdellä 1 000 käyttäjästä)

vakavat allergiset reaktiot (anafylaktiset reaktiot, angioedeema). Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja kerro lääkäriillesi mahdollisimman pian, jos saat oireita kuten hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta, nielemisvaikeuksia ja nopeaa sydämen sykettä.

Erittäin harvinainen (esiintyy alle yhdellä 10 000 käyttäjästä)

silmän sairaus nimeltä ei-arteriittinen anteriorinen iskeeminen optikusneuropatia (NAION), joka voi aiheuttaa kivutonta näön heikkenemistä tai näön menettämistä toisessa silmässä. Ota heti yhteyttä lääkäriisi, jos huomaat äkillistä näön menettämistä tai hitaasti heikkenevää näköä (katso kohta 2: 'Äkilliset muutokset näössäsi').

Tuntematon (ei voida määrittää saatavilla olevien tietojen perusteella)

Suolen tukkeutuminen. Vakava ummetuksen muoto, johon liittyy oireita kuten vatsakipu, turvotus, oksentelu jne.

Muut haittavaikutukset

Hyvin yleinen (esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä)

pahoinvointi – tämä häviää yleensä ajan myötä

ripuli – tämä häviää yleensä ajan myötä

matala verensokeri (hypoglykemia), kun tätä lääkettä käytetään yhdessä sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa

Yleinen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

oksentelu

matala verensokeri (hypoglykemia), kun tätä lääkettä käytetään yhdessä muiden suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kuin sulfonyyliureajohdannaisten tai insuliinin kanssa

Matala verensokeri voi ilmetä äkillisesti. Oireita voivat olla: kylmä hiki, viileä kalpea iho, päänsärky, nopea sydämen syke, pahoinvointi tai voimakas nälkä, näköhäiriöt, uneliaisuus tai heikkous, hermostuneisuus, ahdistuneisuus tai sekavuus, keskittymisvaikeudet tai vapina. Lääkärisi kertoo sinulle, miten matalaa verensokeria hoidetaan ja mitä tehdä, jos saat näitä varoitusoireita.

Matala verensokeri on todennäköisempää, jos käytät myös sulfonyyliureajohdannaisia tai insuliinia. Lääkärisi saattaa pienentää näiden lääkkeiden annosta ennen tämän lääkkeen aloittamista.

ruoansulatushäiriö (dyspepsia)
tulehtunut maha (gastriitti) – oireita ovat mm. vatsakipu, pahoinvointi tai oksentelu
refluksi tai närästys – myös gastroesofageaalinen refluksaus (GERD) nimeltään vatsakipu
vatsan turvotus
ummetus
röyhtäily
sappikivet
huimaus
väsymys
painonlasku
vähentynyt ruokahalu
ilmavaivat (flatulenssi)
haiman entsyymien lisääntyminen (kuten lipaasi ja amylaasi)
päänsärky.

Joskus (esiintyy alle yhdellä 100 käyttäjästä)

ruoka tai juoma maistuu erilaiselta kuin normaalisti
nopea pulssi
injektiokohdan reaktiot – kuten mustelmat, kipu, ärsytys, kutina ja ihottuma
allergiset reaktiot kuten ihottuma, kutina tai nokkosihottuma
ruoka pysyy vatsassa pidempään kuin normaalisti (hidastunut mahan tyhjeneminen).

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai sairaanhoitajaan. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta, kuten liitteessä V on mainittu. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa meitä saamaan lisätietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä lasten ulottumattomissa ja näkyviltä.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Löydät sen kynän etiketistä ja pahvilaatikosta EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Ennen käyttöönottoa:

Säilytä jääkaapissa (2°C–8°C). Älä säilytä pakastimessa. Pidä poissa kylmäelementistä. Pidä kynän korkki kynässä suojataksesi sitä valolta.

Käytön jälkeen:

Ozempic 1 mg (4 annoksen kynä)

Jos säilytät kynää alle 30°C:ssa tai jääkaapissa (2°C–8°C) (ei kylmäelementin lähellä), voit säilyttää sitä 6 viikkoa. Älä säilytä Ozempicia pakastimessa. Jos lääke on ollut jäätyneenä, sitä ei saa enää käyttää.

Ozempic 1 mg (8 annoksen kynä)

Jos säilytät kynää alle 30°C:ssa tai jääkaapissa (2°C–8°C) (ei kylmäelementin lähellä), voit säilyttää sitä 8 viikkoa. Älä säilytä Ozempicia pakastimessa. Jos lääke on ollut jäätyneenä, sitä ei saa enää käyttää.

Säilytä kynä, kun et käytä sitä, kynän korkki päällä suojataksesi sitä valolta.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että liuos ei ole kirkas ja väritön tai lähes väritön.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai WC:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeit oikein, ne tuhotaan vastuullisesti eivätkä päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi.

Yksi ml injektionestettä sisältää 1,34 mg semaglutidia. Esitäytetty kynä sisältää 4 mg semaglutidia 3 ml liuoksessa. Jokainen annos sisältää 1 mg semaglutidia 0,74 ml:ssa.

Yksi ml injektionestettä sisältää 2,68 mg semaglutidia. Esitäytetty kynä sisältää 8 mg semaglutidia 3 ml liuoksessa. Jokainen annos sisältää 1 mg semaglutidia 0,37 ml:ssa.

Muut tämän lääkkeen aineet ovat: dinatriumfosfaattidihydraatti, propyleeniglykoli, fenoli, injektionesteisiin käytettävä vesi, suolahappo/natriumhydroksidi (pH:n säätämiseen). Katso myös kohta 2, 'Ozempic sisältää natriumia'.

Miltä Ozempic näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Ozempic on kirkas ja väritön tai lähes väritön injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 3 ml liuosta, tarkoitettu 4 annokseen, kukin 1 mg.

Jokainen esitäytetty kynä sisältää 3 ml liuosta, tarkoitettu 8 annokseen, kukin 1 mg.

Ozempic 1 mg injektioneste, liuos on saatavanaseuraavissa pakkausko'oissa:

1 kynä ja 4 NovoFine Plus kertakäyttöneulaa.

1 kynä ja 8 NovoFine Plus kertakäyttöneulaa

3 kynää ja 12 NovoFine Plus kertakäyttöneulaa.

Kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija

Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Valmistaja
Ozempic 1 mg (4 annosta ja 8 annosta)
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Tanska

Ozempic 1 mg (4 annosta)
Novo Nordisk Production SAS
45, Avenue d'Orléans
28000 Chartres
Ranska

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty

Muut tietolähteet

Lisätietoja tästä lääkkeestä on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla:
<http://www.ema.europa.eu>.

Käyttöohjeet

Ozempic 1 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä, ja se antaa 4 annosta semaglutidia

Ohjeet Ozempic 1 mg injektionesteen käyttöön esitäytetyssä kynässä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät Ozempic-esitäytettyä kynäsi.
Keskustele lääkärisi, sairaanhoitajasi tai apteekkarisi kanssa siitä, miten Ozempic injektoidaan oikein.

Aloita tarkistamalla kynäsi varmistaaksesi, että kynä sisältää Ozempic 1 mg. Katso sitten alla olevia kuvia oppiaksesi tuntemaan kynäsi ja neulan eri osat.

Jos olet sokea tai heikkonäköinen etkä voi lukea kynän annosikkunaa, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua henkilöltä, jolla on hyvä näkökyky ja joka tietää, miten Ozempic-esitäytettyä kynää käytetään.

Kynäsi on esitäytetty kynä, jossa on kierrettävä annosvalitsin. Kynä sisältää 4 mg semaglutidia ja voit valita vain 1 mg annoksia. Yksi käyttämätön kynä sisältää neljä 1 mg annosta.

Käytä laatikon kannen sisäpuolella olevaa taulukkoa seurataksesi, kuinka monta injeksiota olet antanut ja milloin olet antanut ne.

Kynäsi on suunniteltu käytettäväksi 30G, 31G ja 32G kertakäyttöneulojen kanssa, joiden enimmäispituus on 8 mm.

NovoFine Plus -neulat toimitetaan pakkauksessa.

Tärkeää tietoa

Kiinnitä erityistä huomiota näihin huomautuksiin, koska ne ovat tärkeitä kynän turvallisessa käytössä.

1. Kynän varustaminen uudella neulalla

Tarkista kynäsi nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää Ozempic 1 mg. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä injektoitavaa lääkettä. Väärän lääkkeen käyttö voi olla haitallista terveydellesi.

Poista kynän suojus.

Tarkista, että kynän liuos on kirkas ja väritön. Katso kynän ikkunasta. Jos liuos näyttää samealta tai värilliseltä, älä käytä kynää.

Ota uusi neula.

Tarkista paperinen suojalevy ja ulompi neulansuojus vaurioiden varalta, koska ne voivat vaikuttaa steriiliyteen. Käytä uutta neulaa, jos näet vaurioita.

Poista paperinen suojalevy.

Varmista, että kiinnität neulan oikein.

Paina neula suoraan kynään.

Kierrä se tiukasti kiinni.

Neulassa on neulansuojus ja neulakorkki. Sinun täytyy poistaa molemmat. Jos et poista molempia, et injektoi liuosta.

Poista ulompi neulansuojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sitä injektion jälkeen poistaaksesi neulan turvallisesti kynästä.

Poista sisempi neulansuojus ja hävitä se. Jos yrität laittaa sen takaisin, voit vahingossa pistää itsesi neulalla.

Neulan kärkeen voi ilmestyä tippa liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun tulee silti tarkistaa virtaus, kun käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Katso vaihe 2 'Tarkista virtaus jokaisen uuden kynän kanssa'.

Kiinnitä uusi neula kynään vasta, kun olet valmis antamaan injektion.

Käytä jokaista injektiota varten aina uutta neulaa.

Näin voidaan estää tukkeutuneet neulat, kontaminaatio, infektio, liuoksen vuotaminen ja epätarkka annostelu.

Älä koskaan käytä vääntynyttä tai vaurioitunutta neulaa.

2. Tarkista virtaus jokaisen uuden kynän kanssa

Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 'Aseta annoksesi'. Tarkista virtaus vain ennen ensimmäistä injektiota jokaisen uuden kynän kanssa.

Käännä annoksenasetusnuppia tarkistusviivaan (** =) heti '0' jälkeen. Varmista, että tarkistusviiva on linjassa annososoittimen nuolen kanssa.

Pidä kynää neula ylöspäin suunnattuna.

Paina annostelunappia ja pidä sitä painettuna, kunnes annosnäyttöikkuna on taas '0'. Numeron '0' tulee olla linjassa annososoittimen nuolen kanssa. Neulan kärkeen tulee nyt ilmestyä tippa liuosta.

Neulan kärkeen voi jäädä pieni tippa, mutta sitä ei injektoida. Jos tippaa ei ilmesty, toista vaihe 2 'Tarkista virtaus jokaisen uuden kynän kanssa' enintään 6 kertaa. Jos tippaa ei vielääkään ilmesty, vaihda neula ja toista vaihe 2 'Tarkista virtaus jokaisen uuden kynän kanssa' vielä kerran. Hävitä kynä ja käytä uutta, jos liuosta ei vielääkään ilmesty.

Tarkista aina, että neulan kärkeen ilmestyy tippa, ennen kuin käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistat, että liuos virtaa. Jos tippaa ei ilmesty, et injektoida lääkettä, vaikka annosnäytössä näkyisi jokin muu numero. Tämä voi viitata tukkeutuneeseen tai vaurioituneeseen neulaan. Jos et tarkista virtausta ennen jokaista ensimmäistä injektiota uudella kynällä, et ehkä saa määrättyä annosta ja Ozempicin toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

3. Aseta annoksesi

Käännä annoksenasetusnuppia asettaaksesi 1 mg.

Jatka kääntämistä, kunnes annosikkuna pysähtyy ja näyttää 1 mg.

Vain annosikkuna ja annososoitinosoittavat, että 1 mg on asetettu.

Voit asettaa vain 1 mg annosta kohden. Jos kynässäsi on alle 1 mg, annosikkuna pysähtyy ennen kuin 1 tulee näkyviin.

Annosnappi antaa erilaisen napsahdusäänen, kun sitä käännetään eteenpäin, taaksepäin tai yli 1 mg. Älä laske kynän napsahduksia.

Ennen kuin injektoid tätä lääkettä, käytä aina annosikkunaa ja annososoitinta nähdäksesi, että 1 mg on asetettu.

Älä laske kynän napsahduksia.

Vain 1 mg annoksia voidaan asettaa annosnupilla. 1 mg:n on oltava tarkasti linjassa annososoittimen kanssa, jotta varmistat oikean annoksen.

Nähdäksesi, kuinka paljon liuosta on jäljellä, käytä annosikkunaa: käännä annosnuppia, kunnes annosikkuna pysähtyy.

Jos 1 näkyy, kynässäsi on vielä vähintään 1 mg.

Jos annosikkuna pysähtyy ennen kuin se näyttää 1 mg, liuosta ei ole riittävästi täyden 1 mg annoksen saamiseksi.

Jos kynässäsi ei ole riittävästi liuosta täyteen annokseen, älä käytä kynää. Käytä uutta Ozempic-kynää.

4. Annoksen injektointi

Pistä neula ihoosi tavalla, jonka lääkärisi tai sairaanhoitajasi on sinulle näyttänyt. Varmista, että näet annosikkunan. Älä peitä sitä sormillasi. Tämä voi keskeyttää injektion.

Paina annostelupainiketta ja pidä se painettuna.
Katso, kun annosikkuna palaa takaisin 'O':aan. Numeron 'O' tulee olla linjassa annososoittimen kanssa. Saatat kuulla tai tuntea napsahduksen.

Pidä annostelupainike painettuna samalla kun pidät neulaa ihossasi.

Laske hitaasti kuuteen samalla kun pidät annostelupainiketta painettuna.
Jos neula otetaan pois ihosta aikaisemmin, saatat nähdä pienen suihkun liuosta neulan kärjestä. Tässä tapauksessa koko annosta ei ole injektoitu.

Ota neula pois ihostasi. Voit sitten vapauttaa annostelupainikkeen.
Jos pistoskohta alkaa vuotaa verta, paina sitä kevyesti.

Injektion jälkeen saatat nähdä pisaran liuosta neulan kärjessä. Tämä on normaalia eikä vaikuta annokseesi.

Katso aina annosikkunaa, jotta tiedät kuinka monta mg injektioit. Pidä annostelupainike painettuna, kunnes annosikkuna palaa takaisin 'O':aan.

Miten tunnistattukossa olevan tai vaurioituneen neulan

- Jos annostelupainikkeen jatkuvasta painamisesta huolimatta annosikkuna ei palaa 'O':aan, olet saattanut käyttää tukossa olevaatai vaurioitunutta neulaa.
- Tässä tapauksessa et ole saanut lääkettä, vaikka annosikkunan numero olisi muuttunut verrattuna alkuperäiseen asetettuun annokseen. alun perin asetettu.

Miten toimia tukkeutuneen neulan kanssaald

Vaihda neula kuten kuvattu kohdassa 5 'Injektion jälkeen' ja toista kaikki vaiheet alkaen kohdasta 1 'Uuden neulan asettaminen kynään'. Varmista, että asetat tarvittavan kokoisen annoksen.Älä koske annosikkunaan injektion aikana. Tämä voi keskeyttää injektioita.

5. Injektion jälkeen

5. Injektionne jälkeen

Aseta ulompi neulansuojus tasaiselle alustalle ja ohjaa neulan kärki siihen koskematta neulaan tai suojukseen sormillasi.

Kun neula on peitetty, paina varovasti ulompi neulansuojus kokonaan neulan päälle.

Irrota neula ja hävitä se huolellisesti lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Aseta kynän korkki takaisin kynään jokaisen käytön jälkeen suojataksesi liuosta valolta.

Kun kynä on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan yritä asettaa sisäistä neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itsesi neulalla.

Poista aina neula kynästäsi välittömästi jokaisen injektion jälkeen. Näin voidaan estää tukkeutuneet neulat, kontaminaatio, infektiot, liuoksen vuotaminen ja epätarkka annostelu. Muita tärkeitä tietoja
Pidä kynäsi ja neulasi aina poissa muiden, erityisesti lasten, näkyvistä ja ulottuvilta.

Älä koskaan jaa kynääsi tai neulojasi muiden ihmisten kanssa.

Hoitajien on oltava erittäin varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja pistonnettomuuksien ja ristikontaminaation estämiseksi.

Älä koskaan jaa kynääsi tai neulojasi muiden ihmisten kanssa.

Hoitajien on oltava erittäin varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja pistonnettomuuksien ja ristikontaminaation estämiseksi.

Kynän huolto

Käsittele kynääsi huolellisesti. Karkea käsittely tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa epätarkkaa annostelua. Tällöin tämän lääkkeen aiottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä jätä kynää autoon tai muuhun paikkaan, jossa se voi olla liian kuuma tai kylmä.

Älä injektoida Ozempicia, joka on ollut jäätyneenä. Jos teet niin, tämän lääkkeen aiottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä injektoida Ozempicia, joka on altistunut suoralle auringonvalolle. Jos teet niin, tämän lääkkeen aiottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä altista kynääsipölylle, lialle tai kosteudelle.

Älä pese, upota tai voitele kynääsi. Kynä voidaan puhdistaa miedolla astianpesuaineella kostutetulla liinalla. Laita ainetta kostealle liinalle.

Älä pudota kynää tai kolauta sitä kovaa pintaa vasten. Jos pudotat kynän tai epäilet ongelmaa, sinun on vaihdettava uusi neula ja tarkistettava syöttötäytettä kynääsi uudelleen.

Yritä sinä Käyttöohjeet

Ozempic 1 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä, ja se antaa 8 annosta semaglutidia

Ohjeet Ozempic 1 mg injektionesteen, liuoksen käyttöön esitäytetyssä kynässä

Ozempic 1 mg injektioneste esitäytetyssä kynässä ja sisältää 8 annosta semaglutidia

Ohjeet Ozempic 1 mg injektionesteen käyttöön esitäytetyssä kynässä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät esitäytettyä Ozempic-kynääsi.

Keskustele lääkärisi, sairaanhoitajasi tai apteekkarisi kanssa siitä, miten Ozempic pistetään oikein.

Aloita tarkistamalla kynäsi varmistaaksesi, että kynä sisältää Ozempic 1 mg. Katso sitten alla olevia kuvia oppiaksesi tuntemaan kynäsi ja neulan eri osat.

Jos olet sokea tai heikkonäköinen etkä voi lukea kynän annosikkunaa, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua henkilöltä, jolla on hyvä näkökyky ja joka tietää, miten esitäytettyä Ozempic-kynää käytetään.

Kynäsi on esitäytetty kynä, jossa on kierrettävä annosvalitsin. Kynä sisältää 8 mg semaglutidia ja voit valita vain 1 mg annoksia. Yksi käyttämätön kynä sisältää kahdeksan 1 mg annosta.

Kun aiotut annokset on pistetty, kynään jää vielä liuosta. Kynä on hävitettävä.

Käytä laatikon kannen sisäpuolella olevaa taulukkoa pitääksesi kirjaa siitä, kuinka monta injektiota olet antanut ja milloin olet antanut injektiot.

Kynäsi on suunniteltu käytettäväksi 30G, 31G ja 32G kertakäyttöneulojen kanssa, joiden enimmäispituus on 8 mm.

NovoFine Plus -neulat sisältyvät pakkaukseen.

Tärkeää tietoa

Kiinnitä erityistä huomiota näihin huomautuksiin, koska ne ovat tärkeitä kynän turvallisessa käytössä.

1. Kynäsi varustaminen uudella neulalla

Tarkista kynäsi nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää Ozempic 1 mg. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä injektioitavaa lääkettä. Väärän lääkkeen käyttö voi olla haitallista terveydellesi.

Poista kynän suojuus.

Tarkista, että kynän liuos on kirkas ja väritön. Katso kynän ikkunasta. Jos liuos näyttää samealta tai värilliseltä, älä käytä kynää.

Ota uusi neula.

Tarkista paperinen suojalevy ja ulompi neulansuojus vaurioiden varalta, sillä ne voivat vaikuttaa steriiliyteen. Käytä uutta neulaa, jos näet mitään vaurioita.

Poista paperinen suojalevy.

Varmista, että kiinnität neulan oikein.

Paina neula suoraan kynään.

Kierrä se tiukasti.

Neulassa on neulansuojus ja neulakorkki. Sinun on poistettava molemmat. Jos et poista molempia, et pistä liuosta.

Poista ulompi neulansuojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tarvitset sen injektion jälkeen neulan turvalliseen poistamiseen kynästä.

Poista sisempi neulakorkki ja heitä se pois. Jos yrität laittaa sen takaisin, voit vahingossa pistää itsesi neulalla.

Neulan kärkeen voi ilmestyä pisara liuosta. Tämä on normaalia, mutta sinun on silti tarkistettava syöttö, kun käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Katso vaihe 2 'Tarkista syöttö jokaisen uuden kynän kanssa'.

Kiinnitä uusi neula kynään vasta, kun olet valmis antamaan injektion.

Käytä aina uutta neulaa jokaiselle injektioille.

Näin voidaan estää tukkeutuneet neulat, kontaminaatio, infektiot, liuoksen vuotaminen ja epätarkka annostelu.

Älä koskaan käytä vääntynyttä tai vaurioitunutta neulaa.

2. Tarkista syöttö jokaisen uuden kynän kanssa

Jos kynäsi on jo käytössä, siirry vaiheeseen 3 'Aseta annoksesi'. Tarkista syöttö vain ennen ensimmäistä injektiota jokaisen uuden kynän kanssa.

Käännä annosvalitsinkontrolliviivaan (** =) heti '0' jälkeen. Varmista, että kontrolliviiva on linjassa annososoittimen kanssa.

Pidä kynää neula ylöspäin.

Paina annostelupainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes annosikkuna näyttää jälleen '0'. Numeron '0' tulee olla linjassa annososoittimen kanssa. Neulan kärkeen pitäisi nyt ilmestyä pisara liuosta.

Neulankärkeen voi jäädä pieni pisara, mutta sitä ei injektoida. Jos pisaraa ei ilmesty, toista vaihe 2 'Tarkista jokaisen uuden kynän virtaus' enintään 6 kertaa. Jos pisaraa ei vielä ilmesty, vaihda neula ja toista vaihe 2 'Tarkista jokaisen uuden kynän virtaus' vielä kerran. Hävitä kynä ja käytä uutta, jos liuospisaraa ei vielä ilmesty.

Tarkista aina, että neulankärkeen ilmestyy pisara ennen kuin käytät uutta kynää ensimmäistä kertaa. Näin varmistat, että liuos virtaa. Jos pisaraa ei ilmesty, et injektoida lääkettä, vaikka annosikkunassa näkyisi jokin muu luku. Tämä voi viitata tukkeutuneeseen tai vaurioituneeseen neulaan. Jos et tarkista virtausta ennen jokaista ensimmäistä injektiota uudella kynällä, et ehkä saa määrättyä annosta ja Ozempicin toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

3. Aseta annoksesi

Draai annosvalitsinta asettaaksesi 1 mg.

Jatka kääntämistä, kunnes annosikkuna pysähtyy ja näyttää 1 mg.

Vain annosikkuna ja annososoitinosoittavat, että 1 mg on asetettu.

Voit asettaa vain 1 mg annosta kohden. Jos kynässäsi on alle 1 mg, annosikkuna pysähtyy ennen kuin 1 tulee näkyviin.

Annosvalitsin antaa erilaisen napsahdusäänen, kun sitä käännetään eteenpäin, taaksepäin tai yli 1 mg. Älä laske kynän napsahduksia.

Käytä aina annosikkunaa ja annososoitinta ennen tämän lääkkeen injektointia varmistaaksesi, että 1 mg on asetettu. Älä laske

kynän napsahduksia. Kynän napsautusten määrä.

Nähdäksesi, kuinka paljon liuosta on jäljellä, käytä annosikkunaa: käännä annosvalitsinta kunnes

Voit nähdä, kuinka paljon liuosta on jäljellä, käyttämällä annosikkunaa: käännä annosnuppia kunnes annosikkunan pysähtyy.

Jos näytössä näkyy 1, kynässä on vielä vähintään 1 mg.

Jos annosikkuna pysähtyy ennen kuin se näyttää 1 mg, kynässä ei ole tarpeeksi liuosta täyteen 1 mg annokseen.

Jos kynässä ei ole tarpeeksi liuosta täyteen annokseen, älä käytä kynää. Käytä uutta Ozempic-kynää.

4. Annosten injektointi

Pistä neula ihoosi tavalla, jonka lääkärisi tai sairaanhoitajasi on sinulle näyttänyt. Varmista, että näet annosikkunan. Älä peitä sitä sormillasi. Tämä voi keskeyttää injektion.

Paina annostelupainiketta ja pidä se painettuna. Katso, kun annosikkuna palaa takaisin 'O':aan. Numeron 'O' tulee olla linjassa annososoittimen kanssa. Saatat kuulla tai tuntea napsahduksen.

Pidä annostelupainiketta painettuna samalla kun pidät neulaa ihossasi.

Laske hitaasti kuuteen samalla kun pidät annostelupainiketta painettuna. Jos neula otetaan pois ihosta aikaisemmin, saatat nähdä suihkun liuosta neulan kärjestä. Tässä tapauksessa koko annosta ei ole injektoitu.

Ota neula pois ihostasi. Voit sitten vapauttaa annostelupainikkeen. Jos pistoskohta vuotaa verta, paina sitä kevyesti.

Injektion jälkeen saatat nähdä pisaran liuosta neulan kärjessä. Tämä on normaalia eikä vaikuta annokseesi.

Katso aina annosikkunaa, jotta tiedät kuinka monta mg injektioit. Pidä annostelupainiketta painettuna, kunnes annosikkuna palaa takaisin 'O':aan.

Miten tunnistaa tukkeutunut tai vaurioitunut neulatukkeutunut tai vaurioitunut neula

- Tässä tapauksessa et ole saanut lääkettä, vaikka annosikkunan numero olisi muuttunut alkuperäisestä asetetusta annoksesta. Miten toimia tukkeutuneen neulan kanssa
- Vaihda neula kuten kohdassa 5 'Injektion jälkeen' on kuvattu ja toista kaikki vaiheet alkaen kohdasta 1 'Uuden neulan asettaminen kynään'. Varmista, että asetat tarvittavan koko annoksen. Älä koske annosikkunaan injektion aikana. Tämä voi keskeyttää injektion.

5. Injektion jälkeen Poista aina neula jokaisen injektion jälkeen ja hävitä se injektion helppouden vuoksi ja tukkeutuneen neulan välttämiseksi. Jos neula on tukossa, lääkettä ei injektoida.

Aseta ulompi neulansuojus tasaiselle alustalle ja ohjaa neulankärki siihen koskematta neulaan tai suojukseen sormillasi. Kun neula on peitetty, paina varovasti ulompi neulansuojus kokonaan neulan päälle.

Irrota neula ja hävitä se huolellisesti lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

5. Injektionne jälkeen

Kun kynä on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan yritä asettaa sisäistä neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itsesi neulalla.

Kun neula on peitetty, paina varovasti ulompi neulansuojus kokonaan neulan päälle. Irrota neula ja hävitä se huolellisesti lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Aseta kynän korkki takaisin paikoilleen jokaisen käytön jälkeen suojataksesi liuosta valolta.

Kun kunto on tyhjä, hävitä se ilman neulaa lääkärisi, sairaanhoitajasi, apteekkarisi tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Älä koskaan yritä laittaa sisäistä neulansuojusta takaisin neulaan. Voisit vahingoittaa itseäsi voit pistää neulalla.

Poista aina neula kynästäsi heti jokaisen injektioin jälkeen.

Näin voidaan estää tukkeutuneet neulat, saastuminen, infektio, liuoksen vuotaminen ja epätarkka annostelu.

Muut tärkeät tiedot

Pidä kynäsi ja neulat aina poissa muiden, erityisesti lasten, näkyvistä ja ulottuvilta.

Älä koskaan jaa kynääsi tai neulojasi muiden ihmisten kanssa.

Hoitajien on oltava erittäin varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja pistotapaturmien ja ristikontaminaation välttämiseksi.

Kynäsi huolto

Käsittele kynääsi huolellisesti. Karkea käsittely tai väärä käyttö voi aiheuttaa epätarkan annostelun. Tällöin tämän lääkkeen toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta.

Älä jätä kynää autoon tai muuhun paikkaan, jossa se voi olla liian kuuma tai kylmä.

Pakastettua Ozempicia ei saa injektoida. Jos teet niin, lääkkeen toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta. tämän lääkkeen voi jäädä saavuttamatta.

Suoraan auringonvalolle altistunutta Ozempicia ei saa injektoida. Jos teet niin, lääkkeen toivottu vaikutus voi jäädä saavuttamatta. tämän lääkkeen voi jäädä saavuttamatta.

Älä altista kynääsi pölylle, lialle tai kosteudelle. Älä pese, upota tai voitele kynääsi. Kynä voidaan puhdistaa miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.

Älä pudota kynääsi tai kolauta sitä kovaa pintaa vasten. Jos pudotat kynän tai epäilet ongelmaa, aseta uusi neula ja tarkistavirtaus ennen injektointia.

Älä pudota kynää tai kolhi sitä kovaa pintaa vasten. Jos pudotat kynän tai epäilet ongelmaa, sinun on vaihdettava neula ja tarkistettava syöttörullaa ennen injektointia.

Yritäälä täytä kynääsi uudelleen.

Älä yritä korjata tai purkaa kynääsi.