

Prospecto: información para el paciente

Permetrina InfectoPharm, 50 mg/g, crema
Permetrina (25:75)

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento porque contiene información importante para usted.

Use este medicamento siempre exactamente como se describe en este prospecto o según le haya indicado su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.
- ¿Tiene más preguntas? Entonces, póngase en contacto con su farmacéutico.
- ¿Experimenta alguno de los efectos secundarios mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.
- ¿Su problema no mejora o incluso empeora? Entonces, póngase en contacto con su médico.

Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es Permetrina InfectoPharm y para qué se utiliza este medicamento?
 2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
 3. ¿Cómo se usa este medicamento?
 4. Posibles efectos secundarios
 5. ¿Cómo se conserva este medicamento?
 6. Contenido del envase e información adicional
-
1. ¿Qué es Permetrina InfectoPharm y para qué se utiliza este medicamento?

El principio activo de Permetrina InfectoPharm es permetrina.

La permetrina pertenece a un grupo de medicamentos llamados piretroides. Son medicamentos antiparasitarios.

Este medicamento se utiliza para el tratamiento de la sarna (ácaro de la picazón) en adultos, adolescentes y niños de al menos 2 meses de edad. La sarna es una enfermedad de la piel.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

- Es alérgico a la permetrina, otras piretrinas o a alguno de los otros componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6 de este prospecto.

¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.

- ¿Está tratando a bebés? Lea la sección "Niños de hasta 23 meses de edad".

- Si tiene una alergia conocida a los crisantemos u otras plantas de la familia de las Asteraceae (Compuestas), solo debe usar este medicamento después de consultar a su médico.

Advertencia

¡Solo para uso cutáneo! No ingiera este medicamento.

La crema puede causar irritación en la conjuntiva del ojo. Asegúrese de que este medicamento no entre en contacto con los ojos o las membranas mucosas (en la nariz o garganta, o en el pene o la vagina), o con heridas abiertas. ¿Ocurrió esto? Enjuague el área inmediatamente con agua.

Se aconseja a las personas que trabajan en el cuidado de la salud y usan permetrina que usen guantes.

Este medicamento es perjudicial para todo tipo de insectos y gatos. También es perjudicial para los animales acuáticos, como los peces. Asegúrese de que este medicamento no entre en contacto con estos animales. También asegúrese de que este medicamento no entre en una pecera (acuario) o en un recipiente con insectos o reptiles (terrario).

Este medicamento puede empeorar los síntomas del asma o el eccema.

Niños de hasta 23 meses de edad

No use este medicamento en recién nacidos y bebés menores de 2 meses, a menos que su médico lo indique. No hay suficiente experiencia en bebés y niños pequeños. El tratamiento solo debe administrarse a niños de hasta 23 meses bajo estricta supervisión médica.

¿Está usando otros medicamentos?

¿Está usando otros medicamentos además de Permetrina InfectoPharm, los ha usado recientemente o planea usarlos pronto? Informe a su médico o farmacéutico.

Embarazo y lactancia

¿Está embarazada, cree que podría estarlo, planea quedar embarazada o está amamantando? Consulte a su médico antes de usar este medicamento.

Algunos datos sobre el uso de permetrina en mujeres embarazadas indican que no es perjudicial. Sin embargo, por seguridad, es preferible no usar este medicamento durante el embarazo. Hágalo solo si su médico se lo aconseja.

La permetrina, el principio activo de este medicamento, puede pasar a la leche materna. Por seguridad, no debe amamantar durante cinco días después de usar este medicamento.

Permetrina InfectoPharm contiene parafinas

¿Usa productos de látex (como condones, pesarios) al mismo tiempo que este medicamento? Los excipientes en la crema pueden hacer que los productos de látex funcionen peor. Esto puede hacer que los productos de látex sean menos confiables.

Permetrina InfectoPharm contiene alcohol cetosteárico y ácido sórbico

El alcohol cetostearílico y el ácido sórbico pueden causar reacciones cutáneas en esa área (como una erupción cutánea con picazón (dermatitis de contacto)).

3. ¿Cómo usa este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico le ha indicado. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Aplice cuidadosamente una capa delgada de crema sobre la piel (ver “¿Cómo y cuándo usa este medicamento?”)

Adultos y adolescentes mayores de 12 años

Aplice un máximo de 30 g de crema (es lo mismo que 1 tubo de 30 g o ½ tubo de 60 g)

Niños de 6 a 12 años

Aplice un máximo de 15 g de crema (es lo mismo que ½ tubo de 30 g o ¼ tubo de 60 g)

Niños de 2 meses a 5 años

Aplice hasta 7,5 g de crema (es lo mismo que ¼ tubo de 30 g o ⅛ tubo de 60 g)

Recién nacidos y lactantes menores de 2 meses

Hay pocos datos disponibles en este grupo de edad y no se puede aconsejar una dosis (ver también “Advertencias y precauciones”).

La explicación anterior es una estimación. La dosis puede ajustarse. Esto depende de cuánto necesita el paciente y del tamaño del cuerpo. Por ejemplo, algunos adultos pueden necesitar más crema. Si se tratan la cara, las orejas o el cuero cabelludo, se puede usar más crema.

¿Cómo y cuándo usa este medicamento?

Este medicamento es solo para uso en la piel (cutáneo).

Asegúrese de que la crema no entre en sus ojos. Tampoco deje que entre en contacto con las membranas mucosas (en la nariz o garganta, o en el pene o la vagina) o con heridas abiertas.

¿Ocurre esto accidentalmente? Enjuague bien con agua.

Los adultos deben aplicar la crema en todo el cuerpo, incluyendo el cuello, el interior de las manos y debajo de los pies. No es necesario en la cabeza y la cara, excepto si estas áreas están afectadas por sarna (ácaros de la picazón). Al usar la crema, las áreas entre los dedos de las manos y los pies (también debajo de las uñas de las manos y los pies), las muñecas, los codos, las axilas, el área exterior del pene o la vagina y las nalgas deben estar bien cubiertas.

Niños

Los niños deben aplicar la crema bien por todo el cuerpo. Esto también debe hacerse en el interior de las manos, debajo de los pies, el cuello, la cara, las orejas y el cuero cabelludo. Las áreas de la piel alrededor de la boca (porque la crema puede ser lamida) y los ojos deben dejarse libres.

Asegúrese de que su hijo no lama la crema de las manos. Si es necesario, los niños deben usar guantes. No hay suficiente experiencia con este medicamento en bebés y niños pequeños. Por lo tanto, el tratamiento de niños menores de 23 meses solo debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Personas mayores

Los pacientes mayores (mayores de 65 años) deben usar la crema de la misma manera que los adultos. Además, también deben tratarse la cara, las orejas y el cuero cabelludo. Asegúrese de que la crema no se aplique en la piel alrededor de los ojos.

¿Cuánto tiempo debe usar este medicamento?

Por lo general, es suficiente usar este medicamento una vez.

Deje la crema en la piel de 8 a 14 horas, por ejemplo, mientras duerme. No se bañe, no se duche ni se lave durante este período. Esto no debe hacerse porque el tratamiento podría no funcionar.

¿Debe lavar sus manos durante este período por alguna excepción? Aplique la crema nuevamente en sus manos y muñecas. Esto también se aplica si debe lavar otras partes de la piel tratada (nalgas, el exterior del pene o la vagina).

Después de 8 a 14 horas, dúchese o lave su piel con agua y jabón.

Si sigue estas instrucciones, generalmente es suficiente usar este medicamento una vez para un buen tratamiento. A veces es posible que una infección no desaparezca completamente o vuelva a aparecer. Considere entonces realizar otro tratamiento, de 7 a 14 días después del primer tratamiento.

¿En qué más debe prestar atención?

Cualquiera que haya estado en contacto con usted debe visitar a un médico lo antes posible. Esto se aplica especialmente a sus familiares y parejas. El médico decidirá si estas personas también deben ser tratadas.

¿Las personas infectadas con las que ha tenido contacto no son tratadas lo suficientemente rápido? Entonces es posible que lo vuelvan a infectar con sarna.

También debe

- mantener sus uñas cortas y bien limpias
- cambiar la ropa, la ropa de cama y las toallas todos los días, durante 4 días. Lávelos a una temperatura de al menos 60 °C
- guardar artículos que no pueda lavar a una temperatura de al menos 60 °C (como ropa exterior) durante unos días en una bolsa de plástico cerrada
- aspirar bien las alfombras y los muebles tapizados

¿Cree que este medicamento actúa demasiado fuerte o demasiado débil? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

¿Ha usado demasiado de este medicamento?

No se preocupe por la sobredosis si aplica este medicamento en el exterior de su cuerpo.

¿Ingiere la crema accidental o intencionadamente? Entonces, póngase en contacto con un médico lo antes posible. El médico decidirá qué debe hacerse.

¿Olvidó usar este medicamento?

Use la crema tan pronto como sea posible si lo ha olvidado.

Si deja de usar este medicamento

Por lo general, es suficiente usar este medicamento una vez. ¿Le ha aconsejado su médico volver a usar la crema? Entonces, siga las instrucciones del médico. De lo contrario, puede que no se recupere completamente.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos secundarios

Como cualquier medicamento, este medicamento también puede tener efectos secundarios. No todos los experimentan.

¡Póngase en contacto inmediatamente con un médico en caso de reacciones de hipersensibilidad graves! Entonces, no debe usar más este medicamento.

Frecuente (ocurre en menos de 1 de cada 10 usuarios)

Picazón (prurito), piel roja o sensaciones en la piel (parestesia) como una sensación de hormigueo, pinchazo o ardor en la piel. Estas molestias también pueden ocurrir debido a la enfermedad misma.

Se recomiendan cremas hidratantes y aceites de baño como tratamiento de seguimiento para la piel seca. La picazón y el sarpullido (eccema post-sarna) pueden persistir hasta cuatro semanas después del final del tratamiento. Esto se debe a una reacción a los ácaros de la sarna muertos.

¿Cree que todavía está infectado después de usar este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico antes de volver a usar este medicamento.

Rara vez (ocurre en menos de 1 de cada 1,000 usuarios) El dolor de cabeza ocurre raramente.

Muy raramente (ocurre en menos de 1 de cada 10,000 usuarios)

Muy raramente se han reportado lesiones cutáneas (excoriaciones), inflamación de los folículos pilosos (foliculitis) y aclaramiento de la piel en el momento en que se usó este medicamento.

Personas sensibles/alérgicas han informado que tuvieron dificultad para respirar en el momento en que se usaron sustancias del grupo de las piretrinas.

No conocido (no puede determinarse con los datos disponibles)

Es posible que experimente reacciones alérgicas en la piel (reacciones alérgicas de contacto).

Esto incluye síntomas como picazón, piel roja, ampollas o urticaria. Estas reacciones también pueden extenderse fuera del área tratada de la piel. También puede sentir náuseas. No se ha reportado vómito después del uso de este medicamento. Sin embargo, es un efecto secundario conocido de otros medicamentos que contienen permetrina.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, comuníquese con su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios a través del Centro de Efectos Secundarios de los Países Bajos Lareb, sitio web: www.lareb.nl. Al informar los efectos secundarios, nos ayuda a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad. Esta se encuentra en el tubo y el embalaje exterior después de EXP. Se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.

No hay condiciones especiales de almacenamiento para este medicamento. Este medicamento debe usarse dentro de los tres meses posteriores a la primera apertura del tubo.

No tire los medicamentos por el desagüe o el inodoro y no los deseche en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Si elimina los medicamentos de manera adecuada, se destruyen correctamente y no llegan al medio ambiente.

La permetrina es muy tóxica para los animales que viven en el agua, en el suelo y sobre el suelo. Por lo tanto, es importante que este medicamento no entre en contacto con peceras (acuarios) y recipientes donde vivan insectos y reptiles (terrarios). Asegúrese también de que este medicamento no entre en contacto (incluso si está en la piel) con animales sin columna vertebral, especialmente insectos.

6. Contenido del envase e información adicional ¿Qué sustancias contiene este medicamento?
 - La sustancia activa en este medicamento es permetrina. 1 g de crema contiene 50 mg de permetrina (25:75).
 - Los otros ingredientes en este medicamento son alcohol cetostearílico (tipo A), emulsionante, parafina líquida, parafina blanca suave, ácido sórbico y agua purificada.

¿Cómo es Permetrina InfectoPharm y qué contiene un envase?

Permetrina InfectoPharm es una crema blanca y suave.

Permetrina InfectoPharm está disponible en envases de 30 g y 60 g de crema.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase mencionados.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1

64646 Heppenheim Alemania

Para obtener toda la información relacionada con este medicamento, póngase en contacto con su médico o farmacéutico (y enfermero). Si lo desea, también puede ponerse en contacto con el representante local del titular de la autorización de comercialización:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk Países Bajos

Registrado en el registro bajo: RVG 127560

Este medicamento está registrado en los estados miembros del Espacio Económico Europeo bajo los siguientes nombres:

Dinamarca: Perxine

Finlandia: Perxine 50 mg/g emulsiovoide Alemania: Permethrin Infectopharm 50 mg/g

Crema Italia: InfectoScab

Países Bajos: Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème Noruega: Perxine

Portugal: InfectoScab

Este prospecto fue aprobado por última vez en septiembre de 2024.

Transtoyou