

Pakkausseloste: tietoa potilaalle

Permetriini InfectoPharm, 50 mg/g, voide
Permetriini (25:75)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuten lääkärisi, apteekkihenkilökuntasi tai sairaanhoitajasi on neuvonut.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla vielä kysyttävää? Ota sitten yhteyttä apteekkiisi.
- Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi, apteekkihenkilökuntaasi tai sairaanhoitajaasi.
- Eikö vaivasi helpota tai paheneeko se jopa? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Permetriini InfectoPharm on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen?
3. Miten käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Permetriini InfectoPharm on ja mihin sitä käytetään?

Permetriini InfectoPharmin vaikuttava aine on permetriini.

Permetriini kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan pyretroidit. Nämä ovat loislääkkeitä.

Tätä lääkettä käytetään syyhyn (kapi) hoitoon aikuisilla, nuorilla ja vähintään 2 kuukauden ikäisillä lapsilla. Syyhy on ihosairaus.

2. Milloin et saa käyttää tätä lääkettä tai milloin sinun on oltava erityisen varovainen sen kanssa?

Milloin et saa käyttää tätä lääkettä?

- Olet allerginen permetriinille, muille pyretriineille tai jollekin tämän lääkkeen muista aineista. Nämä aineet löydät tämän pakkausselosteen kohdasta 6.

Milloin sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen kuin käytät tätä lääkettä.

- Käsitteletkö vauvoja? Lue sitten kohta "Lapset, jotka ovat enintään 23 kuukauden ikäisiä".
- Jos sinulla on tunnettu allergia krysanteemeille tai muille kasvilajeille, jotka kuuluvat kasviheimoon nimeltä Asteraceae (Compositae) - voit käyttää tätä lääkettä vain lääkärisi suostumuksella.

Varoitus

Vain ulkoiseen käyttöön (kutaaneihin)! Älä niele tätä lääkettä.

Voide voi aiheuttaa ärsytystä silmän sidekalvolle. Varmista, ettei tämä lääke joudu kosketuksiin silmien tai limakalvojen (nenässä tai kurkussa, tai peniksessä tai emättimessä) tai avoimien haavojen kanssa. Jos näin tapahtuu, huuhtelee alue heti vedellä.

Terveystieteiden työntekijöille, jotka käyttävät permetriiniä, suositellaan käsineiden käyttöä.

Tämä lääke on haitallinen kaikille hyönteisille ja kissoille. Se on myös haitallinen vesieläimille, kuten kaloille. Varmista, ettei tämä lääke joudu kosketuksiin näiden eläinten kanssa. Varmista myös, ettei tämä lääke joudu akvaarioon tai hyönteis- tai matelijaterraarioon.

Tämä lääke voi pahentaa astman tai ekseeman oireita.

Lapset, jotka ovat enintään 23 kuukauden ikäisiä

Älä käytä tätä lääkettä vastasyntyneille ja alle 2 kuukauden ikäisille vauvoille, ellei lääkärisi niin määrää. Vauvojen ja taaperoiden kohdalla ei ole riittävästi kokemusta. Hoito voidaan antaa vain enintään 23 kuukauden ikäisille lapsille tarkassa lääkärin valvonnassa.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Permetrine InfectoPharm -lääkkeen lisäksi muita lääkkeitä, oletko tehnyt niin äskettäin tai aiotko tehdä niin pian? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Raskaus ja imetys

Oletko raskaana, luuletko olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi ennen kuin käytät tätä lääkettä.

Joidenkin tietojen mukaan permetriinin käyttö raskaana olevilla naisilla ei ole haitallista. Käytä tätä lääkettä turvallisuuden vuoksi mieluummin ei raskauden aikana. Tee niin vain, jos lääkärisi neuvoo sinua siihen.

Permetriini, tämän lääkkeen vaikuttava aine, voi kulkeutua äidinmaitoon. Turvallisuuden vuoksi älä imetä viiteen päivään tämän lääkkeen käytön jälkeen.

Permetriini InfectoPharm sisältää parafiineja

Käytätkö lateksituotteita (kuten kondomeja, pessaareja) samanaikaisesti tämän lääkkeen kanssa? Voiteen apuaineet voivat heikentää lateksituotteiden toimintaa. Tämä voi tehdä lateksituotteista vähemmän luotettavia.

Permetriini InfectoPharm sisältää setostearyylialkoholia ja sorbiinihappoa

Setostearyylialkoholi ja sorbiinihappo voivat aiheuttaa ihoärsytystä kyseisellä alueella (kuten kutiseva ihottuma (kosketusihottuma)).

3. Miten käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Levitä varovasti ohut kerros voidetta iholle (katso "Miten ja milloin käytät tätä lääkettä?")

Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

Levitä enintään 30 g voidetta (vastaa yhtä 30 g tuubia tai ½ 60 g tuubia)

6–12-vuotiaat lapset

Levitä enintään 15 g voidetta (vastaa ½ 30 g tuubia tai ¼ 60 g tuubia)

2 kuukauden ikäiset ja 5-vuotiaat lapset

Levitä enintään 7,5 g voidetta (vastaa ¼ 30 g tuubia tai ⅛ 60 g tuubia)

Vastasyntyneet ja alle 2 kuukauden ikäiset imeväiset

Tässä ikäryhmässä on vain vähän tietoa saatavilla, eikä annosta voida suositella (katso myös "Varoitukset ja varotoimet").

Yllä oleva selitys on arvio. Annosta voidaan muuttaa. Tämä riippuu siitä, kuinka paljon potilas tarvitsee ja kehon koosta. Esimerkiksi jotkut aikuiset tarvitsevat enemmän voidetta. Jos kasvoja, korvia tai päänahkaa hoidetaan, voidaan käyttää enemmän voidetta.

Miten ja milloin käytät tätä lääkettä?

Tämä lääke on tarkoitettu vain iholle (kutaninen).

Varmista, ettei voidetta joudu silmiin. Älä myöskään anna sen joutua kosketuksiin limakalvojen kanssa (nenässä tai kurkussa, tai peniksessä tai emättimessä) tai avoimien haavojen kanssa. Jos näin tapahtuu vahingossa, huuhtelee hyvin vedellä.

Aikuisten tulee levittää voidetta koko keholle, myös kaulaan, käsien sisäpuolelle ja jalkapohjiin. Päättä ja kasvoja ei tarvitse käsitellä, paitsi jos nämä alueet ovat syyhyhampaiden (kutina) vaivaamia. Voidetta käytettäessä tulee sormien ja varpaiden väliset alueet (myös kynsien alla), ranteet, kyynärpäät, kainalot, peniksen tai emättimen ulkopuolinen alue ja pakarat voidella huolellisesti.

Lapset

Lasten tulee levittää voidetta huolellisesti koko keholle. Tämä koskee myös käsien sisäpuolta, jalkapohjia, kaulaa, kasvoja, korvia ja päänahkaa. Suun ympärillä oleva iho (koska voidetta voidaan nuolla pois) ja silmät tulee jättää käsittelemättä.

Varmista, että lapsesi ei nuole voidetta käsistään. Tarvittaessa lasten tulee käyttää käsineitä. Tämän lääkkeen käytöstä vauvoilla ja taaperoilla ei ole riittävästi kokemusta. Alle 23 kuukauden ikäisten lasten hoito tulee siksi suorittaa vain terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.

lääkkäät

lääkkäiden potilaiden (yli 65-vuotiaiden) tulee käyttää voidetta samalla tavalla kuin aikuisten.

Lisäksi tulee käsitellä myös kasvot, korvat ja päänahka. Varmista, että voidetta ei levitetä silmien ympärillä olevalle iholle.

Kuinka kauan tätä lääkettä tulee käyttää?

Yleensä riittää, että tätä lääkettä käytetään kerran.

Anna voiteen vaikuttaa iholla 8–14 tuntia, esimerkiksi nukkuessasi. Älä käy kylvyssä, suihkussa tai pese itseäsi tänä aikana. Tämä ei ole sallittua, koska hoito ei ehkä toimi. Jos joudut poikkeuksellisesti pesemään kätesi tänä aikana, levitä voide uudelleen käsiin ja ranteisiin. Tämä koskee myös muita hoidettuja ihoalueita, jotka on pestävä (pakarot, peniksen tai emättimen ulkopuoli).

Ota 8–14 tunnin kuluttua suihku tai pese ihosi vedellä ja saippualla.

Jos tätä ohjetta noudatetaan, yleensä riittää, että tätä lääkettä käytetään kerran hyvän hoidon saamiseksi. Joskus voi olla, että infektio ei täysin parane tai uusiutuu. Harkitse tällöin toista hoitoa 7–14 päivää ensimmäisen hoidon jälkeen.

Mitä muuta sinun tulee huomioida?

Kaikkien, jotka ovat olleet kanssasi tekemisissä, tulee käydä mahdollisimman pian lääkärissä. Tämä koskee erityisesti perheenjäseniäsi ja kumppaneitasi. Lääkäri päättää, tarvitsevatko nämä henkilöt myös hoitoa.

Jos tartunnan saaneet henkilöt, joiden kanssa olet ollut tekemisissä, eivät saa hoitoa riittävän nopeasti, he voivat tartuttaa sinut uudelleen syyhypunkilla.

Sinun tulee myös

- pitää kynnet lyhyinä ja puhdistaa ne huolellisesti
- vaihtaa vaatteet, vuodevaatteet ja pyyhkeet päivittäin, 4 päivän ajan. Pese nämä vähintään 60 °C lämpötilassa
- säilytä esineitä, joita et voi pestä vähintään 60 °C lämpötilassa (kuten päällysvaatteet) muutaman päivän ajan suljetussa muovipussissa
- imuroi matot ja verhoillut huonekalut huolellisesti

Luuleeko, että tämä lääke vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Älä huolehdi yliannostuksesta, jos levität tätä lääkettä kehosi ulkopuolelle.

Oletko niellyt voidetta vahingossa tai tarkoituksella? Ota sitten mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin. Lääkäri päättää, mitä on tehtävä.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Käytä voidetta mahdollisimman pian, jos olet unohtanut sen.

Jos lopetat tämän lääkkeen käytön

Yleensä riittää, että käytät tätä lääkettä kerran. Onko lääkärisi neuvonut käyttämään voidetta uudelleen? Noudata sitten lääkärin ohjeita. Muuten et ehkä parane täysin.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan koe niitä.

Ota heti yhteyttä lääkäriin vakavien yliherkkyysoireiden sattuessa! Silloin et saa enää käyttää tätä lääkettä.

Usein (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

Kutina (pruritus), punainen iho tai tuntemukset iholla (parestesia) kuten kihelmöinti, pistely tai polttava tunne iholla. Nämä oireet voivat myös johtua itse sairaudesta.

Kosteuttavia voiteita ja kylpyöljyä suositellaan jatkohoidoksi kuivalle iholle. Kutina ja ihottuma (ekseema syhyhyn jälkeen) voivat jatkua neljä viikkoa hoidon päättymisen jälkeen. Tämä johtuu reaktiosta kuolleisiin syyhypunkkeihin. Luuleeko, että olet edelleen saanut tartunnan tämän lääkkeen käytön jälkeen? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi ennen kuin käytät tätä lääkettä uudelleen.

Harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 1 000:sta) Päänsärky esiintyy harvoin.

Hyvin harvoin (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta)

Hyvin harvoin on raportoitu ihovaurioita (excoriatioita), karvatupen tulehdusta (follikuliitti) ja ihon vaalenemista tämän lääkkeen käytön aikana.

Herkkien/allergisten henkilöiden on raportoitu kokeneen hengitysvaikeuksia, kun pyretriiniryhmän aineita on käytetty.

Tuntematon (ei voida määrittää käytettävissä olevien tietojen perusteella)

On mahdollista, että saat allergisia reaktioita iholla (kosketusallergiareaktiot). Näihin kuuluvat oireet kuten kutina, punainen iho, rakkulat tai nokkosihottuma (urtikaria). Nämä reaktiot voivat levitä myös hoidetun ihoalueen ulkopuolelle. Voit myös tulla pahoinvoivaksi. Oksentelua ei ole raportoitu tämän lääkkeen käytön jälkeen. Tämä on kuitenkin tunnettu haittavaikutus muista lääkkeistä, jotka sisältävät perimetriiniä.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos saat haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, verkkosivusto: www.fimea.fi. Haittavaikutuksista ilmoittamalla autat meitä saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Löydät sen tuubista ja ulkopakkauksesta EXP:n jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita.

Tämä lääke on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa tuubin avaamisesta.

Älä huuhtele lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeet oikein, ne tuhotaan asianmukaisesti eivätkä päädy ympäristöön.

Permetriini on erittäin myrkyllistä vesieläimille, maaperässä ja maalla eläville eläimille. Siksi on tärkeää, että tämä lääke ei joudu kosketuksiin kalakulhojen (akvaarioiden) ja säiliöiden kanssa, joissa hyönteiset ja matelijat elävät (terraariot). Varmista myös, että tämä lääke ei joudu kosketuksiin (myös iholla ollessaan) selkärangattomien eläinten, erityisesti hyönteisten, kanssa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä aineita tämä lääke sisältää?
- Tämän lääkkeen vaikuttava aine on permetriini.
1 g voide sisältää 50 mg permetriiniä (25:75).
 - Muut tämän lääkkeen aineet ovat setostearyylialkoholi (tyyppi A), emulgointiaine, nestemäinen parafiini, valkoinen pehmeä parafiini, sorbiinihappo ja puhdistettu vesi.

Miltä Permetrine InfectoPharm näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Permetrine InfectoPharm on pehmeä, valkoinen voide.

Permetrine InfectoPharm on saatavilla 30 g ja 60 g voidepakkauksissa.

On mahdollista, että kaikkia mainittuja pakkauskokoja ei tuoda markkinoille.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1
64646 Heppenheim Saksa

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi (ja sairaanhoitajaasi) saadaksesi kaikki tiedot tästä lääkkeestä. Halutessasi voit myös ottaa yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan: Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk Alankomaat

Rekisteröity numerolla: RVG 127560

Tämä lääke on rekisteröity Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Tanska: Perxine

Suomi: Perxine 50 mg/g emulsiovoide Saksa: Permethrin Infectopharm 50 mg/g Creme

Italia: InfectoScab

Alankomaat: Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème Norja: Perxine

Portugali: InfectoScab

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty syyskuussa 2024.