

Notice : information pour le patient

Perméthrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème
Perméthrine (25:75)

Lisez attentivement toute la notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Utilisez toujours ce médicament exactement comme décrit dans cette notice ou selon les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/infirmière.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre pharmacien.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin, pharmacien ou infirmier/infirmière.
- Votre problème ne s'améliore-t-il pas, ou s'aggrave-t-il même ? Contactez alors votre médecin.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Perméthrine InfectoPharm et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?
 2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous faire preuve de prudence ?
 3. Comment utiliser ce médicament ?
 4. Effets indésirables possibles
 5. Comment conserver ce médicament ?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations
-
1. Qu'est-ce que Perméthrine InfectoPharm et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

La substance active dans Perméthrine InfectoPharm est la perméthrine.

La perméthrine appartient à un groupe de médicaments appelés pyréthri-noïdes. Ce sont des médicaments antiparasitaires.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de la gale (acariens de la démangeaison) chez les adultes, les adolescents et les enfants d'au moins 2 mois. La gale est une maladie de la peau.

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament?

- Vous êtes allergique à la perméthrine, à d'autres pyréthrines ou à l'une des autres substances contenues dans ce médicament. Vous pouvez trouver ces substances dans la rubrique 6 de cette notice.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament?

Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

- Traitez-vous des bébés? Lisez alors la rubrique « Enfants jusqu'à 23 mois inclus ».
- Si vous avez une allergie connue aux chrysanthèmes ou à d'autres plantes de la famille des Astéracées (Composées) - vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avoir consulté votre médecin.

Avertissement

Uniquement pour usage cutané! Ne pas avaler ce médicament.

La crème peut provoquer des irritations de la conjonctive de l'œil. Assurez-vous que ce médicament n'entre pas en contact avec les yeux ou les muqueuses (dans le nez ou la gorge, ou sur le pénis ou le vagin), ou avec des plaies ouvertes. Cela se produit-il quand même? Rincez immédiatement la zone avec de l'eau.

Il est conseillé aux professionnels de santé utilisant la perméthrine de porter des gants.

Ce médicament est nocif pour tous les types d'insectes et les chats. Il est également nocif pour les animaux aquatiques, comme les poissons. Assurez-vous que ce médicament n'entre pas en contact avec ces animaux. Assurez-vous également que ce médicament n'entre pas dans un aquarium ou un terrarium contenant des insectes ou des reptiles.

Ce médicament peut aggraver les symptômes de l'asthme ou de l'eczéma.

Enfants jusqu'à 23 mois inclus

N'utilisez pas ce médicament chez les nouveau-nés et les bébés de moins de 2 mois, sauf indication contraire de votre médecin. Il n'y a pas suffisamment d'expérience chez les bébés et les tout-petits. Le traitement ne doit être administré aux enfants jusqu'à 23 mois que sous surveillance médicale étroite.

Prenez-vous d'autres médicaments?

Prenez-vous d'autres médicaments en plus de Perméthrine InfectoPharm, l'avez-vous fait récemment ou allez-vous peut-être le faire bientôt? Informez-en alors votre médecin ou votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, souhaitez-vous le devenir ou allaitez-vous? Contactez alors votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

D'après certaines données sur l'utilisation de la perméthrine chez les femmes enceintes, il semble qu'elle ne soit pas nocive. Pour plus de sécurité, évitez d'utiliser ce médicament pendant la grossesse. Ne le faites que si votre médecin vous le conseille.

La perméthrine, la substance active de ce médicament, peut passer dans le lait maternel. Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas allaiter pendant cinq jours après l'utilisation de ce médicament.

Perméthrine InfectoPharm contient des paraffines

Utilisez-vous des produits en latex (comme des préservatifs, des pessaires) en même temps que ce médicament ? Les excipients de la crème peuvent réduire l'efficacité des produits en latex. Cela peut les rendre moins fiables.

Perméthrine InfectoPharm contient de l'alcool cétostéarylique et de l'acide sorbique. L'alcool cétostéarylique et l'acide sorbique peuvent provoquer des réactions cutanées à cet endroit (comme une éruption cutanée prurigineuse (dermatite de contact)).

3. Comment utilisez-vous ce médicament ?

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Appliquez délicatement une fine couche de crème sur la peau (voir « Comment et quand utilisez-vous ce médicament ? »)

Adultes et adolescents de plus de 12 ans

Appliquez jusqu'à 30 g de crème (équivalent à 1 tube de 30 g ou ½ tube de 60 g)

Enfants de 6 à 12 ans

Appliquez jusqu'à 15 g de crème (équivalent à ½ tube de 30 g ou ¼ tube de 60 g)

Enfants de 2 mois à 5 ans

Appliquez jusqu'à 7,5 g de crème (équivalent à ¼ tube de 30 g ou ⅛ tube de 60 g)

Nouveaux-nés et nourrissons de moins de 2 mois

Il y a peu de données disponibles pour ce groupe d'âge et aucune dose ne peut être conseillée (voir aussi « Avertissements et précautions »).

L'explication ci-dessus est une estimation. La dose peut être ajustée. Cela dépend de la quantité nécessaire pour le patient et de la taille du corps. Certains adultes, par exemple, peuvent avoir besoin de plus de crème. Si le visage, les oreilles ou le cuir chevelu sont traités, plus de crème peut être utilisée.

Comment et quand utilisez-vous ce médicament ?

Ce médicament est uniquement à usage cutané.

Assurez-vous que la crème ne pénètre pas dans vos yeux. Ne la laissez pas non plus entrer en contact avec les muqueuses (dans le nez ou la gorge, ou sur le pénis ou le vagin) ou avec des plaies ouvertes. Cela arrive-t-il par accident ? Rincez alors abondamment à l'eau.

Les adultes doivent appliquer la crème sur tout le corps, y compris le cou, l'intérieur des mains et sous les pieds. La tête et le visage ne sont pas nécessaires, sauf si ces zones sont touchées par la gale (acariens de démangeaison). Lors de l'utilisation de la crème, les zones entre les doigts et les orteils (y compris sous les ongles des mains et des pieds), les poignets, les coudes, les aisselles, la zone à l'extérieur du pénis ou du vagin et les fesses doivent être bien enduites.

Enfants

Les enfants doivent bien répartir la crème sur tout le corps. Cela doit également être fait à l'intérieur des mains, sous les pieds, le cou, le visage, les oreilles et le cuir chevelu. Les parties de

la peau autour de la bouche (car la crème peut être léchée) et les yeux doivent être laissés libres.

Assurez-vous que votre enfant ne lèche pas la crème de ses mains. Si nécessaire, les enfants doivent porter des gants. Il n'y a pas assez d'expérience avec ce médicament chez les bébés et les tout-petits. Le traitement des enfants jusqu'à 23 mois ne doit donc être effectué qu'en présence d'un professionnel de santé.

Personnes âgées

Les patients âgés (de plus de 65 ans) doivent utiliser la crème de la même manière que les adultes. De plus, le visage, les oreilles et le cuir chevelu doivent également être traités. Assurez-vous que la crème n'est pas appliquée sur la peau autour des yeux.

Combien de temps devez-vous utiliser ce médicament ?

Il est généralement suffisant d'utiliser ce médicament une seule fois.

Laissez la crème sur la peau pendant 8 à 14 heures, par exemple pendant que vous dormez. Ne prenez pas de bain, ne vous douchez pas et ne vous lavez pas pendant cette période. Cela ne doit pas être fait car le traitement pourrait ne pas fonctionner. Devez-vous exceptionnellement vous laver les mains pendant cette période ? Appliquez à nouveau la crème sur vos mains et poignets. Cela s'applique également si vous devez laver d'autres parties de la peau traitée (fesses, l'extérieur du pénis ou du vagin).

Prenez une douche ou lavez votre peau avec de l'eau et du savon après 8 à 14 heures.

Si ces instructions sont suivies, il est généralement suffisant d'utiliser ce médicament une seule fois pour un bon traitement. Parfois, il est possible qu'une infection ne disparaisse pas complètement ou réapparaisse. Envisagez alors de faire un autre traitement, 7 à 14 jours après le premier traitement.

À quoi devez-vous faire attention d'autre ?

Toute personne en contact avec vous doit consulter un médecin dès que possible. Cela s'applique surtout à vos membres de la famille et partenaires. Le médecin décide si ces personnes doivent également être traitées.

Les personnes infectées avec lesquelles vous avez été en contact ne sont pas traitées assez rapidement ? Il est possible qu'elles vous réinfectent avec la gale.

Vous devez également

- garder vos ongles courts et bien les nettoyer
- changer de vêtements, de literie et de serviettes tous les jours, pendant 4 jours. Lavez-les à une température d'au moins 60 °C
- conserver les articles que vous ne pouvez pas laver à une température d'au moins 60 °C (comme les vêtements d'extérieur) pendant quelques jours dans un sac en plastique fermé
- passer l'aspirateur sur les tapis et les meubles rembourrés

Pensez-vous que ce médicament agit trop fortement ou trop faiblement ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Ne vous inquiétez pas d'un surdosage si vous appliquez ce médicament à l'extérieur de votre corps.

Avez-vous avalé la crème par accident ou intentionnellement ? Contactez alors un médecin dès que possible. Le médecin décidera alors de ce qu'il faut faire.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

Utilisez la crème dès que possible si vous l'avez oublié.

Si vous arrêtez d'utiliser ce médicament

Il est généralement suffisant d'utiliser ce médicament une seule fois. Votre médecin vous a-t-il conseillé de réutiliser la crème ? Suivez alors les instructions du médecin. Sinon, vous ne guérez peut-être pas complètement.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets secondaires. Tout le monde n'y est pas confronté.

Contactez immédiatement un médecin en cas de réactions d'hypersensibilité sévères ! Vous ne devez alors plus utiliser ce médicament.

Souvent (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10)

Démangeaisons (prurit), peau rouge ou sensations cutanées (paresthésie) telles qu'une sensation de picotement, de piqûre ou de brûlure de la peau. Ces symptômes peuvent également être causés par la maladie elle-même.

Les crèmes hydratantes et les huiles de bain sont conseillées comme traitement de suivi pour la peau sèche. Les démangeaisons et l'éruption cutanée (eczéma après gale) peuvent persister jusqu'à quatre semaines après la fin du traitement. Cela est dû à une réaction aux acariens de la gale tués. Pensez-vous être encore infecté après l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin avant de réutiliser ce médicament.

Rarement (survient chez moins de 1 utilisateur sur 1 000) Les maux de tête surviennent rarement.

Très rarement (surviennent chez moins de 1 utilisateur sur 10 000)

Très rarement, des lésions cutanées (excoriations), une inflammation des follicules pileux (folliculite) et un éclaircissement de la peau ont été signalés lors de l'utilisation de ce médicament.

Des personnes sensibles/allergiques ont signalé des difficultés respiratoires lors de l'utilisation de substances du groupe des pyréthrinés.

Inconnu (ne peut être déterminé avec les données disponibles)

Il est possible que vous ayez des réactions allergiques cutanées (réactions allergiques de contact). Cela inclut des symptômes tels que des démangeaisons, une peau rouge, des cloques ou de l'urticaire. Ces réactions peuvent également se propager en dehors de la zone traitée de la peau. Vous pouvez également ressentir des nausées. Les vomissements n'ont pas été signalés

après l'utilisation de ce médicament. C'est cependant un effet secondaire connu d'autres médicaments contenant de la perméthrine.

Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web : www.lareb.nl. En signalant les effets indésirables, vous nous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Celle-ci est indiquée sur le tube et l'emballage extérieur après EXP. Cela inclut un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Il n'y a pas de conditions de conservation particulières pour ce médicament.
Ce médicament doit être utilisé dans les trois mois suivant la première ouverture du tube.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous éliminez les médicaments correctement, ils seront détruits de manière appropriée et ne finiront pas dans l'environnement.

La perméthrine est très toxique pour les animaux vivant dans l'eau, dans le sol et sur le sol. Il est donc important que ce médicament n'entre pas en contact avec les aquariums et les terrariums où vivent des insectes et des reptiles. Assurez-vous également que ce médicament n'entre pas en contact (même s'il est sur la peau) avec des animaux sans vertèbres, en particulier les insectes.

6. Contenu de l'emballage et autres informations Quelles substances contient ce médicament ?

- La substance active de ce médicament est la perméthrine.
1 g de crème contient 50 mg de perméthrine (25:75).
- Les autres substances de ce médicament sont l'alcool cétylstéarylique (type A), émulsifiant, paraffine liquide, paraffine molle blanche, acide sorbique et eau purifiée.

À quoi ressemble Perméthrine InfectoPharm et que contient un emballage ?

Perméthrine InfectoPharm est une crème douce et blanche.

Perméthrine InfectoPharm est disponible en emballages de 30 g et 60 g de crème.

Il est possible que toutes les tailles d'emballage mentionnées ne soient pas commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1

64646 Heppenheim Allemagne

Pour toute information concernant ce médicament, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien (et infirmier). Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD Ridderkerk Pays-Bas

Enregistré sous : RVG 127560

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'Espace économique européen sous les noms suivants :

Danemark : Perxine

Finlande : Perxine 50 mg/g emulsiovoide Allemagne : Permethrin Infectopharm 50 mg/g

Crème Italie : InfectoScab

Pays-Bas : Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, crème Norvège : Perxine

Portugal : InfectoScab

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en septembre 2024.