

Prospect: informații pentru pacient

Permetrină InfectoPharm, 50 mg/g, cremă
Permetrină (25:75)

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau conform indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.
- Aveți întrebări? Contactați farmacistul dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Dacă simptomele nu se ameliorează sau se agravează, contactați medicul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect

1. Ce este Permetrină InfectoPharm și pentru ce se utilizează acest medicament?
 2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?
 3. Cum se utilizează acest medicament?
 4. Reacții adverse posibile
 5. Cum se păstrează acest medicament?
 6. Conținutul ambalajului și alte informații
1. Ce este Permetrină InfectoPharm și pentru ce se utilizează acest medicament?

Substanța activă din Permetrină InfectoPharm este permetrina.

Permetrina face parte dintr-un grup de medicamente numite piretroide. Acestea sunt medicamente antiparazitare.

Acest medicament este utilizat pentru tratamentul scabiei (acarienii de mâncărime) la adulți, adolescenți și copii de cel puțin 2 luni. Scabia este o afecțiune a pielii.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

- Sunteți alergic la permetrină, alte piretrine sau la oricare dintre celelalte substanțe din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6 a acestui prospect.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

- Tratați bebeluși? Citiți atunci secțiunea „Copii cu vârsta de până la 23 de luni”.
- Dacă aveți o alergie cunoscută la crizanteme sau alte specii de plante din familia Asteraceae (Compositae) - puteți utiliza acest medicament doar după consultarea medicului dumneavoastră.

Avertisment

Doar pentru uz extern (cutanat)! Nu înghițiți acest medicament.

Crema poate provoca iritații ale conjunctivei ochiului. Asigurați-vă că acest medicament nu intră în contact cu ochii sau mucoasele (în nas sau gât, sau în penis sau vagin), sau cu răni deschise. Se întâmplă acest lucru? Clătiți imediat zona cu apă.

Persoanelor care lucrează în domeniul sănătății și utilizează permetrină li se recomandă să poarte mănuși.

Acest medicament este dăunător pentru toate tipurile de insecte și pisici. Este, de asemenea, dăunător pentru animalele care trăiesc în apă, cum ar fi peștii. Asigurați-vă că acest medicament nu intră în contact cu aceste animale. De asemenea, asigurați-vă că acest medicament nu ajunge într-un acvariu sau într-un terariu cu insecte sau reptile.

Acest medicament poate agrava simptomele de astm sau eczemă.

Copii cu vârsta de până la 23 de luni

Nu utilizați acest medicament la nou-născuți și bebeluși mai mici de 2 luni, decât dacă medicul dumneavoastră vă spune. Nu există suficientă experiență la bebeluși și copii mici. Tratamentul poate fi administrat doar copiilor de până la 23 de luni sub supraveghere medicală atentă.

Utilizați și alte medicamente?

Utilizați, pe lângă Permetrine InfectoPharm, și alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau intenționați să faceți acest lucru în curând? Informați medicul sau farmacistul.

Sarcina și alăptarea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul înainte de a utiliza acest medicament.

Din câteva date despre utilizarea permetrinei la femeile gravide reiese că nu este dăunătoare. Totuși, pentru siguranță, nu utilizați acest medicament în timpul sarcinii. Faceți acest lucru doar dacă medicul dumneavoastră vă recomandă.

Permetrina, substanța activă din acest medicament, poate ajunge în laptele matern. Pentru siguranță, nu trebuie să alăptați timp de cinci zile după utilizarea acestui medicament.

Permetrina InfectoPharm conține parafine

Folosiți produse din latex (cum ar fi prezervative, diafragme) în același timp cu acest medicament? Excipienții din cremă pot face ca produsele din latex să funcționeze mai puțin eficient. Astfel, produsele din latex pot fi mai puțin fiabile.

Permetrina InfectoPharm conține alcool cetostearilic și acid sorbic

Alcoolul cetostearilic și acidul sorbic pot provoca reacții cutanate la locul aplicării (cum ar fi o erupție cutanată pruriginoasă (dermatită de contact)).

3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul.

Aplicați cu grijă un strat subțire de cremă pe piele (vezi „Cum și când utilizați acest medicament?”)

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani

Aplicați maximum 30 g de cremă (este același lucru cu 1 tub de 30 g sau ½ tub de 60 g)

Copii cu vârsta între 6 și 12 ani

Aplicați maximum 15 g de cremă (este același lucru cu ½ tub de 30 g sau ¼ tub de 60 g)

Copii cu vârsta între 2 luni și 5 ani

Aplicați până la 7,5 g de cremă (este același lucru cu ¼ tub de 30 g sau ⅛ tub de 60 g)

Nou-născuți și sugari mai mici de 2 luni

Există foarte puține date disponibile pentru acest grup de vârstă și nu se poate recomanda o doză (vezi și „Atenționări și precauții”).

Explicația de mai sus este o estimare. Doza poate fi ajustată. Aceasta depinde de cât de mult are nevoie pacientul și de dimensiunea corpului. De exemplu, unii adulți au nevoie de mai multă cremă. Dacă fața, urechile sau scalpul sunt tratate, se poate folosi mai multă cremă.

Cum și când utilizați acest medicament?

Acest medicament este doar pentru uz extern (cutanat).

Asigurați-vă că crema nu ajunge în ochi. De asemenea, nu lăsați să intre în contact cu mucoasele (în nas sau gât, sau în penis sau vagin) sau cu rănilor deschise. Se întâmplă accidental? Clătiți bine cu apă.

Adulții trebuie să aplice crema pe tot corpul, inclusiv pe gât, pe interiorul mâinilor și sub picioare. Capul și fața nu trebuie, cu excepția cazului în care aceste zone sunt afectate de scabie (acarieni de mâncărime). La utilizarea cremei, zonele dintre degete și degetele de la picioare (inclusiv sub unghii și unghiile de la picioare), încheieturile, coatele, axilele, zona exterioară a penisului sau vaginului și fesele trebuie bine unse.

Copii

Copiii trebuie să distribuie bine crema pe tot corpul. Acest lucru trebuie făcut și pe interiorul mâinilor, sub picioare, pe gât, față, urechi și scalp. Zonele pielii din jurul gurii (deoarece crema poate fi linsă) și ochii trebuie lăsate libere.

Asigurați-vă că copilul dumneavoastră nu linge crema de pe mâini. Dacă este necesar, copiii trebuie să poarte mănuși. Nu există suficientă experiență cu acest medicament la sugari și copii mici. Tratamentul copiilor până la 23 de luni trebuie făcut doar sub supravegherea unei persoane care lucrează în domeniul sănătății.

Vârstnici

Pacienții vârstnici (peste 65 de ani) trebuie să folosească crema în același mod ca și adulții. În plus, trebuie tratate și fața, urechile și scalpul. Asigurați-vă că crema nu este aplicată pe pielea din jurul ochilor.

Cât timp trebuie să folosiți acest medicament?

De obicei, este suficient să folosiți acest medicament o singură dată.

Lăsați crema pe piele timp de 8 până la 14 ore, de exemplu, în timp ce dormiți. Nu faceți baie, nu faceți duș și nu vă spălați în această perioadă. Acest lucru nu este permis deoarece tratamentul poate să nu funcționeze. Trebuie să vă spălați mâinile în această perioadă? Aplicați din nou crema pe mâini și încheieturi. Acest lucru este valabil și dacă trebuie să spălați alte părți ale pielii tratate (fesele, exteriorul penisului sau vaginului).

După 8 până la 14 ore, faceți un duș sau spălați-vă pielea cu apă și săpun.

Dacă urmați aceste instrucțiuni, de obicei este suficient să folosiți acest medicament o singură dată pentru un tratament eficient. Uneori, este posibil ca o infecție să nu dispară complet sau să revină. În acest caz, luați în considerare efectuarea unui alt tratament, la 7 până la 14 zile după primul tratament.

La ce altceva trebuie să fiți atenți?

Toți cei care intră în contact cu dumneavoastră trebuie să viziteze un medic cât mai curând posibil. Acest lucru este valabil mai ales pentru membrii familiei și partenerii dumneavoastră.

Medicul decide dacă aceste persoane trebuie, de asemenea, tratate.

Persoanele infectate cu care ați avut contact nu sunt tratate suficient de repede? Atunci este posibil ca acestea să vă infecteze din nou cu scabie.

De asemenea, trebuie să

- țineți unghiile scurte și bine curățate
- schimbați zilnic hainele, lenjeria de pat și prosoapele, timp de 4 zile. Spălați-le la o temperatură de cel puțin 60 °C
- păstrați articolele pe care nu le puteți spăla la o temperatură de cel puțin 60 °C (cum ar fi hainele de exterior) câteva zile într-o pungă de plastic închisă
- aspirați bine covoarele și mobilierul tapițat

Credeți că acest medicament acționează prea puternic sau prea slab? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Nu vă faceți griji cu privire la supradozaj dacă aplicați acest medicament pe exteriorul corpului.

Ați înghițit crema din greșeală sau intenționat? Contactați un medic cât mai curând posibil.

Medicul va decide ce trebuie făcut.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Utilizați crema cât mai curând posibil dacă ați uitat.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

De obicei, este suficient să utilizați acest medicament o singură dată. V-a sfătuit medicul să utilizați din nou crema? Urmați instrucțiunile medicului. Altfel, este posibil să nu vă vindecați complet.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea efecte secundare. Nu toată lumea le experimentează.

Contactați imediat un medic în caz de reacții severe de hipersensibilitate! Nu mai utilizați acest medicament.

Frecvent (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

Mâncărime (prurit), piele roșie sau senzații pe piele (parestezie) precum furnicături, înțepături sau senzație de arsură a pielii. Aceste simptome pot apărea și din cauza bolii în sine.

Se recomandă creme hidratante și ulei de baie ca tratament ulterior pentru pielea uscată.

Mâncărimea și erupția cutanată (eczema după scabie) pot persista până la patru săptămâni după încheierea tratamentului. Acest lucru se datorează unei reacții la acarienii de scabie uciși. Credeți că sunteți încă infectat după utilizarea acestui medicament? Contactați medicul înainte de a utiliza din nou acest medicament.

Rareori (apare la mai puțin de 1 din 1.000 de utilizatori) Cefaleea apare rar.

Foarte rar (apare la mai puțin de 1 din 10.000 de utilizatori)

Foarte rar au fost raportate leziuni cutanate (excoriații), inflamația foliculilor de păr (foliculită) și decolorarea pielii în momentul utilizării acestui medicament.

Persoanele sensibile/alergice au raportat dificultăți de respirație în momentul utilizării substanțelor din grupul piretrinei.

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile)

Este posibil să aveți reacții alergice pe piele (reacții alergice de contact). Acestea includ simptome precum mâncărime, piele roșie, vezicule sau urticarie. Aceste reacții se pot răspândi și în afara zonei tratate a pielii. De asemenea, puteți avea greață. Vărsăturile nu au fost raportate după utilizarea acestui medicament. Aceasta este totuși o reacție adversă cunoscută a altor medicamente care conțin permetrină.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru reacțiile adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Puteți raporta reacțiile adverse și prin intermediul Centrului Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb, website: www.lareb.nl. Raportând reacțiile adverse, ne ajutați să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum păstrați acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe tub și pe ambalajul exterior după EXP. Aceasta constă într-o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Pentru acest medicament nu sunt condiții speciale de păstrare.

Acest medicament trebuie utilizat în termen de trei luni de la prima deschidere a tubului.

Nu aruncați medicamentele pe canalizare sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea sunt distruse corect și nu ajung în mediu. Permetrina este foarte toxică pentru animalele care trăiesc în apă, în sol și pe sol. De aceea, este important ca acest medicament să nu intre în contact cu acvarii și terarii. Asigurați-vă, de asemenea, că acest medicament nu intră în contact (chiar dacă este pe piele) cu animale fără vertebre, în special insecte.

6. Conținutul ambalajului și alte informații Ce substanțe conține acest medicament?
- Substanța activă din acest medicament este permetrina.
1 g cremă conține 50 mg permetrină (25:75).
 - Celelalte substanțe din acest medicament sunt alcool cetostearilic (tip A), emulgator, parafină lichidă, parafină moale albă, acid sorbic și apă purificată.

Cum arată Permetrine InfectoPharm și ce conține un ambalaj?

Permetrine InfectoPharm este o cremă moale, albă.

Permetrine InfectoPharm este disponibil în ambalaje de 30 g și 60 g cremă.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj menționate să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Strasse 1

64646 Heppenheim Germania

Pentru toate informațiile referitoare la acest medicament, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră (și asistenta medicală). Dacă doriți, puteți contacta și reprezentantul local al deținătorului autorizației de punere pe piață:

Eureco-Pharma B.V.

Boelewerf 2

2987 VD Ridderkerk Olanda

Înregistrat în registru sub: RVG 127560

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri:

Danemarca: Perxine

Finlanda: Perxine 50 mg/g emulsiovoide Germania: Permethrin Infectopharm 50 mg/g

Cremă Italia: InfectoScab

Olanda: Permetrine InfectoPharm, 50 mg/g, cremă Norvegia: Perxine

Portugalia: InfectoScab

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în septembrie 2024.