

Prospecto: información para el usuario

Priligy 30 mg comprimidos recubiertos con película
Priligy 60 mg comprimidos recubiertos con película
dapoxetina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.

¿Tiene alguna pregunta? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

No dé este medicamento a otras personas, ya que es solo para usted. Puede ser perjudicial para otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted.

¿Experimenta efectos secundarios graves mencionados en la sección 4? ¿O experimenta un efecto secundario que no está en este prospecto? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

Contenido de este prospecto

1. ¿Qué es Priligy y para qué se utiliza?
2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?
3. ¿Cómo debe usar este medicamento?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿Qué es Priligy y para qué se utiliza?

Priligy contiene un principio activo llamado dapoxetina. Esta sustancia pertenece al grupo de medicamentos conocidos como 'inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina' (ISRS). Priligy también puede ser conocido como un medicamento urológico.

Priligy retrasa el tiempo hasta la eyaculación y puede mejorar el control sobre la eyaculación. Esto puede reducir la frustración o preocupación por una eyaculación rápida.

Priligy se utiliza para tratar la eyaculación precoz en hombres adultos de entre 18 y 64 años.

La eyaculación precoz significa que un hombre tiene una eyaculación con poca estimulación sexual y antes de que él lo desee. Esto puede ser difícil para el hombre y puede causar problemas en las relaciones sexuales.

2. ¿Cuándo no debe usar este medicamento o debe tener especial cuidado?

¿Cuándo no debe usar este medicamento?

Es alérgico a la dapoxetina o a alguno de los otros componentes de este medicamento. Puede encontrar estos componentes en la sección 6 de este prospecto.

Tiene problemas con su corazón, como insuficiencia cardíaca o arritmias.
Se ha desmayado en el pasado.
Alguna vez ha tenido manía (los síntomas incluyen sentirse excesivamente excitado, irritable o incapaz de pensar con claridad) o depresión severa.
Usted usa:

- medicamentos contra la depresión del grupo de los 'inhibidores de la monoaminooxidasa' (IMAO)
- tioridazina para el tratamiento de la esquizofrenia
- otros antidepresivos
- litio un medicamento usado en el trastorno bipolar
- linezolid un antibiótico para tratar infecciones
- triptófano un medicamento para dormir mejor
- hierba de San Juan un medicamento a base de hierbas
- tramadol para el tratamiento del dolor severo
- medicamentos para el tratamiento de la migraña

No tome Priligy simultáneamente con ninguno de los medicamentos mencionados anteriormente. Si ha utilizado alguno de estos medicamentos, debe esperar 14 días después de haber dejado de tomarlos antes de comenzar con Priligy. Después de dejar de tomar Priligy, debe esperar 7 días antes de poder usar cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente. Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento (ver sección ¿Está tomando otros medicamentos?).

- ciertos medicamentos para el tratamiento de infecciones por hongos, incluyendo ketoconazol e itraconazol (ver sección ¿Está tomando otros medicamentos?)
- ciertos medicamentos para el tratamiento del VIH, incluyendo ritonavir, saquinavir, nelfinavir y atazanavir (ver sección ¿Está tomando otros medicamentos?)
- ciertos antibióticos para el tratamiento de infecciones, incluyendo telitromicina (ver sección ¿Está tomando otros medicamentos?)
- nefazodona un antidepresivo (ver sección ¿Está tomando otros medicamentos?)
- Tiene problemas hepáticos moderados o severos

No use este medicamento si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted. Si tiene dudas, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento.
¿Cuándo debe tener especial cuidado con este medicamento?

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de tomar Priligy en los siguientes casos:
su médico no ha determinado que sufre de eyaculación precoz
también tiene otro problema sexual como disfunción eréctil
ha tenido mareos en el pasado debido a presión arterial baja
usa drogas (de fiesta) como éxtasis, LSD, narcóticos o benzodiazepinas
bebe alcohol (ver sección ¿Qué debe tener en cuenta con la comida, bebida y alcohol?)

alguna vez ha tenido un trastorno mental como depresión, manía (donde está excesivamente excitado o irritable o no puede pensar con claridad), trastorno bipolar (los síntomas incluyen cambios de humor severos entre manía y depresión) o esquizofrenia (un trastorno psiquiátrico)
tiene epilepsia
ha tenido hemorragias o problemas de coagulación en el pasado
tiene problemas renales
tiene presión alta en el ojo (glaucoma) o tiene riesgo de ello

Si alguna de las situaciones anteriores se aplica a usted (o si tiene dudas), consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Antes de usar este medicamento, su médico debe verificar si su presión arterial no baja demasiado cuando se pone de pie desde una posición acostada.

Niños y adolescentes menores de 18 años

Este medicamento no debe ser utilizado en niños o adolescentes menores de 18 años.

¿Está tomando otros medicamentos?

¿Está tomando otros medicamentos además de Priligy, lo ha hecho recientemente o planea hacerlo pronto? Informe a su médico o farmacéutico. Esto también se aplica a los medicamentos que no requieren receta, como los medicamentos a base de hierbas. Esto se debe a que Priligy puede afectar el funcionamiento de ciertos medicamentos. A la inversa, otros medicamentos también pueden afectar el funcionamiento de Priligy. El uso de otros medicamentos puede, por lo tanto, influir en la dosis máxima de Priligy que puede tomar.

No tome Priligy simultáneamente con alguno de los siguientes medicamentos:

medicamentos antidepresivos del grupo de los 'inhibidores de la monoaminoxidasa' (IMAO)
tioridazina para el tratamiento de la esquizofrenia
otros antidepresivos
litio un medicamento utilizado en el trastorno bipolar
linezolid un antibiótico para tratar infecciones
triptófano un medicamento que le ayuda a dormir mejor
hierba de San Juan un remedio herbal
tramadol para el tratamiento del dolor severo
medicamentos para el tratamiento de la migraña

No tome Priligy simultáneamente con ninguno de los medicamentos mencionados anteriormente. Si ha utilizado alguno de estos medicamentos, debe esperar 14 días después de haber dejado de tomarlos antes de comenzar con Priligy. Después de dejar de tomar Priligy, debe esperar 7 días antes de poder usar cualquiera de los medicamentos mencionados anteriormente. Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

ciertos medicamentos para el tratamiento de infecciones por hongos, incluyendo ketoconazol e itraconazol
ciertos medicamentos para el tratamiento del VIH, incluyendo ritonavir, saquinavir, nelfinavir y atazanavir
ciertos antibióticos para el tratamiento de infecciones, incluyendo telitromicina
nefazodona un antidepresivo

Consulte a su médico o farmacéutico si está usando alguno de los siguientes medicamentos:

medicamentos para trastornos mentales distintos de la depresión
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico
medicamentos que adelgazan su sangre, como warfarina
ciertos medicamentos que se utilizan para tratar la disfunción eréctil, como sildenafil, tadalafil o vardenafil, ya que estos medicamentos pueden reducir su presión arterial al ponerse de pie
ciertos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la presión arterial alta y el dolor en el pecho (angina de pecho) (por ejemplo, verapamilo y diltiazem), o una próstata agrandada, ya que estos medicamentos también pueden reducir su presión arterial al ponerse de pie
ciertos otros medicamentos para el tratamiento de infecciones por hongos, como fluconazol
ciertos otros medicamentos para el tratamiento del VIH, como amprenavir y fosamprenavir
ciertos otros antibióticos para el tratamiento de infecciones, como eritromicina y claritromicina
aprepitant usado contra las náuseas

Si no está seguro de si lo anterior se aplica a usted, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

¿Qué debe tener en cuenta con la comida, bebida y alcohol?

No beba jugo de toronja dentro de las 24 horas previas al uso de este medicamento, ya que esto puede aumentar el nivel de este medicamento en su cuerpo.
Puede tomar este medicamento con o sin alimentos.
Debe tomar este medicamento con al menos un vaso lleno de agua.
Evite el alcohol si está usando este medicamento.
Los efectos del alcohol, como mareos, somnolencia y respuesta lenta, pueden intensificarse si usa este medicamento.
Si bebe alcohol mientras usa este medicamento, aumenta la probabilidad de lesionarse por desmayos u otros efectos secundarios.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Las mujeres no deben usar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Si usa este medicamento, puede sentirse somnoliento, mareado o aturdido, tener dificultad para concentrarse y visión borrosa. Si experimenta estos o efectos similares, no conduzca ni use máquinas peligrosas. Los efectos del alcohol pueden intensificarse si se usa junto con este medicamento y el riesgo de lesiones por desmayos u otros efectos secundarios puede aumentar si usa este medicamento y alcohol al mismo tiempo.

Priligy contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa (un tipo de azúcar). Si su médico le ha dicho que no tolera ciertos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Priligy contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por tableta, es decir, esencialmente 'libre de sodio'.

3. ¿Cómo usar este medicamento?

Use este medicamento siempre exactamente como su médico o farmacéutico le ha indicado. ¿Tiene dudas sobre el uso correcto? Entonces, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es de 30 mg. Su médico puede aumentar la dosis a 60 mg.

Tome el medicamento solo de 1 a 3 horas antes de esperar actividad sexual.

No tome este medicamento más de una vez cada 24 horas o todos los días.

Trague las tabletas enteras (de lo contrario, saben amargas) con al menos un vaso lleno de agua. Esto reduce el riesgo de desmayarse (ver 'Desmayos y presión arterial baja' en la sección 4).

Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos.

Este medicamento no debe ser utilizado por hombres menores de 18 años o hombres de 65 años o más.

Discuta su tratamiento con Priligy con su médico después de las primeras 4 semanas o después de 6 dosis, para ver si debe continuar con el tratamiento. Si continúa con el tratamiento, debe ver a su médico al menos cada 6 meses para discutirlo.

¿Ha tomado demasiado de este medicamento?

Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si ha tomado más tabletas de las que debería. Puede sentirse mareado o tener que vomitar.

Si deja de usar este medicamento

Póngase en contacto con su médico antes de dejar de tomar este medicamento. Puede tener problemas para dormir o sentirse mareado después de dejar de tomar este medicamento, incluso si no lo usaba todos los días.

¿Tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento? Entonces, póngase en contacto con su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos secundarios. No todos los experimentan.

Deje de tomar Priligy inmediatamente en los siguientes casos y póngase en contacto con su médico de inmediato:

- tiene convulsiones (ataques epilépticos)
- se desmaya o se siente mareado al ponerse de pie
- nota cambios en su estado de ánimo
- piensa en suicidarse o hacerse daño

Si nota alguno de los síntomas anteriores, deje de usar este medicamento y póngase en contacto con su médico de inmediato.

Desmayos y presión arterial baja

Este medicamento puede hacer que se desmaye o que su presión arterial baje al ponerse de pie. Con las siguientes medidas puede reducir la probabilidad de que esto ocurra:

- tome este medicamento con al menos un vaso lleno de agua
- no use este medicamento si está deshidratado (si no tiene suficiente agua en su cuerpo)

Esto puede ser el caso

- si no ha bebido nada en las últimas 4 a 6 horas
- si ha sudado mucho tiempo
- si está enfermo, con fiebre, diarrea o vómitos

si siente que va a desmayarse (por ejemplo, si se siente mareado o aturdido, se siente ligero de cabeza o confundido, está sudoroso o tiene un ritmo cardíaco anormal), o si se siente ligero de cabeza al ponerse de pie, acuéstese de inmediato (de modo que su cabeza esté más baja que el resto de su cuerpo), o siéntese con la cabeza entre las rodillas hasta que se sienta mejor. Esto evitará que se caiga y se lastime si se desmaya.

no se levante rápidamente si ha estado sentado o acostado durante mucho tiempo

no conduzca vehículos ni use máquinas o herramientas si se siente ligero de cabeza al usar este medicamento

póngase en contacto con su médico si se desmaya mientras usa este medicamento

Efectos secundarios que ocurren muy frecuentemente (pueden ocurrir en más de 1 de cada 10 hombres):

- mareos
- dolor de cabeza
- náuseas

Efectos secundarios que ocurren frecuentemente (pueden ocurrir hasta en 1 de cada 10 hombres):

irritabilidad, ansiedad, excitación o inquietud

entumecimiento o sensación de hormigueo
dificultad para conseguir o mantener una erección
transpirar más de lo normal o sonrojarse
diarrea, estreñimiento o flatulencia
dolor de estómago, sensación de hinchazón o vómitos
problemas para dormir o sueños extraños
sentirse fatigado o somnoliento, bostezar
nariz congestionada (congestión nasal)
aumento de la presión arterial
dificultad para concentrarse
temblores o sacudidas
menos deseo sexual
tinnitus
visión borrosa
problemas digestivos
boca seca

Efectos secundarios que ocurren a veces (pueden ocurrir en hasta 1 de cada 100 hombres):

desmayos o mareos al ponerse de pie (ver el consejo arriba)
cambios de humor, sensación de excitación excesiva o pensamientos paranoicos
sentirse confundido o desorientado o no poder pensar con claridad
latidos del corazón lentos o irregulares o latidos más rápidos
falta de deseo sexual, dificultad para alcanzar el orgasmo
una sensación de debilidad, somnolencia, apatía o cansancio
una sensación de depresión, nerviosismo o indiferencia
una sensación de calor, nerviosismo, anormalidad o embriaguez
dificultad para ver, dolor ocular o pupilas dilatadas
presión arterial baja o alta
sensación de picazón o sudoración pegajosa
sensación de mareo
sabor extraño
rechinar de dientes

Efectos secundarios que rara vez ocurren (pueden ocurrir en hasta 1 de cada 1,000 hombres):

mareos después del esfuerzo
quedarse dormido repentinamente
evacuación urgente

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta efectos secundarios, comuníquese con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto también se aplica a los efectos secundarios que no se mencionan en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del Centro de Efectos Secundarios de los Países Bajos Lareb, Sitio web: www.lareb.nl. Al informar los efectos secundarios, nos ayuda a obtener más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. ¿Cómo debe almacenar este medicamento?

Para este medicamento no hay condiciones especiales de almacenamiento.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No use este medicamento después de la fecha de caducidad. Esta se encuentra en el envase después de EXP. Se indica un mes y un año. El último día de ese mes es la fecha de caducidad.

No tire los medicamentos por el desagüe ni los deseche en la basura. Pregunte a su farmacéutico qué hacer con los medicamentos que ya no usa. Si elimina los medicamentos de manera adecuada, se destruyen correctamente y no llegan al medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional ¿Qué sustancias contiene este medicamento?

La sustancia activa de este medicamento es dapoxetina. Cada tableta contiene 30 mg o 60 mg de dapoxetina como sal de hidrocloreto.

Los otros componentes de este medicamento son:

núcleo de la tableta: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio

recubrimiento de la tableta: lactosa monohidrato, hipromelosa, dióxido de titanio (E171), triacetina, óxido de hierro negro (E172), óxido de hierro amarillo (E172).

¿Cómo se presenta Priligy y cuántas unidades contiene un envase?

Priligy 30 mg tabletas recubiertas con película son de color gris claro, redondas, convexas, con un diámetro de aproximadamente 6,5 mm y en un lado tienen '30' en un triángulo.

Priligy 60 mg tabletas recubiertas con película son de color gris, redondas, convexas, con un diámetro de aproximadamente 8 mm y en un lado tienen '60' en un triángulo.

Las tabletas se suministran en envases blíster con 1, 2, 3 y 6 tabletas recubiertas con película.

Puede que no todos los tamaños de envase se comercialicen.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante Titular de la autorización de comercialización

Phoenix Labs Unlimited Company,
Suite 12, Bunkilla Plaza,
Bracetown Business Park,
Clonee, Co. Meath,
Irlanda

Fabricante

Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Alemania

Números de registro

Priligy 30 mg: RVG 108199

Priligy 60 mg: RVG 108200

Este medicamento está registrado en los estados miembros del EEE bajo los siguientes nombres: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,

Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Chequia, Reino Unido (Irlanda del Norte), Suecia: Priligy

Este prospecto fue aprobado por última vez en abril de 2025.

Transtoyou