

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Priligy 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Priligy 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid
dapoksetiin

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil on palju vaeva ühe kõrvaltoimega, mis on loetletud jaotises 4? Või kas teil esineb kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Priligy ja milleks seda ravimit kasutatakse?
 2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
 3. Kuidas seda ravimit kasutada?
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas seda ravimit säilitada?
 6. Pakendi sisu ja muu teave
-
1. Mis on Priligy ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Priligy sisaldab toimeainet nimega dapoksetiin. See aine kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 'selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid' (SSRI-d). Priligy võib olla tuntud ka kui uroloogiline ravim.

Priligy pikendab aega, mis kulub seemnepurskeni, ja võib parandada seemnepurske kontrolli. See võib vähendada frustratsiooni või muret kiire seemnepurske pärast.

Priligy't kasutatakse enneaegse seemnepurske (ejakulatsiooni) raviks täiskasvanud meestel vanuses 18 kuni 64 aastat.

Enneaegne ejakulatsioon tähendab, et mehel toimub seemnepurse vähese seksuaalse stimulatsiooni korral ja enne, kui ta seda soovib. See võib mehele raskusi valmistada ja põhjustada probleeme seksuaalsuhetes.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline dapoksetiini või mõne muu selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiab selle pakendi infolehe jaotisest 6.

Teil on südameprobleemid, nagu südamepuudulikkus või südame rütmihäired.

Te olete varem minestanud.

Teil on kunagi olnud maania (sümptomiteks on muu hulgas liigne erutus, ärrituvus või suutmatus selgelt mõelda) või raske depressioon.

Te kasutate:

- depressioonivastaseid ravimeid, mis kuuluvad 'monoamiini oksüdaasi inhibiitorite' (MAO-inhibiitorid) rühma
- tioridasiini skisofreenia raviks
- teisi antidepressante
- liitiumi ravimit, mida kasutatakse bipolaarse häire korral
- linesoliidi antibiootikumi infektsioonide raviks
- trüptofaani ravimit, mis aitab paremini magada
- naistepuna taimset ravimit
- tramadooli raske valu raviks
- ravimid migreeni raviks

Ärge võtke Priligyt samaaegselt ühegi ülalnimetatud ravimiga. Kui olete kasutanud mõnda neist ravimitest, peate pärast lõpetamist ootama 14 päeva, enne kui saate alustada Priligyga. Pärast Priligy lõpetamist peate ootama 7 päeva, enne kui tohib kasutada mõnda ülalnimetatud ravimit. Kui te pole kindel, mida teha, küsige oma arstilt või apteekrilt enne selle ravimi võtmist (vt lõik Kas te kasutate veel teisi ravimeid?).

- teatud ravimid seeninfektsioonide raviks, sealhulgas ketokonasool ja itrakonasool (vt lõik Kas te kasutate veel teisi ravimeid?)
- teatud ravimid HIV raviks, sealhulgas ritonaviir, sakvinaaviir, nelfinaviir ja atasanaviir (vt lõik Kas te kasutate veel teisi ravimeid?)
- teatud antibiootikumid infektsioonide raviks, sealhulgas telitromütsiin (vt lõik Kas te kasutate veel teisi ravimeid?)
- nefazodoon antidepressant (vt lõik Kas te kasutate veel teisi ravimeid?)
- Teil on mõõdukad või rasked maksaprobleemid

Ärge kasutage seda ravimit, kui mõni ülaltoodud olukord kehtib teie kohta. Kui kahtlete, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga.

Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne Priligy võtmist järgmistel juhtudel:

- teie arst ei ole kindlaks teinud, et teil on enneaegne seemnepurse
- teil on ka mõni muu seksuaalne probleem, nagu erektsioonihäire
- teil on varem esinenud pearinglust madala vererõhu tõttu
- te kasutate (peo)ravimeid nagu ecstasy, LSD, narkootikumid või bensodiasepiinid
- te tarbite alkoholi (vt lõik Millele peate tähelepanu pöörama toidu, joogi ja alkoholiga?)
- teil on kunagi olnud vaimne häire, nagu depressioon, maania (kus olete ülemäära erutunud või ärrituv või ei suuda selgelt mõelda), bipolaarne häire (sümptomiteks on tõsised meeleolukõikumised maania ja depressiooni vahel) või skisofreenia (psühhiaatiline häire)
- teil on epilepsia
- teil on varem esinenud verejookse või verehüübimisprobleeme
- teil on neeruprobleemid

teil on kõrge silmarõhk (glaukoom) või teil on selleks risk

Kui mõni ülalloodud olukord kehtib teie kohta (või kui te kahtlete), võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arsti või apteekriga.

Enne selle ravimi kasutamist peab teie arst kontrollima, kas teie vererõhk ei lange liiga palju, kui tõusete lamavast asendist püsti.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel või noorukitel.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Priligyle veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või kavatsete seda peagi teha? Rääkige sellest oma arsti või apteekriga. See kehtib ka ravimite kohta, mille jaoks te ei vaja retsepti, näiteks taimsete ravimite kohta. See on oluline, sest Priligy võib mõjutada teatud ravimite toimet. Samuti võivad teised ravimid mõjutada Priligy toimet. Seetõttu võib teiste ravimite kasutamine mõjutada maksimaalset Priligy annust, mida te tohib võtta.

Ärge võtke Priligyt samaaegselt järgmiste ravimitega:

depressiooniravimid, mis kuuluvad 'monoamiini oksüdaasi inhibiitorite' (MAO inhibiitorite) rühma
tioridasiin skisofreenia raviks
teised antidepressandid
liitium ravim, mida kasutatakse bipolaarse häire korral
linesoliid antibiootikum infektsioonide raviks
trüptofaan ravim, mis aitab teil paremini magada
naistepuna taimne ravim
tramadool raske valu raviks
ravimid migreeni raviks

Ärge võtke Priligyt samaaegselt ühegi ülalnimetatud ravimiga. Kui olete kasutanud mõnda neist ravimitest, peate pärast nende kasutamise lõpetamist ootama 14 päeva, enne kui saate alustada Priligy kasutamist. Pärast Priligy kasutamise lõpetamist peate ootama 7 päeva, enne kui võite kasutada mõnda ülalnimetatud ravimit. Kui te pole kindel, mida teha, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

teatud ravimid seeninfektsioonide raviks, sealhulgas ketokonasool ja itrakonasool
teatud ravimid HIV raviks, sealhulgas ritonaviir, sakvinaaviir, nelfinaviir ja atasanaviir
teatud antibiootikumid infektsioonide raviks, sealhulgas telitromütsiin
nefazodoon antidepressant

Konsulteerige oma arsti või apteekriga, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

ravimid psüühikahäirete raviks, välja arvatud depressioon
mittesteroidsed põletikuvastased ravimid nagu ibuprofeen või atsetüülsalitsüülhappe
ravimid, mis vedeldavad teie verd, nagu varfariin

teatud ravimid erektsioonihäirete raviks, nagu sildenafil, tadalafil või vardenafil, kuna need ravimid võivad teie vererõhku alandada, kui te püsti tõusete
teatud ravimid kõrge vererõhu ja rindkerevalu (stenokardia) raviks (näiteks verapamiil ja diltiaseem) või suurenenud eesnäärme raviks, kuna need ravimid võivad samuti teie vererõhku alandada, kui te püsti tõusete
teatud muud ravimid seeninfektsioonide raviks, nagu flukonasool
teatud muud ravimid HIV raviks, nagu amprenaviir ja fosamprenaviir
teatud muud antibiootikumid infektsioonide raviks, nagu erütromütsiin ja klaritromütsiin
aprepitant kasutatakse iivelduse vastu

Kui te pole kindel, kas eelnev kehtib teie kohta, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Millele peaksite tähelepanu pöörama toidu, joogi ja alkoholiga?

Ärge jooge greibimahla 24 tunni jooksul enne selle ravimi kasutamist, kuna see võib suurendada ravimi taset teie kehas.

Võite seda ravimit võtta koos toiduga või ilma.

Te peate seda ravimit võtma vähemalt ühe täis klaasi veega.

Vältige alkoholi, kui kasutate seda ravimit.

Alkoholi mõju, nagu pearinglus, unisus ja aeglane reageerimine, võivad tugevneda, kui kasutate seda ravimit.

Kui te tarvitate alkoholi selle ravimi kasutamise ajal, suureneb tõenäosus, et te vigastate end minestamise või muude kõrvaltoimete tõttu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Naised ei tohi seda ravimit kasutada.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

Kui kasutate seda ravimit, võite tunda unisust, pearinglust või kergelt peapööritust, teil võib olla raskusi keskendumisega ja nägemine võib olla udune. Kui teil esinevad need või sarnased mõjud, ärge juhtige sõidukit ega kasutage ohtlikke masinaid. Alkoholi mõju võib olla tugevam, kui seda kasutatakse samaaegselt selle ravimiga, ja vigastuste oht minestamise või muude kõrvaltoimete tõttu võib suurenedada, kui kasutate seda ravimit ja alkoholi samaaegselt.

Priligy sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

Priligy sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, st see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst või apteeker on teile öelnud. Kas teil on kahtlusi õige kasutamise osas? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on 30 mg. Teie arst võib annust suurendada kuni 60 mg.

Võtke ravimit ainult 1 kuni 3 tundi enne seksuaalset tegevust.

Ärge võtke seda ravimit sagedamini kui üks kord 24 tunni jooksul või iga päev.

Neelake tabletid tervelt alla (muidu maitsevad need kibedalt) vähemalt ühe täis klaasi veega. See vähendab minestamise ohtu (vt 'Minestamine ja madal vererõhk' jaotises 4).

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 18-aastased mehed või 65-aastased ja vanemad mehed.

Arutage oma Priligy-ravi oma arstiga pärast esimest 4 nädalat või pärast 6 annust, et

otsustada, kas ravi jätkata. Kui jätkate ravi, peate oma arstiga vähemalt iga 6 kuu tagant uuesti nõu pidama.

Kas olete võtnud liiga palju seda ravimit?

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga, kui olete võtnud rohkem tablette, kui tohib. Teil võib tekkida iiveldus või oksendamine.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Võtke ühendust oma arstiga enne, kui lõpetate selle ravimi kasutamise. Teil võivad tekkida unehäired või pearinglus pärast ravimi kasutamise lõpetamist, isegi kui te ei kasutanud seda iga päev.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Mitte kõigil ei pruugi need tekkida.

Lõpetage Priligy võtmine kohe ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga järgmistel juhtudel:

teil tekivad krambid (epileptilised hood)

te minestate või tunnete pearinglust, kui püsti tõusete

te märkate muutusi oma meeleolus

te mõtlete enesetapule või enesevigastamisele

Kui märkate endal mõnda ülaltoodud sümptomit, lõpetage selle ravimi kasutamine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Minestamine ja madal vererõhk

See ravim võib põhjustada minestamist või vererõhu langust, kui te püsti tõusete. Järgmiste meetmetega saate seda riski vähendada:

- võtke seda ravimit vähemalt ühe täis klaasi veega

● ärge kasutage seda ravimit, kui olete dehüdreeritud (kui teie kehas pole piisavalt vett). See võib juhtuda

- kui te pole viimase 4 kuni 6 tunni jooksul midagi joonud
- kui olete pikalt higistanud
- kui olete haige, palaviku, kõhulahtisuse või oksendamisega

kui tunnete, et hakkate minestama (näiteks kui tunnete iiveldust või pearinglust, tunnete end kergelt või segaduses, olete higine või teil on ebanormaalne südametegevus), või kui tunnete end kergelt, kui püsti tõusete, heitke kohe pikali (nii et teie pea on madalamal kui ülejäänud keha), või istuge pea põlvede vahel, kuni tunnete end paremini. See hoiab ära kukkumise ja vigastuste tekkimise minestamise korral.

ärge tõuske kiiresti püsti, kui olete pikka aega istunud või lamanud

ärge juhtige sõidukit ega kasutage masinaid või tööriistu, kui tunnete end selle ravimi kasutamisel kergelt

võtke ühendust oma arstiga, kui minestate selle ravimi kasutamise ajal

Kõrvaltoimed, mis esinevad väga sageli (võivad esineda rohkem kui 1-l mehel 10-st):

pearinglus
peavalu
iiveldus

Kõrvaltoimed, mis esinevad sageli (võivad esineda kuni 1-l mehel 10-st):

ärrituvus, ärevus, erutus või rahutus
tuimus või kipitustunne
raskused erektsiooni saavutamisel või säilitamisel
rohkem higistamine kui tavaliselt või punastamine
kõhulahtisus, kõhukinnisus või gaasid
kõhuvalu, puhitustunne või oksendamine
unenprobleemid või kummalised unenäod
väsimustunne või unisus, haigutamine
ummistunud nina (ninakinnisus)
vererõhu tõus
raskused keskendumisel
värisemine või tõmblemine
vähenenud seksuaalsoov
kõrvahelin
hägune nägemine
seedeprobleemid
kuiv suu

Kõrvaltoimed, mis esinevad mõnikord (võivad esineda kuni 1-l mehel 100-st):

minestamine või pearinglus püsti tõustes (vt ülaltoodud nõuannet)
meeleolu muutus, liigne erutus või paranoilised mõtted
segaduse või desorientatsiooni tunne või raskused selgelt mõtlemisel
aeglane või ebaregulaarne südametegevus või kiirem südametegevus
puudub seksuaalsoov, raskused orgasmi saavutamisel

nõrk, unine, loid või väsinud tunne
masendunud, närviline või ükskõikne tunne
kuum, närviline, ebanormaalne või purjus tunne
nägemisraskused, silmavalu või laienenud pupillid
madal või kõrge vererõhk
sügelustunne või niiske higi
pearinglus
kummaline maitse
hammaste krigistamine

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1-l mehel 1000-st):

pearinglus pärast pingutust
äkiline uinumine
kiire roojamine

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi Kõrvaltoimete Keskusele Lareb, veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatamine aitab teil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Selle ravimi jaoks ei ole eritingimusi säilitamiseks.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pakendile pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja viimane päev.
Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega visake neid prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need õigesti ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on dapoksetiin. Iga tablett sisaldab 30 mg või 60 mg dapoksetiini vesinikkloriidi soolana.

Muud ained selles ravimis on:

tableti südamik: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat
tableti kate: laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, titaandioksiid (E171), triatsetiin, must raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Priligy välja näeb ja kui palju on pakendis?

Priligy 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helehallid, ümmargused, kumerad, läbimõõduga umbes 6,5 mm ja ühel küljel on kolmnurgas '30'.

Priligy 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid on hallid, ümmargused, kumerad, läbimõõduga umbes 8 mm ja ühel küljel on kolmnurgas '60'.

Tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 1, 2, 3 ja 6 õhukese polümeerikattega tabletti. Võib juhtuda, et kõiki pakendi suurusi ei turustata.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Phoenix Labs Unlimited Company,

Suite 12, Bunkilla Plaza,

Bracetown Business Park,

Clonee, Co. Meath,

Iirimaa

Tootja

Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Saksamaa

Registreerimisnumbrid

Priligy 30 mg: RVG 108199

Priligy 60 mg: RVG 108200

See ravim on registreeritud EMP liikmesriikides järgmiste nimede all: Belgia, Bulgaaria, Küpros, Saksamaa, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Rootsi: Priligy

Seda pakendi infolehte uuendati viimati aprillis 2025.