

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ozempic 2 mg süstelahus eeltäidetud süstlas
semaglutiid

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Ozempic ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Ozempicu toimeaine on semaglutiid. See aitab teie kehal vähendada veresuhkru taset ainult siis, kui veresuhkur on liiga kõrge, ja see võib aidata ennetada südamehaigusi 2. tüüpi diabeediga patsientidel. Samuti võib see aidata aeglustada neerufunktsiooni halvenemist 2. tüüpi diabeediga patsientidel viisil, mis ületab ainult veresuhkru taseme alandamise.

Ozempicut kasutatakse täiskasvanute (alates 18. eluaastast) 2. tüüpi diabeedi raviks, kui dieet ja liikumine ei ole piisavad:

ainuravina – kui te ei tohi kasutada metformiini (teine diabeediravim) või koos teiste diabeediravimitega – kui need ei ole piisavad teie veresuhkru taseme reguleerimiseks. Need võivad olla ravimid, mida te võtate suu kaudu (oraalselt) või süstite, nagu insuliin.

On oluline, et jätkaksite oma dieedi ja kehalise tegevusega nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile öelnud.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega enne selle ravimi kasutamist.

See ravim ei ole sama mis insuliin ja te ei tohi seda kasutada, kui:

teil on 1. tüüpi diabeet – seisund, kus teie keha ei tooda insuliini
teil on tekkinud diabeetiline ketoatsidoos – diabeedi tüsistus, mille korral on kõrge veresuhkur, hingamisraskused, segasus, liigne janu, magus lõhn hingeõhus või magus või metalliline maitse suus.

Ozempic ei ole insuliin ja seetõttu ei tohi seda kasutada insuliini asendajana.

Kui te teate, et peate läbima operatsiooni, mille käigus teid hoitakse narkoosis (unes), rääkige oma arstile, et kasutate Ozempic'ut.

Mõjud seedesüsteemile

Selle ravimiga ravi ajal võib teil esineda iiveldust, oksendamist või kõhulahtisust. Need kõrvaltoimed võivad põhjustada dehüdratsiooni (vedelikukaotust). On oluline, et te joote palju, et vältida dehüdratsiooni. See on eriti oluline, kui teil on neeruprobleeme. Võtke ühendust oma arstiga, kui teil on küsimusi või muresid.

Tõsine ja püsiv kõhuvalu, mis võib olla ägeda pankreatiidi tagajärg

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil on tõsine ja püsiv valu kõhupiirkonnas. See võib viidata ägedale pankreatiidile (põletikuline kõhunäär). Vaadake jaotist 4, et saada teavet põletikulise kõhunäärme hoiatavate sümptomite kohta.

Madal veresuhkur (hüpoglükeemia)

Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib see suurendada madala veresuhkru (hüpoglükeemia) riski. Vaadake jaotist 4, et saada teavet madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Teie arst võib paluda teil kontrollida oma veresuhkru taset. See aitab teie arstil otsustada, kas sulfonüüluurea derivaatide või insuliini annust tuleb kohandada, et vähendada madala veresuhkru riski.

Diabeetiline silmahaigus (retinopaatia)

Kui teil on diabeedi tõttu silmahaigus ja te kasutate insuliini, võib see ravim põhjustada teie nägemise halvenemist, mis võib vajada ravi. Teavitage oma arsti, kui teil on diabeetiline silmahaigus või kui teil tekivad selle ravimiga ravi ajal silmaprobleemid. Kui teil on võimalik ebastabiilne diabeetiline silmahaigus, ei ole soovitatav kasutada Ozempic 2 mg.

Äkilised muutused teie nägemises

Kui te ravi ajal selle ravimiga äkki ei näe midagi või nägemine halveneb kiiresti, võtke kohe ühendust oma arstiga nõu saamiseks. Selle põhjuseks võib olla väga haruldane kõrvaltoime, mida nimetatakse mittearteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optilise neuropaatia (NAION) (vt lõik 4: Tõsised kõrvaltoimed). Teie arst võib suunata teid silmauringule ja võib-olla peate lõpetama ravi selle ravimiga.

Lapsed ja noorukid kuni 18 aastat

Seda ravimit ei soovitata alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, kuna selle vanuserühma ohutus ja efektiivsus ei ole veel kindlaks tehtud.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Ozempic'ule veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et hakkate varsti teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arsti või apteekriga. See kehtib ka taimsete ravimite või teiste retseptita ostetud ravimite kohta.

Rääkige oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele eriti siis, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad ühte järgmistest toimeainetest:

Varfariin või muud sarnased suu kaudu manustatavad ravimid, mis takistavad vere hüübimist (suukaudsed antikoagulandid). Teie verd võib-olla tuleb sagedamini testida, et kontrollida, kui kiiresti teie veri hüübib.

Või kui te kasutate insuliini. Teie arst ütleb teile, kuidas insuliini annust vähendada ja soovib teil sagedamini kontrollida oma veresuhkrut, et vältida hüperglükeemiat (kõrge veresuhkur) ja diabeetilist ketoatsidoosi (diabeedi tüsistus, mis tekib, kui keha ei suuda glükoosi lagundada, kuna insuliini on ebapiisavalt).

Rasedus ja imetamine

Kas olete rase, arvate, et võite olla rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke siis enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Seda ravimit ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna ei ole teada, kas see on kahjulik sündimata lapsele. Seetõttu on soovitatav kasutada rasestumisvastaseid vahendeid selle ravimi kasutamise ajal. Kui soovite rasestuda, arutage oma arstiga, kuidas ravi kohandada, kuna peate selle ravimi kasutamise lõpetama vähemalt 2 kuud ette. Kui rasestute selle ravimi kasutamise ajal, võtke kohe ühendust oma arstiga, sest teie ravi tuleb muuta.

Ärge kasutage seda ravimit, kui toidate last rinnaga, kuna ei ole teada, kas see jõuab rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinate kasutamine

On ebatõenäoline, et Ozempic mõjutab teie autojuhtimisvõimet ja masinate käsitlemise võimet. Kui kasutate seda ravimit koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliiniga, võib teil tekkida madal veresuhkur (hüpoglükeemia), mis võib vähendada teie keskendumisvõimet. Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui teil esinevad madala veresuhkru sümptomid. Vaadake lõik 2 'Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?' teabe saamiseks suurenenud madala veresuhkru riski kohta ja lõik 4 madala veresuhkru hoiatavate sümptomite kohta. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma arstiga.

Ozempic sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu teie arst on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju seda ravimit ma pean kasutama?

Algannus on 0,25 mg üks kord nädalas, nelja nädala jooksul.

Pärast nelja nädalat suurendab teie arst annust 0,5 mg-ni üks kord nädalas.

Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 0,5 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 1 mg-ni üks kord nädalas.

Kui teie veresuhkru tase ei ole piisavalt kontrolli all annusega 1 mg üks kord nädalas, võib teie arst soovitada annust suurendada 2 mg-ni üks kord nädalas.

Ärge muutke oma annust, kui arst pole seda öelnud.

Kuidas seda ravimit manustatakse?

Ozempic manustatakse nahaaluse süstina (subkutaanne süst). Ärge süstige seda veeni ega lihasesse.

Parimad kohad süstimiseks on reie esikülg, kõhu esikülg või õlavars.

Enne pliatsi esmakordset kasutamist näitab arst või õde teile, kuidas pliatsit kasutada. Üksikasjalikud kasutusjuhised leiate selle infolehe tagaküljelt.

Millal seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit üks kord nädalas, võimalusel iga nädal samal päeval.

Võite end süstida igal ajal päeval – sõltumata söögikordadest.

Et aidata teil meeles pidada, et süstite seda ravimit ainult üks kord nädalas, on soovitatav märkida valitud nädalapäev (näiteks kolmapäev) karbile ja kirjutada kuupäev karbile iga kord, kui olete ravimit süstinud.

Vajadusel võite muuta oma iganädalase süsti päeva, kui see on vähemalt 3 päeva pärast viimast süsti. Pärast uue annustamispäeva valimist tuleb annustamist jätkata üks kord nädalas.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui olete kasutanud rohkem Ozempic'it kui peaks. Teil võivad tekkida kõrvaltoimed, nagu iiveldus.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?

Kui unustate annust süstida ja:

kui Ozempici oleks pidanud kasutama 5 päeva või vähem aega tagasi, kasutage seda niipea, kui meelde tuleb. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

kui Ozempici oleks pidanud kasutama rohkem kui 5 päeva tagasi, jätke vahele jäänud annus vahele. Seejärel süstige oma järgmine annus tavapärasel planeeritud päeval.

Ärge kasutage kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist ilma arstiga konsulteerimata. Kui lõpetate kasutamise, võib teie veresuhkru tase tõusta.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Sageli (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10-st)

diabeetilise silmahaiguse tüsistused (retinopaatia) – rääkige oma arstile, kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal silmaprobleemid, nagu nägemise muutused.

Mõnikord (esinevad vähem kui 1-l inimesel 100-st)

kõhunäärme põletik (äge pankreatiit), mis võib põhjustada tugevat püsivat valu kõhus ja seljas. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 1 000-st)

tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, angioödeem). Otsige kohe meditsiinilist abi ja teavitage oma arsti nii kiiresti kui võimalik, kui teil tekivad sümptomid nagu hingamisraskused, näo, huulte, keele ja/või kurgu turse, neelamisraskused ja kiire südametegevus.

Väga harva (esinevad vähem kui 1-l inimesel 10 000-st)

silmahaigus, mida nimetatakse mittearteriitiliseks eesmiseks isheemiliseks optilise neuropaatia (NAION), mis võib põhjustada, et te ei näe ühe silmaga enam midagi või näete vähem ilma valuta. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui märkate, et te ei näe äkki midagi või näete aeglaselt halvemini (vt lõik 2: 'Äkilised muutused teie nägemises').

Pole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

Soole ummistus. Tõsine ummistuse vorm, millega kaasnevad sümptomid nagu kõhuvalu, puhitus, oksendamine jne.

Muud kõrvaltoimed

Väga sageli (esineb rohkem kui 1-l 10-st kasutajast)

iiveldus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast

kõhulahtisus – see kaob tavaliselt mõne aja pärast

madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos sulfonüüluurea derivaatide või insuliini sisaldavate ravimitega

Sageli (esineb vähem kui 1-l 10-st kasutajast)

oksendamine

madal veresuhkur (hüpoglükeemia), kui seda ravimit kasutatakse koos teiste suukaudsete diabeediravimitega peale sulfonüüluurea derivaatide või insuliini

Madala veresuhkru hoiatavad sümptomid võivad tekkida äkki. Need võivad olla: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, kiire südametegevus, iiveldus või tugev näljatunne, nägemise muutused, unisuse või nõrkuse tunne, närvilisus, ärevus või segadus, keskendumisraskused või värisemine.

Teie arst ütleb teile, kuidas madalat veresuhkrut ravida ja mida teha, kui teil need hoiatavad sümptomid tekivad.

Madal veresuhkur tekib tõenäolisemalt, kui kasutate ka sulfonüüluurea derivaate või insuliini.

Teie arst võib nende ravimite annust vähendada enne, kui alustate selle ravimi kasutamist.

seedehäired (düspepsia)
maopõletik (gastriit) – sümptomiteks on muu hulgas kõhuvalu, iiveldus või oksendamine
refluks või kõrvetised – tuntud ka kui gastroösofageaalne refluksahaigus (GERD)
kõhuvalu
kõhupuhitus
kõhukinnisus
rõhitsemine
sapikivid
pearinglus
väsimus
kaalulangus
vähenenud söögiisu
gaaside teke (kõhupuhitus)
kõhunäärmeensüümide tõusja (nagu lipaas ja amülaas)
peavalu.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l kasutajal 100-st)

toit või jook maitseb teisiti kui tavaliselt
kiire pulss
süstekoha reaktsioonid – nagu verevalumid, valu, ärritus, sügelus ja nahalööve
allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, sügelus või nõgestõbi
toit püsib kauem maos kui tavaliselt (aeglustunud mao tühjenemine).

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Võite kõrvaltoimetest teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi kaudu, nagu on märgitud lisas V. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pliiatsi etiketil ja karbil pärast EXP. Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis (2°C–8°C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida eemal külmaelemendist. Hoidke pliiatsikork pliiatsil, et kaitsta seda valguse eest.

Pärast kasutamist:

Kui hoiate pliiatsit alla 30°C või külmkapis (2°C–8°C) (mitte külmaelemendi lähedal), võite seda säilitada 6 nädalat. Ozempicut ei tohi hoida sügavkülmas. Kui ravim on külmunud, ei tohi seda enam kasutada.

Hoidke pliiatsit, kui te seda ei kasuta, koos pliiatsikorgiga, et kaitsta seda valguse eest.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus ei ole selge ja värvitu või peaaegu värvitu.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need vastutustundlikult ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on semaglutiid. Üks ml süstelahust sisaldab 2,68 mg semaglutiidi.

Üks eeltäidetud pliats sisaldab 8 mg semaglutiidi 3 ml lahuses. Iga annus sisaldab 2 mg semaglutiidi 0,74 ml-s.

Selle ravimi muud ained on: dinaatriumfosfaatdihüdraat, propüleenglükool, fenool, süstevesi, soolhape/naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks). Vaadake ka jaotist 2, 'Ozempic sisaldab naatriumi'.

Kuidas Ozempic välja näeb ja kui palju on pakendis?

Ozempic on selge ja värvitu või peaaegu värvitu süstelahus eeltäidetud pliatsis.

Iga eeltäidetud pliats sisaldab 3 ml lahust, mis on ette nähtud 4 annuseks 2 mg.

Ozempic 2 mg süstelahus on saadaval järgmistes pakendisuurustes:

1 pliats ja 4 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela.

3 pliatsit ja 12 NovoFine Plus ühekordselt kasutatavat nõela.

Kõiki nimetatud pakendisuurusi ei turustata.

Müügiloo hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Taani

Seda pakendi infolehte uuendati viimati

Muud teabeallikad

Lisateavet selle ravimi kohta leiate Euroopa Ravimiameti veebisaidilt:

<http://www.ema.europa.eu>.

Kasutusjuhised

Ozempic 2 mg lahus süstimiseks eeltäidetud süstlas
semaglutiid

Ozempic 2 mg lahuse kasutusjuhised süstimiseks eeltäidetud süstlas

Lugege neid juhiseid hoolikalt enne, kui kasutate oma Ozempic eeltäidetud süstalt. Arutage oma arsti, õe või apteekriga, kuidas Ozempic'it õigesti süstida. Alustage oma süstla kontrollimisest, et veenduda, et see sisaldab Ozempic 2 mg. Seejärel vaadake allolevaid pilte, et tutvuda oma süstla ja nõela erinevate osadega. Kui olete pime või vaegnägija ja ei saa süstla annuse akent lugeda, ärge kasutage seda süstalt ilma abita. Paluge abi inimeselt, kellel on hea nägemine ja kes teab, kuidas Ozempic eeltäidetud süstalt kasutada.

Teie süstal on eeltäidetud süstal pööratava annuse valikunupuga. Süstal sisaldab 8 mg semaglutiidi ja saate valida ainult 2 mg annuseid. Üks kasutamata süstal sisaldab neli 2 mg annust.

Kasutage karbi kaane siseküljel olevat tabelit, et jälgida, mitu süsti olete teinud ja millal olete süstid teinud.

Teie pliiats on mõeldud kasutamiseks 30G, 31G ja 32G ühekordselt kasutatavate nõeltega, mille maksimaalne pikkus on 8 mm. NovoFine Plus nõelad on pakendis kaasas.

Oluline teave

Pöörake nendele märkustele erilist tähelepanu, kuna need on olulised pliiatsi ohutuks kasutamiseks.

1. Pliiatsile uue nõela paigaldamine

Kontrollige oma pliiatsi nime ja värvilist etiketti, et olla kindel, et see on Ozempic 2olema, et see Ozempic 2 Eemaldage pliiatsi kork.
Eemaldage pliiatsi kork.

Kontrollige, kas pliiatsis olev lahus on selge ja värvitu. Vaadake läbi pliiatsi akna. Kui lahus tundub hägune või värviline, ei tohi te pliiatsit kasutada.

Võtke uus nõel.
Eemaldage paberkate.
Veenduge, et kinnitate nõela õigesti.

Suruge nõel otse pliiatsile.

Keerake see kinni.
Nõelal on nõelakork ja nõelakate. Te

peate mõlemad eemaldama. Kui te ei eemalda mõlemat, siis te lahust ei süsti. Eemaldage välimine nõelakork ja hoidke seda hilisemaks kasutamiseks. Teil on seda vaja pärast süstimist, et nõel pliatsilt ohutult eemaldada.

Eemaldage välimine nõelakate ja hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles. Teil on seda vaja pärast süstimist, et nõel ohutult pliatsi küljest eemaldada.

Eemaldage sisemine nõelakork ja visake see ära. Kui proovite seda tagasi panna, võite end kogemata nõelaga torgata.

Nõelaotsale võib ilmuda tilk lahust. See on normaalne, kuid peate siiski kontrollima voolu, kui kasutate uut pliatsit esimest korda. Vaadake sammu 2 'Kontrollige iga uue pliatsi voolu'.

Kinnitage uus nõel pliatsile alles siis, kui olete valmis süsti tegema.

Kasutage iga süsti jaoks alati uut nõela.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Ärge kunagi kasutage kõverat või kahjustatud nõela.

2. Kontrollige iga uue pliatsi voolu

Kui teie pliats on juba kasutusel, minge sammu 3 'Teie annuse seadistamine'. Kontrollige voolu ainult enne iga uue pliatsi esimest süsti.

Pöörake annuse seadistusnuppkontrolljoonele (** =) kohe pärast '0'. Kontrollige, et kontrolljoon oleks annuse näidikunoolega ühel joonel.

Hoidke pliatsit nõelaga ülespoole suunatuna.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all, kuni annuse lugemisaken on jälle '0'.

Number '0' peab olema annuse näidikunoolega ühel joonel. Nõelaotsale peaks nüüd ilmuma tilk lahust. nõelaotsale ilmuda.

Kontrollige alati, kas nõelaotsale ilmub tilk, enne kui kasutate uut pliatsit esimest korda. Nii olete kindel, et lahus voolab. Kui tilka ei ilmu, ei süsti te ravimit, isegi kui annuse lugemisaknas ilmub teine number. See võib viidata ummistunud või kahjustatud nõelale. Kui te ei kontrolli voolu enne iga uue pliatsi esimest süsti, ei pruugi te saada ettenähtud annust ja Ozempicu soovitud toime võib puududa.

3. Teie annuse seadistamine kui tilk ilmub, ärge süstige ravimit, isegi kui annuse aknas ilmub teine number. See võib viidata ummistunud või kahjustatud nõelale. Kui te ei kontrolli iga uue pliatsi esmakordse süstimise eel voolu, ei pruugi te saada ettenähtud annust ja Ozempicu soovitud toime võib puududa.

3. Teie annuse seadistamine

Keerakei annuse seadistusnuppu 2 mg seadistamiseks.

Jätkake keeramist, kuni annuse aknas peatub ja näitab 2 mg.

Ainult annuse aken ja annuse näidknäitavad, et 2 mg on seadistatud.

Saate seadistada ainult 2 mg annuse kohta. Kui teie pliiaatsis on vähem kui 2 mg, peatub annuse aken enne kui 1 kuvatakse.

Annuse seadistusnupp teeb teistsugust klõpsuheli, kui seda keeratakse edasi, tagasi või üle 2mg. Ärge loendage pliiaatsi klõpse. Enne selle ravimi süstimist kasutage alati annuse akent ja annuse näidikut, et

näha, et 2 mg on seadistatud. Ärge loendage pliiaatsi klõpse. Lubatud on ainult 2

mg annused. mg määratakse doseerimisnupu abil. 2 mg peab olema täpselt joondatud annuse näidikuga, et olla kindel, et saate õige annuse.

Lahuse jäägi nägemiseks kasutage annuse akent: keerake doseerimisnuppu, kuniannuse aken peatub.

Kui 2 kuvatakse, siis on teie pliiaatsis veel vähemalt 2 mg. Kui annuse aken peatub enne, kui see näitab 2mg, siis ei ole piisavalt lahust täisannuse jaoks 2r täieliku annuse jaoks 2 Kui teie pliiaatsis ei ole piisavalt lahust täisannuse jaoks, ärge kasutage pliiaatsit. Kasutage uut Ozempic pliiaatsit.

4. Teie annuse süstimine

Sisestage nõel oma nahka nii, nagu arst või õde teile näidanud on.

Veenduge, et näete annuse akent. Ärge katke seda sõrmedega. See võib süstimist katkestada.

Vajutage manustamisnuppu ja hoidke seda all.

Vaadake, kuidas annuse aken naaseb '0' juurde. Number '0' peab olema joondatud annuse näidikuga. Võite kuulda või tunda klõpsu.

Jätkake manustamisnupu vajutamist, hoides nõela oma nahas

Hoidke manustamisnuppu all, kui hoiate nõela oma nahas.

Lugege aeglaselt kuue sekundi jooksul, hoides manustamisnuppu all.

Kui nõel eemaldatakse nahast varem, võite näha, kuidas nõelast lahuse jugake välja tuleb. Sel juhul ei ole kogu annust süstitud.

Eemaldage nõel nahast. Seejärel võite manustamisnupu vabastada.

Kui süstekoht hakkab veritsema, vajutage sellele õrnalt.

Pärast süstimist võite näha nõelaotsas lahuse tilka. See on normaalne ega mõjuta teie annust.

Jälgige alati annuse akent, et teaksite, kui palju mg te süstite. Hoidke manustamisnuppu all, kuni annuseaken jõuab tagasi nulli.

Kuidas ära tundaummistunud või kahjustatud nõela

- Kui pärast manustamisnupu pidevat vajutamist ei jõua annuse aken nulli, olete võib-olla kasutanud ummistunud või kahjustatud nõela.
- Sel juhul ei ole te ravimit saanud, isegi kui annuse aknas olev number on muutunud võrreldes algselt määratud annusega. Kuidas toimida ummistunud

nõela korral Vahetage nõel vastavalt juhistele 5. sammus 'Pärast süstimist' ja korrake kõiki samme alates 1. sammust 'Pange oma pliiaatsile uus nõel'. Veenduge, et määrate vajaliku Vahetage nõel vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud 5. etapis 'Pärast süstimist', ja korrake kõiki samme alates 1. etapist 'Pange oma pliiaatsile uus nõel'. Veenduge, et te täidate täielikult dÄrge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

Ärge puudutage annuse akent süstimise ajal. See võib süstimist katkestada.

5. Pärast süstimist

Eemaldage pärast iga süsti alati nõel ja visake see ära, et hõlbustada süstimist ja vältida nõela ummistumist. Kui nõel on ummistunud, ei süstita ravimit.

Asetage välimine nõelakate tasasele pinnale ja juhtige nõel selle sisse, ilma et puudutaksite nõela või katet oma sõrmedega.

Kui nõel on kaetud, suruge välimine nõelakate ettevaatlikult täielikult nõelale. Keerake nõel lahti ja visake see hoolikalt ära vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Pange pliiaatsi kork pärast iga kasutamist tagasi, et kaitsta lahust valguse eest.

Kui pliiaats on tühi, visake see ära ilma nõelata vastavalt arsti, õe, apteekri või kohalike omavalitsuste juhistele.

Ärge kunagi proovige sisemist nõelakatet tagasi nõelale panna. Võite end nõelaga torgata. Võite end nõelaga torgata.

Eemaldage alati kohe nõel oma pliiaatsilt pärast iga süsti.

Nii saab vältida ummistunud nõelu, saastumist, infektsiooni, lahuse lekkimist ja ebatäpset doseerimist.

Muud olulised andmed

Hoidke oma pliiaats ja nõelad alati teiste, eriti laste, silma alt ja käeulatusest eemal.

Ärge kunagi jagage oma pliiaatsit või nõelu teiste inimestega.

Hooldajad peavad kasutatud nõelte käsitlemisel olema väga ettevaatlikud, et vältida torkeõnnetusi ja ristinfektsiooni.

Teie pliiaatsi hooldamine

Käsitsege oma pliiaatsit hoolikalt. Karm käsitlemine või ebaõige kasutamine võib põhjustada ebatäpse doseerimise. Sel juhul võib selle ravimi soovitud toime puududa.

Ärge jätke pliiaatsit autosse või muusse kohta, kus see võib olla liiga kuum või külm.

Ozempic, mis on külmunud olnud, ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib ravimi soovitud toime puududa. see ravim võib puududa.

Ozempic, mis on olnud otsese päikesevalguse käes, ei tohi süstida. Kui te seda teete, võib ravimi soovitud toime puududa. see ravim võib puududa.

Ärge jätke oma pliiaatsit olmu, mustuse või niiskuse kätte.

Ärge peske, kastke ega määrige oma pliiatsit. Pliiatsit võib puhastada niiske lapiga, millele on lisatud kerget pesuainet.

Ärge laske oma pliiatsil kukkuda ega kõvale pinnale lüüa. Kui pliiats kukub või kahtlustate probleemi, peate paigaldama uue nõela ja kontrollima vooluvenne süstimist.

Ärge proovige oma pliiatsit uuesti täita.

Ärge proovige oma pliiatsit parandada ega lahti võtta.

Transtoyou