

## Prospect: informații pentru pacient

### Ozempic 2 mg soluție injectabilă într-un stilou preumplut semaglutid

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.
- Aveți întrebări? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

### Conținutul acestui prospect

1. Ce este Ozempic și pentru ce se utilizează?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### 1. Ce este Ozempic și pentru ce se utilizează?

Substanța activă din Ozempic este semaglutid. Ajută organismul să reducă nivelul de zahăr din sânge, doar dacă zahărul din sânge este prea ridicat, și poate ajuta la prevenirea unei afecțiuni cardiace la pacienții cu diabet de tip 2. De asemenea, poate ajuta la încetinirea deteriorării funcției renale la pacienții cu diabet de tip 2 într-un mod care depășește simpla reducere a nivelului de zahăr din sânge.

Ozempic este utilizat pentru tratamentul adulților (de la 18 ani în sus) cu diabet de tip 2 atunci când dieta și exercițiile fizice nu sunt suficiente:

- ca tratament de sine stătător – când nu puteți utiliza metformină (un alt medicament pentru diabet) sau
- cu alte medicamente pentru diabet – dacă acestea nu sunt suficiente pentru a vă regla nivelurile de zahăr din sânge. Acestea pot fi medicamente pe care le luați pe cale orală sau le injectați, cum ar fi insulina.

Este important să continuați cu dieta și exercițiile fizice așa cum v-a fost indicat de medicul, farmacistul sau asistenta dumneavoastră.

#### 2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

##### Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la una dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Contactați medicul, farmacistul sau asistenta înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament nu este același cu insulina și nu trebuie să-l utilizați dacă:

aveți diabet de tip 1 – o afecțiune în care corpul dumneavoastră nu produce insulină  
ați dezvoltat cetoacidoză diabetică – o complicație a diabetului cu glicemie ridicată,  
dificultăți de respirație, confuzie, sete excesivă, respirație cu miros dulce sau un gust  
dulce sau metalic în gură.

Ozempic nu este insulină și, prin urmare, nu trebuie utilizat ca un înlocuitor al insulinei.

Dacă știți că urmează să suferiți o intervenție chirurgicală sub anestezie generală (somn), informați medicul că utilizați Ozempic.

Efecte asupra sistemului digestiv

În timpul tratamentului cu acest medicament, puteți avea greață, vărsături sau diaree. Aceste efecte secundare pot provoca deshidratare (pierderea de lichide). Este important să beți mult pentru a preveni deshidratarea. Acest lucru este deosebit de important dacă aveți probleme renale. Contactați medicul dacă aveți întrebări sau îngrijorări.

Durere abdominală severă și persistentă care poate fi rezultatul pancreatitei acute

Contactați imediat medicul dacă aveți dureri severe și persistente în zona abdominală. Acest lucru poate indica pancreatită acută (inflamația pancreasului). Consultați secțiunea 4 pentru semnele de avertizare ale unei inflamații pancreatice.

Glicemie scăzută (hipoglicemie)

Dacă utilizați acest medicament împreună cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, poate crește riscul de glicemie scăzută (hipoglicemie). Consultați secțiunea 4 pentru semnele de avertizare ale unei glicemii scăzute. Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă monitorizați glicemia. Acest lucru va ajuta medicul să decidă dacă doza de derivat de sulfoniluree sau insulină trebuie ajustată pentru a reduce riscul de glicemie scăzută.

Afecțiune oculară diabetică (retinopatie)

Dacă aveți o afecțiune oculară cauzată de diabet și utilizați insulină, acest medicament poate duce la o deteriorare a vederii, care poate necesita tratament. Informați medicul dacă aveți o afecțiune oculară diabetică sau dacă experimentați probleme oculare în timpul tratamentului cu acest medicament. Dacă aveți o afecțiune oculară diabetică posibil instabilă, utilizarea Ozempic 2 mg nu este recomandată.

Schimbări bruște ale vederii dumneavoastră

Dacă brusc nu mai vedeți sau vedeți mai puțin rapid în timpul tratamentului cu acest medicament, contactați imediat medicul dumneavoastră pentru sfaturi. Acest lucru poate fi cauzat de un efect secundar foarte rar numit neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) (vezi secțiunea 4: Reacții adverse grave). Medicul dumneavoastră vă poate

trimite pentru un examen oftalmologic și poate fi necesar să opriți tratamentul cu acest medicament.

Copii și adolescenți până la 18 ani

Acest medicament nu este recomandat copiilor și adolescenților sub 18 ani deoarece siguranța și eficacitatea în acest grup de vârstă nu au fost încă stabilite.

Utilizați alte medicamente?

Utilizați alte medicamente pe lângă Ozempic, ați făcut-o recent sau este posibil să utilizați alte medicamente în curând? Spuneți-i medicului sau farmacistului dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe bază de plante sau alte medicamente pe care le-ați cumpărat fără prescripție medicală.

Spuneți medicului, farmacistului sau asistentei dumneavoastră în special dacă utilizați medicamente care conțin una dintre următoarele substanțe active:

Warfarină sau alte medicamente similare administrate pe cale orală care împiedică coagularea sângelui (anticoagulante orale). Este posibil să fie necesar să vă testați sângele mai des pentru a verifica cât de repede se coagulează sângele dumneavoastră. Sau dacă utilizați insulină. Medicul dumneavoastră vă va spune cum să reduceți doza de insulină și vă va recomanda să vă verificați glicemia mai des pentru a preveni hiperglicemia (nivel ridicat de zahăr în sânge) și cetoacidoza diabetică (o complicație a diabetului care apare atunci când organismul nu poate descompune glucoza din cauza lipsei de insulină).

Sarcina și alăptarea

Sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă, doriți să rămâneți gravidă sau alăptați? Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament.

Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul sarcinii deoarece nu se știe dacă este dăunător pentru copilul nenăscut. Prin urmare, se recomandă utilizarea contracepției în timpul utilizării acestui medicament. Dacă doriți să rămâneți gravidă, discutați cu medicul dumneavoastră despre cum trebuie ajustat tratamentul, deoarece trebuie să opriți utilizarea acestui medicament cu cel puțin 2 luni înainte. Dacă rămâneți gravidă în timpul utilizării acestui medicament, contactați imediat medicul dumneavoastră, deoarece tratamentul dumneavoastră trebuie schimbat.

Nu utilizați acest medicament dacă alăptați, deoarece nu se știe dacă ajunge în laptele matern.

Capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Este puțin probabil ca Ozempic să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Dacă utilizați acest medicament în combinație cu un derivat de sulfoniluree sau insulină, puteți avea glicemie scăzută (hipoglicemie) care vă poate reduce capacitatea de concentrare. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje atunci când aveți simptome de glicemie scăzută. Consultați secțiunea 2 'Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?' pentru informații despre un risc crescut de glicemie scăzută și secțiunea 4 pentru simptomele de avertizare ale glicemiei scăzute. Contactați medicul dumneavoastră pentru mai multe informații.

Ozempic conține sodiu

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză, adică este în esență 'fără sodiu'.

### 3. Cum se utilizează acest medicament?

Utilizați acest medicament întotdeauna exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

Cât de mult din acest medicament trebuie să folosec?

Doza inițială este de 0,25 mg o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni.

După patru săptămâni, medicul dumneavoastră va crește doza la 0,5 mg o dată pe săptămână.

Dacă glicemia dumneavoastră nu este suficient controlată cu o doză de 0,5 mg o dată pe săptămână, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să creșteți doza la 1 mg o dată pe săptămână.

Dacă glicemia dumneavoastră nu este suficient controlată cu o doză de 1 mg o dată pe săptămână, medicul dumneavoastră vă poate recomanda să creșteți doza la 2 mg o dată pe săptămână.

Nu schimbați doza decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus să faceți acest lucru.

Cum se administrează acest medicament?

Ozempic se administrează ca o injecție subcutanată (injecție sub piele). Nu injectați în venă sau mușchi.

Cele mai bune locuri pentru injectare sunt partea din față a coapselor, partea din față a taliei (abdomen) sau brațul superior.

Înainte de a folosi stiloul pentru prima dată, lăsați medicul sau asistenta să vă arate cum să folosiți stiloul.

Instrucțiuni detaliate de utilizare se găsesc pe spatele acestui prospect.

Când utilizați acest medicament?

Utilizați acest medicament o dată pe săptămână, de preferință în aceeași zi a fiecărei săptămâni.

Vă puteți injecta în orice moment al zilei – indiferent de mese.

Pentru a vă ajuta să vă amintiți că trebuie să injectați acest medicament doar o dată pe săptămână, se recomandă să notați ziua săptămânii aleasă (de exemplu, o miercuri) pe cutie și să scrieți data pe cutie de fiecare dată când ați injectat acest medicament.

Dacă este necesar, puteți schimba ziua injecției săptămânale a acestui medicament, atâta timp cât este la cel puțin 3 zile după ultima injecție a acestui medicament. După selectarea unei noi zile de dozare, doza trebuie continuată o dată pe săptămână.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Contactați imediat medicul dumneavoastră dacă ați utilizat mai mult Ozempic decât ar trebui. Puteți avea reacții adverse, cum ar fi greață.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Dacă uitați să injectați o doză și:

dacă au trecut 5 zile sau mai puțin de când ar fi trebuit să utilizați Ozempic, utilizați-l imediat ce vă amintiți. Apoi, injectați următoarea doză ca de obicei, în ziua planificată. Dacă au trecut mai mult de 5 zile de când ar fi trebuit să utilizați Ozempic, săriți peste doza uitată. Apoi, injectați următoarea doză ca de obicei, în ziua planificată.

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Nu întrerupeți utilizarea acestui medicament fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să îl utilizați, nivelul zahărului din sânge poate crește.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.

#### 4. Posibile reacții adverse

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează.

##### Reacții adverse grave

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

complicații ale afecțiunilor oculare diabetice (retinopatie) – spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme oculare în timpul tratamentului cu acest medicament, cum ar fi modificări ale vederii.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 utilizatori)

inflamația pancreasului (pancreatită acută), care poate provoca dureri severe și persistente în abdomen și spate. Trebuie să contactați imediat medicul dacă aveți aceste simptome.

Rar (apar la mai puțin de 1 din 1.000 utilizatori)

reacții alergice severe (reacții anafilactice, angioedem). Solicitați imediat ajutor medical și informați medicul cât mai curând posibil dacă aveți simptome precum dificultăți de respirație, umflarea feței, buzelor, limbii și/sau gâtului cu dificultăți la înghițire și puls rapid.

Foarte rar (apar la mai puțin de 1 din 10.000 utilizatori)

o afecțiune medicală a ochiului numită neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION) care poate face ca, fără durere, să vedeți mai puțin sau deloc cu unul dintre ochi. Contactați imediat medicul dacă observați că nu mai vedeți brusc sau vedeți mai puțin treptat (vezi secțiunea 2: 'Schimbări bruște ale vederii').

Necunoscut (nu poate fi determinat cu datele disponibile)

Obstrucție intestinală. O formă severă de constipație cu simptome precum dureri abdominale, balonare, vărsături, etc.

##### Alte reacții adverse

Foarte frecvent (apare la mai mult de 1 din 10 utilizatori)

greață – aceasta dispare de obicei după un timp  
diaree – aceasta dispare de obicei după un timp  
glicemie scăzută (hipoglicemie), dacă acest medicament este utilizat împreună cu medicamente care conțin un derivat de sulfoniluree sau insulină

Frecvent (apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

vărsături

glicemie scăzută (hipoglicemie), dacă acest medicament este utilizat împreună cu medicamente antidiabetice orale altele decât derivați de sulfoniluree sau insulină

Semnele de avertizare ale unei glicemii scăzute pot apărea brusc. Acestea pot include: transpirație rece, piele rece și palidă, dureri de cap, bătăi rapide ale inimii, greață sau senzație intensă de foame, modificări ale vederii, senzație de somnolență sau slăbiciune, senzație de nervozitate, anxietate sau confuzie, dificultăți de concentrare sau tremurături. Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați glicemia scăzută și ce să faceți dacă aveți aceste semne de avertizare.

Glicemia scăzută este mai probabil să apară dacă utilizați și un derivat de sulfoniluree sau insulină. Medicul dumneavoastră poate reduce doza acestor medicamente înainte de a începe să utilizați acest medicament.

indigestie

gastrită – simptomele includ dureri de stomac, greață sau vărsături

reflux sau arsuri la stomac – cunoscut și sub numele de boală de reflux gastroesofagian (BRGE)

dureri abdominale

senzație de balonare în abdomen

constipație

eructații

calculi biliari

amețeli

oboseală

pierdere în greutate

scăderea apetitului

flatulență

creșterea enzimelor pancreaticeși (cum ar fi lipaza și amilaza)

dureri de cap.

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

mâncarea sau băutura au un gust diferit de cel normal

puls rapid

reacții la locul injectării – cum ar fi vânătăi, durere, iritație, mâncărime și erupții cutanate

reacții alergice cum ar fi erupții cutanate, mâncărime sau urticarie

alimentele rămân mai mult timp decât normal în stomac (întârzierea golirii stomacului).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală. Acest lucru se aplică și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Puteți raporta reacțiile adverse și direct prin sistemul național de raportare menționat în anexa V.

Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu mai utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe eticheta stiloului și pe cutia de carton după EXP. Este indicată o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Înainte de utilizare:

Păstrați la frigider (2°C–8°C). Nu păstrați la congelator. Țineți departe de elementul de răcire. Păstrați capacul stiloului pe stilou pentru a-l proteja de lumină.

După utilizare:

Dacă păstrați stiloul sub 30°C sau la frigider (2°C–8°C) (nu în apropierea elementului de răcire), îl puteți păstra timp de 6 săptămâni. Nu păstrați Ozempic la congelator. Dacă medicamentul a fost congelat, nu mai trebuie utilizat.

Păstrați stiloul cu capacul pus atunci când nu îl utilizați pentru a-l proteja de lumină.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că soluția nu este limpede și incoloră sau aproape incoloră.

Nu aruncați medicamentele pe scurgerea chiuvetei sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai utilizați. Dacă eliminați medicamentele în mod corespunzător, acestea sunt distruse în mod responsabil și nu ajung în mediu.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este semaglutida. Un ml de soluție injectabilă conține 2,68 mg semaglutidă. Un stilou preumplut conține 8 mg semaglutidă în 3 ml soluție. Fiecare doză conține 2 mg semaglutidă în 0,74 ml.

Celelalte substanțe din acest medicament sunt: dihidrat de dinatrium fosfat, propilenglicol, fenol, apă pentru injecții, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului). Vezi și secțiunea 2, 'Ozempic conține sodiu'.

Cum arată Ozempic și ce conține un ambalaj?

Ozempic este o soluție limpede și incoloră sau aproape incoloră pentru injecție într-un stilou preumplut.

Fiecare stilou preumplut conține 3 ml soluție, destinat pentru 4 doze de 2 mg.

Ozempic 2 mg soluție injectabilă este disponibil în următoarele dimensiuni de ambalaj: 1 stilou și 4 ace de unică folosință NovoFine Plus.

3 stilouri și 12 ace de unică folosință NovoFine Plus.

Nu toate dimensiunile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd  
Danemarca

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în

Alte surse de informații

Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene pentru Medicamente: <http://www.ema.europa.eu>.

## Instrucțiuni de utilizare

Ozempic 2 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut semaglutid

Instrucțiuni pentru utilizarea Ozempic 2 mg soluție pentru injecție într-un stilou preumplut

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza stiloul preumplut Ozempic. Discutați cu medicul, asistenta sau farmacistul despre cum să injectați corect Ozempic. Începeți prin a verifica stiloul pentru a vă asigura că stiloul conține Ozempic 2 mg. Apoi, consultați imaginile de mai jos pentru a cunoaște diferitele părți ale stiloului și acului dumneavoastră.

Dacă sunteți orb sau aveți deficiențe de vedere și nu puteți citi fereastra de afișare a dozei de pe stilou, nu utilizați acest stilou fără ajutor. Cereți ajutorul unei persoane cu vedere bună și care știe cum să utilizeze stiloul preumplut Ozempic.

Stiloul dumneavoastră este un stilou preumplut cu buton de reglare a dozei rotativ. Stiloul conține 8 mg semaglutid și puteți selecta doar doze de 2 mg. Un stilou neutilizat conține patru doze de 2 mg.

Folosiți tabelul de pe partea interioară a capacului cutiei pentru a ține evidența câte injecții ați făcut și când le-ați administrat.

Stiloul dumneavoastră este proiectat pentru a fi utilizat cu ace de unică folosință de 30G, 31G și 32G cu o lungime maximă de 8 mm.

Ace NovoFine Plus sunt incluse în ambalaj.

### Informații importante

Acordați o atenție deosebită acestor observații deoarece sunt importante pentru utilizarea în siguranță a stiloului.

#### 1. Montarea unui ac nou pe stiloul dumneavoastră

Verificați numele și eticheta colorată a stiloului dumneavoastră pentru a vă asigura că conține Ozempic 2 mg. Acest lucru este deosebit de important dacă utilizați mai mult de un tip de medicament injectabil. Utilizarea unui medicament greșit poate fi dăunătoare pentru sănătatea dumneavoastră.

Scoateți capacul stiloului.

Verificați dacă soluția din stilou este limpede și incoloră. Priviți prin fereastra stiloului. Dacă soluția pare tulbure sau colorată, nu trebuie să utilizați stiloul.

Luați un ac nou.

Verificați dacă plăcuța de hârtie și capacul exterior al acului sunt deteriorate, acestea pot afecta sterilitatea. Utilizați un ac nou dacă observați vreo deteriorare.

Îndepărtați plăcuța de hârtie.

Asigurați-vă că atașați corect acul.

Apăsăți acul drept pe stilou.

Rotiți-l pentru a-l fixa.

Există un capac și un dop pe ac. Trebuie să le îndepărtați pe ambele. Dacă nu le îndepărtați pe ambele, nu veți injecta soluția. Scoateți capacul exterior al acului și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Veți avea nevoie de el după injecție pentru a scoate acul în siguranță de pe stilou.

Scoateți capacul exterior al acului și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Veți avea nevoie de el după injecție pentru a scoate acul în siguranță de pe stilou.

Îndepărtați capacul interior al acului și aruncați-l. Dacă încercați să-l puneți la loc, vă puteți înțepa accidental cu acul.

O picătură de soluție poate apărea la vârful acului. Acest lucru este normal, dar trebuie să verificați totuși fluxul dacă utilizați un stilou nou pentru prima dată. Vedeți pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou'.

Atașați un ac nou la stilou doar atunci când sunteți gata să administrați injecția.

Folosiți întotdeauna un ac nou pentru fiecare injecție.

Astfel se pot preveni ace blocate, contaminare, infecție, scurgeri de soluție și dozare inexactă.

Nu folosiți niciodată un ac îndoit sau deteriorat.

## 2. Verificați fluxul la fiecare stilou nou

Dacă stiloul dumneavoastră este deja în uz, treceți la pasul 3 'Setarea dozei dumneavoastră'. Verificați fluxul doar înainte de prima injecție cu fiecare stilou nou. Rotiți butonul de setare a dozei la linia de control (\*\* =) imediat după '0'. Verificați dacă linia de control este aliniată cu săgeata indicatoare a dozei.

Țineți stiloul cu acul îndreptat în sus.

Apăsăți butonul de administrare și mențineți-l apăsat până când fereastra de citire a dozei revine la '0'. Cifra '0' trebuie să fie aliniată cu săgeata indicatoare a dozei. Acum ar trebui să apară o picătură de soluție la vârful acului.

Poate rămâne o mică picătură la vârful acului, dar aceasta nu va fi injectată. Dacă nu apare nicio picătură, repetați pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou' de până la 6 ori. Dacă tot nu apare nicio picătură, înlocuiți acul și repetați pasul 2 'Verificați fluxul la fiecare stilou nou' încă o dată. Aruncați stiloul și folosiți unul nou dacă nici atunci nu apare nicio picătură de soluție.

Verificați întotdeauna dacă apare o picătură la vârful acului înainte de a folosi pentru prima dată un stilou nou. Astfel vă asigurați că soluția curge. Dacă nu apare nicio picătură, nu injectați medicamentul, chiar dacă apare un alt număr în fereastra de citire a dozei. Acest lucru poate indica un ac blocate sau deteriorat. Dacă nu verificați fluxul înainte de fiecare primă injecție cu un stilou nou, este posibil să nu primiți doza prescrisă și efectul dorit al Ozempic poate lipsi.

## 3. Setarea dozei dumneavoastră

Draai pe butonul de setare a dozei pentru a seta 2 mg.

Continuați să rotiți până când fereastra de citire a dozei se oprește și indică 2 mg.

Doar fereastra de citire a dozei și săgeata de indicare a dozei arată că 2 mg este setat. Puteți seta doar 2 mg per doză. Dacă stiloul dumneavoastră conține mai puțin de 2 mg, fereastra de citire a dozei se oprește înainte de a afișa 1.

Butonul de setare a dozei face un alt sunet de clic atunci când este rotit înainte, înapoi sau dincolo de 2 mg. Nu numărați numărul de clicuri ale stiloului.

Înainte de a injecta acest medicament, folosiți întotdeauna fereastra de citire a dozei și săgeata de indicare a dozei pentru a vedea că 2 mg este setat.

Nu numărați numărul de clicuri ale stiloului.

Doar doze de 2 mg sunt setate cu butonul de setare a dozei. 2 mg trebuie să fie exact aliniat cu săgeata indicatoare a dozei pentru a vă asigura că primiți doza corectă.

Pentru a vedea câtă soluție a mai rămas, utilizați fereastra de citire a dozei: rotiți butonul de setare a dozei până când fereastra de citire a dozei se oprește.

Dacă 2 este afișat, atunci mai sunt cel puțin 2 mg în stiloul dumneavoastră. Dacă fereastra de citire a dozei se oprește înainte de a afișa 2

mg, nu mai este suficientă soluție pentru o doză completă de 2 mg indică faptul că nu există suficientă soluție over pentru o doză completă de 2.4. Injectarea dozei dumneavoastră

Introduceți acul în piele în modul în care v-a arătat medicul sau asistenta.

#### 4. Injectați doza dumneavoastră

Apăsați butonul de administrare și mențineți-l apăsat.

Uitați-vă cum fereastra de citire a dozei revine la '0'. Cifra '0' trebuie să fie aliniată cu săgeata indicatoare a dozei. Este posibil să auziți sau să simțiți un clic.

Continuați să apăsați butonul de administrare în timp ce țineți acul în piele

Verificați cum fereastra de citire a dozei revine la „0”. Cifra „0” trebuie să fie aliniată cu săgeata indicatoare a dozei. Acum este posibil să auziți sau să simțiți un clic.

Continuați să apăsați butonul de administrare în timp ce mențineți acul în piele.

Numărați încet până la 6 în timp ce țineți apăsat butonul de administrare.

Dacă acul este scos din piele mai devreme, este posibil să vedeți un jet de soluție ieșind din vârful acului. În acest caz, nu a fost injectată întreaga doză.

Scoateți acul din piele. Puteți apoi să eliberați butonul de administrare.

Dacă locul injectării începe să sângereze, apăsați ușor pe el.

După injectare, este posibil să vedeți o picătură de soluție la vârful acului. Acest lucru este normal și nu afectează doza dumneavoastră.

Uitați-vă întotdeauna la fereastra de citire a dozei, astfel încât să știți câți mg injectați. Țineți apăsat butonul de administrare până când fereastra de citire a dozei revine la '0'.

Cum recunoașteți un acul înfundat sau deteriorat

- Dacă după apăsarea continuă a butonului de administrare fereastra de citire a dozei nu ajunge la '0', este posibil să fi folosit un ac înfundat sau deteriorat.
- În acest caz, nu ați primit niciun medicament, chiar dacă numărul din fereastra de citire a dozei s-a schimbat față de doza pe care ați setat-o inițial.

Cum să acționați în cazul unui ac înfundat Schimbați acul așa cum este descris la pasul 5 'După injectare' și repetați toți pașii începând cu pasul 1 'Echiparea stiloului cu un ac nou'. Asigurați-vă că setați întreaga doză de care aveți nevoie. Nu atingeți fereastra de citire a dozei în timpul injectării. Acest lucru poate întrerupe injectarea.

Nu atingeți fereastra de citire a dozei în timpul injectării. Acest lucru poate întrerupe injecția.

## 5. După injecția dumneavoastră

Îndepărtați întotdeauna acul după fiecare injecție și aruncați-l pentru a facilita injectarea și pentru a preveni blocarea acului. Dacă acul este blocat, nu se va injecta niciun medicament.

Așezați capacul exterior al acului pe o suprafață plană și introduceți vârful acului în el, fără a atinge acul sau capacul cu degetele.

Când acul este acoperit, apăsați ușor capacul exterior al acului complet pe ac. Desfaceți acul și aruncați-l cu grijă așa cum v-a fost indicat de medicul, asistenta, farmacistul sau autoritățile locale.

Puneți capacul stiloului înapoi pe stilou după fiecare utilizare, pentru a proteja soluția de lumină.

Dacă stiloul este gol, aruncați-l fără un ac conform instrucțiunilor medicului, asistentei, farmacistului sau autorităților locale.

Nu încercați niciodată să puneți la loc capacul interior al acului. V-ați putea înțepa cu acul. Îndepărtați întotdeauna imediat acul de pe stilou după fiecare injecție. Astfel se pot preveni blocarea acelor, contaminarea, infecția, scurgerile de soluție și dozarea inexactă.

## Alte informații importante

Păstrați întotdeauna stiloul și acele departe de vedere și de accesul altor persoane, în special al copiilor.

Nu împărțiți niciodată stiloul sau acele cu alte persoane.

Îngrijitorii trebuie să fie foarte atenți când manipulează acele folosite pentru a preveni accidentele de înțepare și contaminarea încrucișată.

## Întreținerea stiloului dumneavoastră

Tratați stiloul cu grijă. Manipularea dură sau utilizarea incorectă poate provoca dozare inexactă. În acest caz, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Nu lăsați stiloul într-o mașină sau într-un alt loc unde poate fi prea cald sau prea rece.

Ozempic care a fost înghețat nu trebuie injectat. Dacă totuși faceți acest lucru, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Ozempic care a fost expus la lumina directă a soarelui nu trebuie injectat. Dacă totuși faceți acest lucru, efectul dorit al acestui medicament poate să nu apară.

Nu expuneți stiloul dumneavoastră la praf, murdărie sau umiditate. Nu spălați, nu scufundați și nu ungeți stiloul dumneavoastră. Stiloul poate fi curățat cu un detergent ușor

pe o cârpă umedă. medicament pe o cârpă umedă.

fluxul înainte de a injecta. Nu încercați să reumpleți

stiloul dumneavoastră. Nu încercați să reparați sau să demontați stiloul dumneavoastră.

Nu încercați să reparați sau să demontați stiloul.

Transtoyou