

Pakuotės lapelis: informacija pacientui  
Pantoprazol Sandoz® 20 mg, skrandyje neiri tabletė  
pantoprazolas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Nedalinkite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, nenurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Pantoprazol Sandoz 20 mg ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Pantoprazol Sandoz 20 mg ir kam jis vartojamas?

Šis vaistas turi veikliąją medžiagą pantoprazolą. Pantoprazolas yra selektyvus „protonų siurblio inhibitorius“, vaistas, mažinantis rūgšties kiekį, gaminamą skrandyje. Jis vartojamas gydyti su skrandžio rūgštimi susijusias skrandžio ir žarnyno ligas.

Šis vaistas vartojamas gydyti suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų amžiaus

- Simptomams (pvz., rėmuo, rūgšties atpylimas, skausmas ryjant), kurie susiję su stemplės liga, kurią sukelia skrandžio rūgšties grįžimas iš skrandžio.
- Ilgalaikiam reflukso ezofagito (stemplės uždegimas, susijęs su skrandžio rūgšties grįžimu) gydymui ir siekiant išvengti reflukso ezofagito pasikartojimo.

Šis vaistas naudojamas suaugusiųjų gydymui

- Siekiant išvengti skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opų, kurias sukelia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU), pvz., ibuprofenas, rizikos pacientams, kurie nuolat turi vartoti NVNU.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Jūs esate alergiškas pantoprazoliui arba bet kuriai kitai šio vaisto sudedamajai daliai. Šias medžiagas galite rasti šio pakuotės lapelio 6 skyriuje.
- Jūs esate alergiškas vaistams, kuriuose yra kitų protonų siurblio inhibitorių.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju:

- jei turite rimtų kepenų problemų. Jei kada nors turėjote kepenų problemų, turite apie tai pasakyti savo gydytojui. Jūsų gydytojas dažniau tikrins jūsų kepenų fermentus, ypač jei šį vaistą vartojate ilgalaikiam gydymui; gydymas gali būti nutrauktas. Jei padidėja kepenų fermentai, gydymą reikia nutraukti.
- jei nuolat turite vartoti vaistus, vadinamus NVNU, ir jums skiriamas šis vaistas, nes turite padidėjusią skrandžio ir žarnyno komplikacijų riziką. Ar turite padidėjusią riziką, bus vertinama pagal jūsų asmeninius rizikos veiksnius, tokius kaip jūsų amžius (65 metai ar vyresni), skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opų ar skrandžio ar žarnyno kraujavimo istorija.
- jei turite sumažėjusias kūno atsargas arba rizikos veiksnius dėl sumažėjusio vitamino B12 kiekio ir ilgai gydotės šiuo pantoprazoliu. Kaip ir visi rūgštį mažinantys vaistai, pantoprazolis gali sumažinti vitamino B12 įsisavinimą. Pasitarkite su savo gydytoju, jei pastebite bet kurį iš šių simptomų, nes jie gali rodyti vitamino B12 trūkumą:
  - o ekstremalus nuovargis arba energijos trūkumas
  - o dilgčiojimo pojūtis
  - o skausmingas arba raudonas liežuvis, burnos opos
  - o raumenų silpnumas
  - o sutrikęs regėjimas
  - o atminties problemos, sumišimas, depresija
- jei kartu su šiuo vaistu vartojate ŽIV proteazės inhibitorius, tokius kaip atazanaviras (ŽIV infekcijos gydymui). Pasitarkite su savo gydytoju dėl specifinių patarimų.
- protonų siurblio inhibitorių, tokių kaip pantoprazolis, vartojimas, ypač ilgiau nei vienerius metus, gali šiek tiek padidinti jūsų riziką lūžti klubą, riešą ar stuburą. Pasakykite savo gydytojui, jei turite osteoporozę (kaulų retėjimą) arba jei jūsų gydytojas jums pasakė, kad turite riziką susirgti osteoporozė (pavyzdžiui, dėl steroidų vartojimo).
- jei šį vaistą vartojate ilgiau nei tris mėnesius, gali sumažėti magnio kiekis kraujyje. Mažas magnio kiekis gali pasireikšti nuovargiu, nevalingais raumenų susitraukimais, dezorientacija, traukuliais, galvos svaigimu ir padidėjusiu širdies ritmu. Jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų, nedelsdami praneškite savo gydytojui. Mažas magnio kiekis taip pat gali lemti kalio ar kalcio kiekio sumažėjimą kraujyje. Jūsų gydytojas gali nuspręsti reguliariai atlikti kraujo tyrimus, kad stebėtų jūsų rodiklius.
- jei jums reikia atlikti specifinį kraujo tyrimą (chromograninas A).
- jei kada nors turėjote odos reakciją po gydymo vaistu, panašiu į šį vaistą, kuris slopina skrandžio rūgšties gamybą.

Kuo greičiau praneškite savo gydytojui, jei atsiranda odos bėrimas, ypač tose vietose, kurios yra veikiamos saulės šviesos, nes gali tekti nutraukti gydymą šiuo vaistu. Nepamirškite pranešti ir apie kitus šalutinius poveikius, tokius kaip sąnarių skausmas.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją prieš arba po šio vaisto vartojimo, jei pastebite bet kurį iš šių simptomų, kurie gali būti kitos, rimtesnės ligos signalas:

- neplanuotas svorio netekimas

- vėmimas, ypač pasikartojantis
- kraujo vėmimas; tai gali pasirodyti kaip tamsi kava jūsų vėmaluose
- pastebite kraują išmatose; jos gali būti juodos arba dervos išvaizdos
- rijimo sunkumai arba skausmas ryjant
- atrodote blyškus ir jaučiatės silpnas (anemija)
- krūtinės skausmas
- skrandžio skausmas
- sunkus ir/arba nuolatinis viduriavimas, nes šis vaistas buvo susijęs su nedideliu viduriavimo padidėjimu, kurį sukėlė infekcija
- buvo pranešimų apie sunkias odos reakcijas gydant pantoprazolu, įskaitant Stevenso-Džonsono sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaistų reakciją su eozinofilija ir sisteminiiais simptomais (DRESS) ir daugiaformę eritemą. Nutraukite pantoprazolo vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebite simptomus, susijusius su šiomis sunkiomis odos reakcijomis, aprašytais 4 skyriuje.

Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad jums reikia atlikti keletą tyrimų, kad būtų atmesta piktybinė liga, nes šis vaistas taip pat palengvina vėžio simptomus; dėl to gali užtrukti diagnozės nustatymas. Jei jūsų skundai išlieka nepaisant gydymo, bus svarstomi tolesni tyrimai.

Jei ilgai (daugiau nei 1 metus) vartojate šį vaistą, jūsų gydytojas greičiausiai jus reguliariai stebės. Kiekvieną kartą, kai lankotės pas gydytoją, turite pranešti apie naujus ir neįprastus simptomus bei ypatybes.

Vaikai ir paaugliai

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams, nes veiksmingumas nebuvo įrodytas vaikams iki 12 metų.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus kartu su Pantoprazol Sandoz 20 mg, ar neseniai vartojote, ar planuojate vartoti kitus vaistus artimiausiu metu? Pasakykite tai savo gydytojui arba vaistininkui. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriems nereikia recepto.

Taip yra todėl, kad pantoprazolas gali paveikti kitų vaistų veikimą. Todėl pasakykite savo gydytojui, jei vartojate vieną iš toliau nurodytų vaistų:

- vaistai, tokie kaip ketokonazolas, itrakonazolas ir posakonazolas (naudojami grybelinėms infekcijoms gydyti) arba erlotinibas (naudojamas tam tikroms vėžio formoms gydyti), nes Pantoprazol Sandoz 20 mg gali sukelti, kad šie ir kiti vaistai neveiktų tinkamai.
- varfarinas ir fenpropumonas, kurie veikia kraujo krešėjimą arba skystinimą. Gali prireikti papildomų kontrolinių tyrimų.
- vaistai, naudojami ŽIV infekcijai gydyti (tokie kaip atazanaviras).
- metotreksatas (naudojamas reumatoidiniam artritui, psoriazei ir vėžiui gydyti); jei vartojate metotreksatą, jūsų gydytojas gali laikinai nutraukti gydymą Pantoprazol Sandoz 20 mg, nes pantoprazolas gali padidinti metotreksato kiekį kraujyje.

- fluvoxaminas (naudojamas depresijai ar kitoms psichikos ligoms gydyti). Jei vartojate fluvoxaminą, jūsų gydytojas gali sumažinti dozę.
- rifampicinas (naudojamas infekcijoms gydyti).
- jonažolė (*Hypericum perforatum*) (naudojama lengvai depresijai gydyti).

Jei turite atlikti specifinį šlapimo tyrimą (dėl THC, tetrahidrokanabinolio), aptarkite tai su savo gydytoju prieš vartodami Pantoprazol Sandoz.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Nėra pakankamai duomenų apie šio vaisto vartojimą nėščioms moterims. Pranešta apie išsiskyrimą į motinos pieną.

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar žindote kūdikį? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Šį vaistą galite vartoti tik tuo atveju, jei jūsų gydytojas mano, kad nauda jums yra didesnė už galimą riziką jūsų negimusiam vaikui ar kūdikiui.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų naudojimas

Šis vaistas neturi arba turi nereikšmingą poveikį vairavimo gebėjimams ir mašinų naudojimui.

Jei patiriate šalutinį poveikį, pvz., galvos svaigimą ir sutrikusį regėjimą, neturėtumėte vairuoti transporto priemonių ar valdyti mašinų.

Pantoprazol Sandoz sudėtyje yra dažiklio ir natrio.

Pantoprazol Sandoz 20 mg sudėtyje yra azo dažiklio Ponceau 4R aliuminio karmino (E124), kuris gali sukelti alergines reakcijas.

Šio vaisto sudėtyje yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje skrandžio sultims atsparioje tabletėje, tai reiškia, kad jis iš esmės yra „be natrio“.

### 3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Vartojimo būdas

Išgerkite tabletes 1 valandą prieš valgį, nekramtydami ir nelaužydami jų, ir nurykite jas užsigerdami trupučiu vandens.

Rekomenduojama dozė yra:

Suaugusieji ir paaugliai nuo 12 metų:

Dėl simptomų (pvz., rėmens, rūgšties atpylimo, skausmo ryjant), susijusių su stemplės ligomis, gydymo:

Įprasta dozė yra viena tabletė per dieną. Ši dozė paprastai palengvina simptomus per 2-4 savaites, o vėliausiai po dar 4 savaitių. Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turite tęsti vaisto vartojimą. Jei po to simptomai vėl atsiranda, juos galima kontroliuoti vartojant vieną tabletę per dieną, jei reikia.

Dėl ilgalaikio reflukso ezofagito gydymo ir siekiant išvengti reflukso ezofagito pasikartojimo:

Įprasta dozė yra viena tabletė per dieną. Jei liga pasikartoja, jūsų gydytojas gali padvigubinti dozę. Tokiu atveju galite alternatyviai vartoti Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletes, po vieną per dieną. Po išgijimo dozę galite sumažinti iki vienos 20 mg tabletės per dieną.

Suaugusieji:

Siekiant išvengti dvylikapirštės žarnos opų pacientams, kurie nuolat turi vartoti NVNU:

Įprasta dozė yra viena tabletė per dieną.

Pacientai su kepenų problemomis

Jei turite rimtų kepenų problemų, negalite vartoti daugiau nei vienos 20 mg tabletės per dieną.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Šios tabletės nerekomenduojamos vaikams iki 12 metų.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Pasakykite apie tai savo gydytojui arba vaistininkui. Perdozavimo simptomai nėra žinomi.

Ar pamiršote pavartoti šį vaistą?

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę. Vartokite kitą įprastą dozę įprastu laiku.

Jei nustosite vartoti šį vaistą

Nenustokite vartoti šių tablečių nesusitarę su savo gydytoju ar vaistininku.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Susisiekite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį. Ne visi žmonės jį patiria.

Jei pasireiškia kuris nors iš šių šalutinių poveikių, turite nutraukti šių tablečių vartojimą ir nedelsdami informuoti savo gydytoją arba kreiptis į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių:

- Sunkios alerginės reakcijos (retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų): liežuvio ir/ar gerklės patinimas, rijimo sunkumai, dilgėlinė, kvėpavimo sunkumai, veido patinimas (Quincke edema/angioedema), stiprus galvos svaigimas su labai greitu širdies plakimu ir gausiu prakaitavimu
- Sunkios odos ligos (dažnis nežinomas: negalima nustatyti pagal turimus duomenis): Galite patirti vieną ar daugiau iš šių simptomų:
  - o odos pūslėjimas ir greitas bendros sveikatos būklės pablogėjimas, paviršiniai pažeidimai (įskaitant lengvą kraujavimą) akių, nosies, burnos/lūpų ar lytinių organų srityje, arba odos jautrumas/odos bėrimas ypač tose vietose, kurias veikia šviesa/saulė. Taip pat galite jausti sąnarių skausmą ar gripo simptomus, karščiavimą, patinusius limfmazgius (pvz., pažastyje) ir kraujo tyrimai gali parodyti tam tikrų baltųjų kraujo kūnelių ar kepenų fermentų pokyčius.
  - o rausvos, plokščios, žiedinės arba apvalios dėmės ant liemens, dažnai su pūslėmis centre, pleiskanojanti oda, opos burnoje, gerklėje, nosyje ir ant lytinių organų bei akių. Šis sunkus odos bėrimas gali būti prieš karščiavimą ir gripo simptomus (Stevens-Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė).
  - o plačiai paplitęs odos bėrimas, aukšta kūno temperatūra ir patinę limfmazgiai (DRESS sindromas arba vaistų sukeltas padidėjusio jautrumo sindromas) ir jautrumas šviesai.
- Kitos sunkios būklės (dažnis nežinomas): odos ar akių baltymų pageltimas (sunkus kepenų ląstelių pažeidimas, gelta) arba karščiavimas, odos bėrimas ir padidėję inkstai, kartais su skausmu šlapinantis ir nugaros skausmu (sunkus inkstų uždegimas), galintis sukelti inkstų nepakankamumą

Kitas galimas šalutinis poveikis yra:

- Dažnai (gali pasireikšti 1 iš 10 vartotojų) gerybiniai polipai skrandyje
- Kartais (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 vartotojų) galvos skausmas; galvos svaigimas; viduriavimas; pykinimas, vėmimas; pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis; vidurių užkietėjimas; burnos džiūvimas; skausmas ir diskomfortas viršutinėje pilvo dalyje; niežtinčio odos bėrimo atsiradimas (bėrimas/eksantema/erupcijos); niežulys; silpnumas, išsekimo jausmas arba bloga savijauta; miego sutrikimai; klubo, riešo ar stuburo slankstelių lūžiai
- Retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų) skonio pojūčio iškraipymas arba visiškai jo nebuvimas; regėjimo sutrikimai, tokie kaip neryškus matymas; dilgėlinė; sąnarių skausmas; raumenų skausmai; svorio pokyčiai; padidėjusi kūno temperatūra; aukšta karščiavimas; patinę rankos ir/ar kojos (periferinė edema); alerginės reakcijos; depresija; krūtų formavimasis vyrams
- Labai retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) dezorientacija
- Nežinomas (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis) haliucinacijos, sumišimas (ypač pacientams, turintiems šių simptomų istoriją), dilgčiojimas, dilgčiojimo pojūtis, tirpimas, deginimo pojūtis arba nejautrumas, odos bėrimas, galimas sąnarių skausmas; storosios žarnos uždegimas, sukeliantis nuolatinį vandeningą viduriavimą

Šalutiniai poveikiai, nustatyti kraujo tyrimu:

- Kartais (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 vartotojų) kepenų fermentų padidėjimas
- Retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų) bilirubino kiekio padidėjimas; padidėjęs riebalų kiekis kraujyje; stiprus cirkuliuojančių baltųjų kraujo kūnelių (granulocitų) sumažėjimas, lydymas aukštos temperatūros
- Labai retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) trombocitų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio galite kraujuoti daugiau nei įprastai arba dažniau atsiranda mėlynės; baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali dažniau pasireikšti infekcijos; vienu metu nenormalus baltųjų ir raudonųjų kraujo kūnelių bei trombocitų skaičiaus sumažėjimas
- Nežinoma (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis) mažesnis natrio, magnio, kalcio ar kalio kiekis kraujyje (žr. 2 skyrių).

## Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma ir šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami apie šalutinį poveikį, padedate mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

### 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto po galiojimo pabaigos datos. Ją rasite ant dėžutės po „EXP.:“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Nenaudokite šio vaisto, jei praėjo 6 mėnesiai po pirmojo atidarymo.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebenaudojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie bus tinkamai sunaikinti ir nepateks į aplinką.

### 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra pantoprazolas. Kiekvienoje skrandyje neiriančioje tabletėje yra 20 mg pantoprazolo (kaip natrio seskvihidrato).
- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:  
Tabletės šerdis: kalcio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska (A tipas), hidroksipropilceliuliozė (EXF tipas), bevandenis natrio karbonatas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas.  
Danga: hipromeliozė, geležies oksidas geltonas (E172), makrogolis 400, metakrilato rūgšties-etilakrilato kopolimeras (1:1), polisorbitas 80, Ponceau 4R aliuminio karminas (E124), chinolino geltonas aliuminio karminas (E104), natrio laurilsulfatas, titano dioksidas (E171), tri-etilcitratas.

Kaip atrodo Pantoprazol Sandoz 20 mg ir kas yra pakuotėje?

Skrandžio sultims atsparios tabletės

Pantoprazol Sandoz 20 mg, skrandžio sultims atsparios tabletės yra geltonos, ovalios tabletės (padengtos specialiu sluoksniu), maždaug 8,9 x 4,6 mm ir prieinamos:

lizdinių plokštelių pakuotėse su 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1, 140, 168 tabletėmis

indeliuose su 14, 28, 56, 98, 100, 105, 250 arba 500 tabletėmis.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra pateikiami rinkoje.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Leidimo turėtojas:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Nyderlandai

Gamintojai:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

D39179 Barleben

Vokietija

Lek Spolka Akcyjna

Ul. Domaniewska 50 c

02-672 Varšuva

Lenkija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana

Slovėnija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2 D,

9220 Lendava

Slovėnija

Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

540472 Targu-Mures

Rumunija

Lek S.A.

ul.Podlipie 16  
95-010 Strykow  
Lenkija

Įregistruota registre pagal

Pantoprazol Sandoz 20 mg, skrandyje neiri tabletė yra įregistruota registre pagal RVG 33657.

Šis vaistas yra registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse šiais pavadinimais

Nyderlandai: Pantoprazol Sandoz 20 mg, skrandyje neiri tabletė  
Austrija: Pantoprazol Sandoz 20 mg Magensaftresistente tabletten  
Belgija: Pantoprazol 20 mg skrandyje neiri tabletė  
Vokietija: Pantoprazol Sandoz 20 mg magensaftresistente Tabletten  
Danija: Pantoprazol Sandoz  
Graikija: Ozepran  
Ispanija: PANTOPRAZOL SANDOZ 20 mg skrandyje neiriantys tabletės EFG  
Suomija: Pantoprazol Sandoz 20 mg enterotabletės  
Prancūzija: Pantoprazole Sandoz 20 mg, skrandyje neirianti tabletė  
Italija: PANTOPRAZOLO SANDOZ 20 mg skrandyje neiriantys tabletės  
Norvegija: Pantoprazol Sandoz 20 mg enterotabletės  
Lenkija: IPP 20  
Portugalija: PANTOPRAZOL SANDOZ, SKRANDYJE NEIRIANTYS TABLETĖS 20 mg  
Švedija: Pantoprazol Sandoz 20 mg enterotabletės  
Slovėnija: ACIPAN 20 mg skrandyje neiriantys tabletės  
Slovakija: Pantoprazol Sandoz 20 mg, skrandyje neiriantys tabletės  
Jungtinė Karalystė: Pantoprazole 20 mg skrandyje neiriantys tabletės

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2025 m. vasario mėn.