

Pakuotės lapelis: informacija pacientui  
Pantoprazol Sandoz® 40 mg, skrandyje neirios tabletės  
pantoprazolas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Nedalinkite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba šalutinis poveikis, nenurodytas šiame pakuotės lapelyje? Kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šio pakuotės lapelio turinys

1. Kas yra Pantoprazol Sandoz 40 mg ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Pantoprazol Sandoz 40 mg ir kam jis vartojamas?

Šis vaistas turi veikliąją medžiagą pantoprazolą. Pantoprazolas yra selektyvus „protonų siurblio inhibitorius“, vaistas, mažinantis rūgšties kiekį, gaminamą skrandyje. Jis vartojamas gydyti su skrandžio rūgštimi susijusias skrandžio ir žarnyno ligas.

Šis vaistas vartojamas gydyti suaugusius ir vyresnius nei 12 metų paauglius:

- Refliuksinis ezofagitas: jūsų stemplės (jungtis tarp gerklės ir skrandžio) uždegimas, susijęs su skrandžio rūgšties grįžimu.

Šis vaistas vartojamas gydyti suaugusius:

- Infekcija bakterija, vadinama *Helicobacter pylori*, pacientams, sergantiems dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opomis, kartu su dviem antibiotikais (išnaikinimo gydymas). Tikslas yra pašalinti bakterijas ir taip sumažinti tikimybę, kad šios opos atsinaujins.
  - Skrandžio opos ir dvylikapirštės žarnos opos.
  - Zollinger-Ellison sindromas ir kitos būklės, kai skrandyje gaminasi per daug rūgšties.
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kada negalima vartoti šio vaisto?

- Jūs esate alergiškas pantoprazoliui arba bet kuriai kitai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.
- Jūs esate alergiškas vaistams, kuriuose yra kitų protonų siurblio inhibitorių.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju:

- jei turite rimtų kepenų problemų. Jei kada nors turėjote kepenų problemų, turite apie tai pasakyti savo gydytojui. Jūsų gydytojas dažniau tikrins jūsų kepenų fermentus, ypač jei šį vaistą vartojate ilgalaikiam gydymui. Jei kepenų fermentų kiekis padidėja, gydymą reikia nutraukti.
- jei turite sumažėjusias kūno atsargas arba rizikos veiksnius, dėl kurių sumažėja vitamino B12 kiekis, ir ilgai gydotės pantoprazoliu. Kaip ir visi rūgštį mažinantys vaistai, pantoprazolis gali sumažinti vitamino B12 įsisavinimą. Pasitarkite su savo gydytoju, jei pastebite bet kurį iš šių simptomų, nes jie gali rodyti vitamino B12 trūkumą:
  - o ekstremalus nuovargis arba energijos trūkumas
  - o dilgčiojimo pojūtis
  - o skausmingas arba raudonas liežuvis, burnos opos
  - o raumenų silpnumas
  - o sutrikęs regėjimas
  - o atminties problemos, sumišimas, depresija
- jei vartojate ŽIV proteazės inhibitorius, tokius kaip atazanaviras (ŽIV infekcijos gydymui). Pasitarkite su savo gydytoju dėl specifinių patarimų.
- protonų siurblio inhibitorių, tokių kaip pantoprazolis, vartojimas, ypač ilgiau nei vienerius metus, gali šiek tiek padidinti jūsų riziką susilaužyti klubą, riešą ar stuburą. Pasakykite savo gydytojui, jei sergate osteoporoze (kaulų retėjimu) arba jei jūsų gydytojas jums sakė, kad jums gresia osteoporozė (pavyzdžiui, dėl steroidų vartojimo).
- jei vartojate šį vaistą ilgiau nei tris mėnesius, gali sumažėti magnio kiekis kraujyje. Mažas magnio kiekis gali pasireikšti nuovargiu, nevalingais raumenų susitraukimais, dezorientacija, traukuliais, galvos svaigimu ir padidėjusiu širdies ritmu. Jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų, nedelsdami pasakykite savo gydytojui. Mažas magnio kiekis taip pat gali sumažinti kalio ar kalcio kiekį kraujyje. Jūsų gydytojas gali nuspręsti reguliariai atlikti kraujo tyrimus, kad stebėtų jūsų kiekius.
- jei jums reikia atlikti specifinį kraujo tyrimą (chromograninas A).
- jei kada nors turėjote odos reakciją po gydymo vaistu, panašiu į šį vaistą, kuris slopina skrandžio rūgšties gamybą.

Pasakykite savo gydytojui kuo greičiau, jei atsiranda odos bėrimas, ypač tose vietose, kurios yra veikiamos saulės šviesos, nes gali tekti nutraukti gydymą šiuo vaistu. Taip pat praneškite apie kitus šalutinius poveikius, tokius kaip sąnarių skausmas.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją prieš arba po šio vaisto vartojimo, jei pastebite bet kurį iš šių simptomų, kurie gali būti kitos, rimtesnės ligos požymis:

- neplanuotas svorio netekimas
- vėmimas, ypač pasikartojantis
- kraujo vėmimas; tai gali pasirodyti kaip tamsi kava jūsų vėmaluose
- pastebite kraują išmatose; jos gali būti juodos arba dervos išvaizdos
- rijimo sunkumai arba skausmas ryjant
- atrodo išblýškęs ir jaučiatės silpnas (anemija)
- krūtinės skausmas

- skrandžio skausmas
- sunkus ir/arba ilgalaikis viduriavimas, nes šis vaistas buvo susijęs su nedideliu viduriavimo padidėjimu, kurį sukelia infekcija
- buvo pranešimų apie sunkias odos reakcijas gydant pantoprazolu, įskaitant Stevens-Johnson sindromą, toksinę epidermio nekrolizę, vaistų reakciją su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (DRESS) ir daugiaformę eritemą. Nutraukite pantoprazolo vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pastebite simptomus, susijusius su šiomis sunkiomis odos reakcijomis, aprašytais 4 skyriuje.

Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad jums reikia atlikti keletą tyrimų, kad būtų atmesta piktybinė liga, nes šis vaistas taip pat palengvina vėžio simptomus; dėl to gali užtrukti diagnozės nustatymas. Jei jūsų simptomai išlieka nepaisant gydymo, bus svarstomi tolesni tyrimai.

Jei ilgą laiką (daugiau nei 1 metus) vartojate šį vaistą, jūsų gydytojas greičiausiai jus reguliariai stebės. Kiekvieną kartą, kai lankotės pas gydytoją, turite pranešti apie naujus ir neįprastus simptomus bei ypatybes.

Vaikai ir paaugliai

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams, nes veiksmingumas nebuvo įrodytas vaikams iki 12 metų.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate Pantoprazol Sandoz 40 mg kartu su kitais vaistais, ar neseniai vartojote, ar yra galimybė, kad artimiausiu metu vartosite kitus vaistus? Pasakykite tai savo gydytojui arba vaistininkui. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriems nereikia recepto.

Taip yra todėl, kad Pantoprazol Sandoz 40 mg gali paveikti kitų vaistų veikimą. Todėl pasakykite savo gydytojui, jei vartojate bet kurį iš toliau nurodytų vaistų:

- vaistai, tokie kaip ketokonazolas, itrakonazolas ir posakonazolas (naudojami grybelinėms infekcijoms gydyti) arba erlotinibas (naudojamas tam tikroms vėžio formoms gydyti), nes Pantoprazol Sandoz 40 mg gali lemti, kad šie ir kiti vaistai neveiktų tinkamai.
- varfarinas ir fenpropumonas, kurie veikia kraujo krešėjimą arba skystinimą. Gali prireikti papildomų kontrolinių tyrimų.
- vaistai, naudojami ŽIV infekcijai gydyti (tokie kaip atazanaviras).
- metotreksatas (naudojamas reumatoidiniam artritui, psoriazei ir vėžiui gydyti); jei vartojate metotreksatą, jūsų gydytojas gali laikinai nutraukti gydymą Pantoprazol Sandoz 40 mg, nes pantoprazolas gali padidinti metotreksato kiekį kraujyje.
- fluvoxaminas (naudojamas depresijai ar kitoms psichikos ligoms gydyti). Jei vartojate fluvoxaminą, jūsų gydytojas gali sumažinti dozę.
- rifampicinas (naudojamas infekcijoms gydyti).
- jonažolė (*Hypericum perforatum*) (naudojama lengvai depresijai gydyti).

Jei turite atlikti specifinį šlapimo tyrimą (dėl THC, tetrahidrokanabinolio), aptarkite tai su savo gydytoju prieš vartodami Pantoprazol Sandoz.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Nėra pakankamai duomenų apie šio vaisto vartojimą nėščioms moterims. Pranešta apie išsiskyrimą į motinos pieną.

Ar esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, planuojate pastoti ar žindote kūdikį? Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Šį vaistą galite vartoti tik tuo atveju, jei jūsų gydytojas mano, kad nauda jums yra didesnė už galimą riziką jūsų negimusiam vaikui ar kūdikiui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Šis vaistas neturi arba turi nereikšmingą poveikį gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Jei patiriate šalutinius poveikius, tokius kaip galvos svaigimas ir sutrikęs regėjimas, neturėtumėte vairuoti transporto priemonių ar valdyti mechanizmų.

Pantoprazol Sandoz sudėtyje yra dažiklio ir natrio.

Pantoprazol Sandoz 40 mg sudėtyje yra azo dažiklio Ponceau 4R aliuminio karmino (E124), kuris gali sukelti alergines reakcijas.

Šio vaisto sudėtyje yra mažiau nei 1 mmol natrio (23 mg) vienoje skrandžio sultims atsparioje tabletėje, tai reiškia, kad jis iš esmės yra „be natrio“.

### 3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Abejojate dėl teisingo vartojimo? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vartojimo būdas

Tabletes išgerkite 1 valandą prieš valgį, nekramtydami ir nelaužydami, užgerdami jas trupučiu vandens.

Rekomenduojama dozė yra:

Suaugusieji ir paaugliai nuo 12 metų:

Refliuksinio ezofagito gydymui:

Įprasta dozė yra viena tabletė per dieną. Jūsų gydytojas gali nurodyti vartoti 2 tabletes per dieną. Refliuksinio ezofagito gydymo trukmė paprastai yra nuo 4 iki 8 savaičių. Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turite vartoti vaistą.

Suaugusieji:

Helicobacter pylori bakterijos infekcijos gydymui pacientams, sergantiems dvylikapirštės žarnos ir skrandžio opomis, kartu su dviem antibiotikais (eradikacijos gydymas):

Viena tabletė du kartus per dieną, plius dvi antibiotikų tabletės: arba amoksicilinas, arba klaritromicinas, arba metronidazolas (arba trinidazolas), kurias turite vartoti du kartus per dieną kartu su pantoprazolo tablete. Pirmąją pantoprazolo tabletę išgerkite 1 valandą prieš pusryčius, o antrąją pantoprazolo tabletę 1 valandą prieš vakarienę. Laikykitės gydytojo nurodymų ir perskaitykite šių antibiotikų pakuotės lapelius. Įprasta gydymo trukmė yra 1-2 savaitės.

Skrandžio opų ir dvylikapirštės žarnos opų gydymui:

Įprasta dozė yra viena tabletė per dieną. Pasitarus su gydytoju, dozė gali būti padvigubinta. Jūsų gydytojas pasakys, kiek laiko turite tęsti vaisto vartojimą. Skrandžio opų gydymo trukmė paprastai yra nuo 4 iki 8 savaičių. Dvylikapirštės žarnos opų gydymo trukmė paprastai yra nuo 2 iki 4 savaičių.

Ilgalaikiam Zollinger-Ellison sindromo ir kitų būklių, kai gaminasi per daug skrandžio rūgšties, gydymui:

Rekomenduojama pradinė dozė paprastai yra dvi tabletės per dieną. Išgerkite dvi tabletes 1 valandą prieš valgį. Jūsų gydytojas gali vėliau koreguoti dozę, priklausomai nuo gaminamos skrandžio rūgšties kiekio. Jei paskirta daugiau nei dvi tabletės per dieną, išgerkite tabletes padalijus į dvi dozes.

Jei jūsų gydytojas paskiria daugiau nei keturias tabletes per dieną, jis arba ji tiksliai pasakys, kada turite nutraukti vaisto vartojimą.

Pacientai, turintys inkstų problemų

Jei turite inkstų problemų arba vidutinio sunkumo ar sunkių kepenų problemų, negalite vartoti šio vaisto Helicobacter pylori eradikacijai.

Pacientai, turintys kepenų problemų

Jei turite sunkių kepenų problemų, neturėtumėte vartoti daugiau nei 20 mg pantoprazolo per dieną (šiam tikslui yra 20 mg pantoprazolo tabletės). Jei turite vidutinio sunkumo ar sunkių kepenų problemų, negalite vartoti šio vaisto Helicobacter pylori eradikacijai.

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Šios tabletės nerekomenduojamos vaikams iki 12 metų.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Pasakykite tai savo gydytojui arba vaistininkui. Nėra žinomų perdozavimo simptomų.

Ar pamiršote pavartoti šį vaistą?

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę. Vartokite kitą, įprastą dozę įprastu laiku.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Nenustokite vartoti šių tablečių nepasitarę su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Susisiekite su savo gydytoju, vaistininku ar slaugytoju.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį. Ne visi jį patiria.

Jei pasireiškia vienas iš šių šalutinių poveikių, turite nutraukti šių tablečių vartojimą ir nedelsdami informuoti savo gydytoją arba kreiptis į artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių:

- Sunkios alerginės reakcijos (retai: pasireiškia mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų): liežuvio ir/ar gerklės patinimas, rijimo sunkumai, dilgėlinė, kvėpavimo sunkumai, veido patinimas (Quincke edema/angioedema), stiprus galvos svaigimas su labai greitu širdies plakimu ir gausiu prakaitavimu
- Sunkios odos ligos (dažnis nežinomas: negalima nustatyti pagal turimus duomenis): Galite patirti vieną ar daugiau iš šių simptomų:
  - o odos pūslėjimas ir greitas bendros sveikatos būklės pablogėjimas, paviršiniai pažeidimai (įskaitant lengvą kraujavimą) akių, nosies, burnos/lūpų ar lytinių organų srityje, arba odos jautrumas/bėrimas ypač tose vietose, kurias veikia šviesa/saulė. Taip pat galite jausti sąnarių skausmą ar gripo simptomus, karščiavimą, patinusius limfmazgius (pvz., pažastyje) ir kraujo tyrimai gali parodyti kai kurių baltųjų kraujo kūnelių ar kepenų fermentų pokyčius.
  - o rausvos, plokščios, žiedinės arba apvalios dėmės ant liemens, dažnai su pūslėmis centre, pleiskanojanti oda, opos burnoje, gerklėje, nosyje ir ant lytinių organų bei akių. Šis sunkus odos bėrimas gali būti prieš karščiavimą ir gripo simptomus (Stevens-Johnson sindromas, toksinė epidermio nekrolizė).
  - o plačiai paplitęs odos bėrimas, aukšta kūno temperatūra ir patinę limfmazgiai (DRESS sindromas arba vaistų sukeltas padidėjusio jautrumo sindromas) ir jautrumas šviesai.
- Kitos sunkios būklės (dažnis nežinomas): geltonas odos ar akių baltymų spalvos pasikeitimas (sunkus kepenų ląstelių pažeidimas, gelta) arba karščiavimas, odos bėrimas ir padidėję inkstai, kartais su skausmu šlapinantis ir nugaros skausmu (sunkus inkstų uždegimas), galintis sukelti inkstų nepakankamumą

Kitas šalutinis poveikis yra:

- Dažnai (gali pasireikšti 1 iš 10 vartotojų) gerybiniai polipai skrandyje
- Kartais (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 vartotojų) galvos skausmas; galvos svaigimas; viduriavimas; pykinimas, vėmimas; pilvo pūtimas ir dujų kaupimasis; vidurių užkietėjimas; burnos

džiūvimas; skausmas ir diskomfortas viršutinėje pilvo dalyje; niežtinčio odos bėrimo atsiradimas (bėrimas/egzantema/erupcijos); niežulys; silpnumo, išsekimo ar blogos savijautos jausmas; miego sutrikimai; klubo, riešo ar stuburo slankstelių lūžiai

- Retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų) skonio iškraipymas arba visiškas skonio praradimas; sutrikęs regėjimas, pvz., neryškus matymas; dilgėlinė; sąnarių skausmas; raumenų skausmai; svorio pokyčiai; padidėjusi kūno temperatūra; aukšta temperatūra; patinusios rankos ir/ar kojos (periferinė edema); alerginės reakcijos; depresija; vyrų krūtų padidėjimas
- Labai retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) dezorientacija
- Nežinoma (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis) haliucinacijos, sumišimas (ypač pacientams, kuriems anksčiau pasireiškė šie simptomai), dilgčiojimas, perštėjimas, tirpimas, odos bėrimas, galimas sąnarių skausmas; storosios žarnos uždegimas, sukeliantis nuolatinį vandeningą viduriavimą.

Šalutiniai poveikiai, nustatyti kraujo tyrimu:

- Kartais (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 100 vartotojų) kepenų fermentų padidėjimas.
- Retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 1000 vartotojų) bilirubino kiekio padidėjimas; padidėjęs riebalų kiekis kraujyje; stiprus cirkuliuojančių baltųjų kraujo kūnelių (granulocitų) sumažėjimas, lydimas aukštos temperatūros
- Labai retai (gali pasireikšti mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) trombocitų skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio galite kraujuoti daugiau nei įprastai arba dažniau atsiranda mėlynės; baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus sumažėjimas, dėl kurio gali dažniau pasireikšti infekcijos; vienu metu nenormalus raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių bei trombocitų skaičiaus sumažėjimas
- Nežinoma (dažnis negali būti nustatytas pagal turimus duomenis) mažesnis natrio, magnio, kalcio ar kalio kiekis kraujyje (žr. 2 skyrių).

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką ar slaugytoją. Tai taikoma ir šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl). Pranešdami apie šalutinį poveikį, padedate mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## 5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės po „EXP:“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Nenaudokite šio vaisto, jei praėjo 6 mėnesiai po pirmojo atidarymo.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Tinkamai pašalinus vaistus, jie bus tinkamai sunaikinti ir nepateks į aplinką.

## 6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

- Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra: pantoprazolas. Kiekvienoje skrandyje neiros tabletėje yra 40 mg pantoprazolo (kaip natrio seskvihidrato).

- Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra:

Tablečių šerdis: kalcio stearatas, mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska (A tipas), hidroksipropilceliuliozė (EXF tipas), bevandenis natrio karbonatas, bevandenis koloidinis silicio dioksidas.

Apvalkalas: hipromeliozė, geltonasis geležies oksidas (E172), makrogolis 400, metakrilato rūgšties-etilakrilato kopolimeras (1:1), polisorbatas 80, Ponceau 4R aliuminio karminas (E124), chinolino geltonasis aliuminio karminas (E104), natrio laurilsulfatas, titano dioksidas (E171), trietilcitratas.

Kaip atrodo Pantoprazol Sandoz 40 mg ir kas yra pakuotėje?

Skrandyje neiros tabletės

Pantoprazol Sandoz 40 mg, skrandyje neiros tabletės yra geltonos, ovalios tabletės (su specialiu sluoksniu), maždaug 11,7 x 6,0 mm ir yra prieinamos:

lizdinės plokštelės su 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1, 140, 168 tabletėmis

indeliai su 14, 28, 56, 98, 100, 105, 250 arba 500 tabletėmis.

Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra prekyboje.

Prekybos leidimo turėtojas ir gamintojas

Leidimo turėtojas:

Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Nyderlandai

Gamintojai:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

D39179 Barleben

Vokietija

Lek Spolka Akcyjna

Ul. Domaniewska 50 c

02-672 Varšuva

Lenkija

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova 57  
1526 Ljubljana  
Slovėnija

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Trimlini 2 D  
9220 Lendava  
Slovėnija

Sandoz S.R.L.  
Str. Livezeni nr. 7A  
540472 Targu-Mures  
Rumunija

Lek S.A.  
ul.Podlipie 16  
95-010 Strykow  
Lenkija

Įregistruota registre

Pantoprazol Sandoz 40 mg, skrandyje neirios tabletės - RVG 33658.

Šis vaistas yra registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje (Šiaurės Airijoje) šiais pavadinimais

Nyderlandai: Pantoprazol Sandoz 40 mg, skrandyje neirios tabletės

Austrija: Pantoprazol Sandoz 40 mg skrandyje neirus tabletes

Belgija: Pantoprazol 40 mg skrandyje neirus tabletes

Vokietija: Pantoprazol Sandoz 40 mg skrandyje neirus tabletes

Danija: Pantoprazol Sandoz

Graikija: Ozepran

Ispanija: Pantoprazol sandoz 40 mg skrandyje neirus tabletes EFG

Suomija: Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletės

Prancūzija: Pantoprazole Sandoz 40 mg, skrandyje neirus tabletės

Italija: PANTOPRAZOLO SANDOZ 40 mg skrandyje neirus tabletes

Norvegija: Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletės

Lenkija: IPP 40

Portugalija: Pantoprazol sandoz, skrandyje neirus tabletes 40 mg

Švedija: Pantoprazol Sandoz 40 mg enterotabletės

Slovėnija: ACIPAN 40 mg skrandyje neirus tabletes

Slovakija: Pantoprazol Sandoz 40 mg, skrandyje neirus tabletes

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija): Pantoprazole 40 mg skrandyje neirus tabletes

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2025 m. vasario mėn.

Transtoyou