

ULOTKA: INFORMACJE DLA PACJENTA

Pantoprazol Sandoz® 40 mg, tabletki dojelitowe
pantoprazol

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed zastosowaniem tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna w przyszłości.
- Masz pytania? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
- Nie przekazuj tego leku innym osobom, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Pantoprazol Sandoz 40 mg i w jakim celu się go stosuje?
2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Pantoprazol Sandoz 40 mg i w jakim celu się go stosuje?

Ten lek zawiera substancję czynną pantoprazol. Pantoprazol jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem zmniejszającym ilość kwasu produkowanego w żołądku. Stosuje się go w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nadkwaśnością.

Ten lek stosuje się w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych w przypadku:

- Refluksowe zapalenie przełyku: zapalenie przełyku (połączenie między gardłem a żołądkiem), które towarzyszy cofaniu się kwasu żołądkowego.

Ten lek stosuje się w leczeniu dorosłych w przypadku:

- Infekcja bakterią o nazwie *Helicobacter pylori* u pacjentów z wrzodami dwunastnicy i żołądka, w połączeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne). Celem jest wyeliminowanie bakterii i tym samym zmniejszenie ryzyka nawrotu tych wrzodów.
- Wrzody żołądka i wrzody dwunastnicy.
- Zespół Zollingera-Ellisona i inne schorzenia, w których produkowane jest zbyt dużo kwasu w żołądku.

2. Kiedy nie należy stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Kiedy nie należy stosować tego leku?

- Jesteś uczulony na pantoprazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6.
- Jesteś uczulony na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarzką przed zastosowaniem tego leku:

- jeśli masz poważne problemy z wątrobą. Jeśli kiedykolwiek miałeś problemy z wątrobą, powinieneś o tym powiedzieć swojemu lekarzowi. Lekarz będzie częściej kontrolować enzymy wątrobowe, zwłaszcza gdy stosujesz ten lek jako długotrwałe leczenie. W przypadku wzrostu poziomu enzymów wątrobowych leczenie należy przerwać.
- jeśli masz zmniejszone rezerwy organizmu lub czynniki ryzyka zmniejszonej ilości witaminy B12 i jesteś długotrwałe leczony pantoprazolem. Jak wszystkie leki zmniejszające kwasowość, pantoprazol może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz którykolwiek z poniższych objawów, ponieważ mogą one wskazywać na niedobór witaminy B12:

o skrajne zmęczenie lub brak energii

o uczucie mrowienia

o bolesny lub czerwony język, owrzodzenia jamy ustnej

o osłabienie mięśni

o zaburzenia widzenia

o problemy z pamięcią, dezorientacja, depresja

- jeśli stosujesz inhibitory proteazy HIV, takie jak atazanawir (do leczenia zakażenia HIV).

Skonsultuj się z lekarzem w celu uzyskania szczegółowych porad.

- przyjmowanie leków hamujących pompę protonową, takich jak pantoprazol, zwłaszcza przez okres dłuższy niż rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Powiedz lekarzowi, jeśli masz osteoporozę (zrzesotnienie kości) lub jeśli lekarz powiedział ci, że jesteś zagrożony osteoporozą (na przykład dlatego, że stosujesz sterydy).
- jeśli stosujesz ten lek dłużej niż trzy miesiące, możliwe jest, że poziom magnezu we krwi spadnie. Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy i przyspieszoną akcją serca. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, natychmiast powiedz o tym lekarzowi. Niskie poziomy magnezu mogą również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o regularnym wykonywaniu badań krwi w celu monitorowania poziomów.
- jeśli u Ciebie ma być przeprowadzone specyficzne badanie krwi (chromogranina A).
- jeśli kiedykolwiek miałeś reakcję skórą po leczeniu lekiem podobnym do tego, który hamuje produkcję kwasu żołądkowego.

Powiedz swojemu lekarzowi jak najszybciej, jeśli dostaniesz wysypki, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie światła słonecznego, ponieważ może być konieczne przerwanie leczenia tym lekiem. Pamiętaj również, aby zgłosić inne działania niepożądane, takie jak ból stawów.

Skonsultuj się z lekarzem natychmiast, przed lub po zażyciu tego leku, jeśli zauważysz którykolwiek z następujących objawów, które mogą być sygnałem innej, poważniejszej choroby:

- niezamierzona utrata masy ciała

- wymioty, zwłaszcza powtarzające się
- wymioty krwią; może to wyglądać jak ciemna kawa w twoich wymiocinach
- zauważasz krew w stolcu; może być czarny lub smolisty
- trudności w przełykaniu lub ból przy przełykaniu
- wyglądasz blado i czujesz się słabo (anemia)
- ból w klatce piersiowej
- ból brzucha
- ciężka i/lub uporczywa biegunka, ponieważ ten lek był związany z niewielkim wzrostem biegunki spowodowanej infekcją
- zgłoszono ciężkie reakcje skórne podczas leczenia pantoprazolem, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, reakcja na leki z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS) oraz rumień wielopostaciowy. Przerwij stosowanie pantoprazolu i natychmiast zasięgnij pomocy medycznej, jeśli zauważysz objawy związane z tymi ciężkimi reakcjami skórnymi opisanymi w punkcie 4.

Twój lekarz może zdecydować, że musisz przejść kilka badań, aby wykluczyć chorobę nowotworową, ponieważ ten lek również łagodzi objawy raka; może to opóźnić postawienie diagnozy. Jeśli twoje dolegliwości utrzymują się pomimo leczenia, zostaną rozważone dalsze badania.

Jeśli stosujesz ten lek długoterminowo (dłużej niż 1 rok), twój lekarz prawdopodobnie będzie cię regularnie kontrolować. Za każdym razem, gdy odwiedzasz lekarza, powinieneś zgłaszać nowe i wyjątkowe objawy oraz szczegóły.

Dzieci i młodzież

Ten lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ skuteczność nie została udowodniona u dzieci poniżej 12 roku życia.

Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz Pantoprazol Sandoz 40 mg, czy używałeś ich niedawno lub istnieje możliwość, że będziesz używać innych leków w najbliższej przyszłości? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie. Dotyczy to również leków, na które nie potrzebujesz recepty.

To dlatego, że Pantoprazol Sandoz 40 mg może wpływać na działanie innych leków. Dlatego poinformuj swojego lekarza, jeśli stosujesz którykolwiek z poniższych leków:

- leki takie jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w niektórych rodzajach raka), ponieważ Pantoprazol Sandoz 40 mg może powodować, że te i inne leki nie działają prawidłowo.
- warfaryna i fenpropakumon, które wpływają na krzepnięcie lub rozrzedzenie krwi. Może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych.
- leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV (takie jak atazanawir).

- metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka); jeśli stosujesz metotreksat, lekarz może tymczasowo przerwać leczenie Pantoprazolem Sandoz 40 mg, ponieważ pantoprazol może zwiększać ilość metotreksatu we krwi.
- fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji lub innych zaburzeń psychicznych). Jeśli stosujesz fluwoksaminę, lekarz może zmniejszyć dawkę.
- ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń).
- Dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji).

Jeśli musisz poddać się specyficznemu testowi moczu (na THC, tetrahydrokannabinol), omów to z lekarzem przed zażyciem Pantoprazolu Sandoz.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego leku u kobiet w ciąży. Zgłoszono wydzielanie do mleka matki.

Czy jesteś w ciąży, podejrzewasz, że jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Możesz stosować ten lek tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyść dla ciebie przewyższa potencjalne ryzyko dla twojego nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Ten lek nie ma lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jeśli doświadczasz działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, nie powinieneś prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pantoprazol Sandoz zawiera barwnik i sól.

Pantoprazol Sandoz 40 mg zawiera barwnik azowy Ponceau 4R aluminium karmin (E124), który może powodować reakcje alergiczne.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę dojelitową, co oznacza, że jest zasadniczo „wolny od sodu”.

3. Jak stosować ten lek?

Zawsze stosuj ten lek dokładnie tak, jak zalecił Ci lekarz lub farmaceuta. Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Przyjmuj tabletki 1 godzinę przed posiłkiem, nie rozgryzając ani nie łamiąc ich, i połykaj je w całości popijając wodą.

Zalecane dawkowanie to:

Dorośli i młodzież od 12 lat:

W leczeniu refluksowego zapalenia przełyku:

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletką dziennie. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek dziennie. Czas trwania leczenia refluksowego zapalenia przełyku wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Lekarz poinformuje Cię, jak długo należy stosować lek.

Dorośli:

W leczeniu zakażenia bakterią o nazwie *Helicobacter pylori* u pacjentów z wrzodami dwunastnicy i żołądka, w połączeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne):

Jedna tabletką dwa razy dziennie, plus dwie tabletki antybiotyku: amoksycylina, klarytromycyna lub metronidazol (lub tynidazol), które należy przyjmować dwa razy dziennie razem z tabletką pantoprazolu. Pierwszą tabletkę pantoprazolu przyjmij 1 godzinę przed śniadaniem, a drugą 1 godzinę przed kolacją. Przestrzegaj zaleceń lekarza i przeczytaj ulotki dołączone do tych antybiotyków. Zwykle czas trwania leczenia wynosi 1-2 tygodnie.

W leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy:

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletką dziennie. Po konsultacji z lekarzem dawka może zostać podwojona. Lekarz poinformuje Cię, jak długo należy kontynuować stosowanie leku. Czas trwania leczenia wrzodów żołądka wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Czas trwania leczenia wrzodów dwunastnicy wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

W długotrwałym leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów, w których produkowane jest zbyt dużo kwasu żołądkowego:

Zalecana dawka początkowa to zazwyczaj dwie tabletki dziennie. Przyjmuj dwie tabletki 1 godzinę przed posiłkiem. Lekarz może później dostosować dawkę w zależności od ilości produkowanego kwasu żołądkowego. Jeśli przepisano więcej niż dwie tabletki dziennie, przyjmuj je w dwóch dawkach.

Jeśli lekarz przepisze dawkę większą niż cztery tabletki dziennie, dokładnie poinformuje Cię, kiedy należy przerwać stosowanie leku.

Pacjenci z problemami nerek

Jeśli masz problemy z nerkami lub umiarkowane lub ciężkie problemy z wątrobą, nie powinieneś przyjmować tego leku w celu eradykacji *Helicobacter pylori*.

Pacjenci z problemami wątroby

Jeśli masz ciężkie problemy z wątrobą, nie powinieneś przyjmować więcej niż 20 mg pantoprazolu dziennie (w tym celu dostępne są tabletki z 20 mg pantoprazolu). Jeśli masz umiarkowane lub ciężkie problemy z wątrobą, nie powinieneś przyjmować tego leku w celu eradykacji *Helicobacter pylori*.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Te tabletki nie są zalecane dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Czy użyłeś za dużo tego leku?

Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie. Nie są znane objawy przedawkowania.

Czy zapomniałeś użyć tego leku?

Nie bierz podwójnej dawki, aby nadrobić zapomnianą dawkę. Weź następną, normalną dawkę o zwykłej porze.

Jeśli przestaniesz używać tego leku

Nie przerywaj stosowania tych tabletek bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane. Nie każdy ich doświadcza.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie tych tabletek i natychmiast powiadomić lekarza lub skontaktować się z pogotowiem ratunkowym najbliższego szpitala:

- Ciężkie reakcje alergiczne (częstość rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000 użytkowników): obrzęk języka i/lub gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka, trudności w oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quinckego/obrzęk naczynioruchowy), silne zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się
- Ciężkie choroby skóry (częstość nieznana: nie można określić na podstawie dostępnych danych): Możesz mieć jeden lub więcej z następujących objawów: o pęcherze na skórze i szybkie pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, powierzchowne uszkodzenia (w tym lekkie krwawienia) oczu, nosa, ust/warg lub narządów płciowych, lub wrażliwość skóry/wysypka zwłaszcza na skórze wystawionej na działanie światła/słońca. Możesz również odczuwać ból stawów lub objawy grypopodobne, gorączkę, powiększone węzły chłonne (np. w pachach) i badania krwi mogą wykazać zmiany w niektórych białych krwinkach lub enzymach wątrobowych.

o czerwone, płaskie, pierścieniowate lub okrągłe plamy na tułowie, często z pęcherzem w środku, łuszcząca się skóra, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie i na narządach płciowych oraz oczach. Ta ciężka wysypka skórna może być poprzedzona gorączką i objawami grypopodobnymi (zespół Stevens-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka).

o rozległa wysypka skórna, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości wywołany lekami) oraz nadwrażliwość na światło.

• Inne poważne schorzenia (częstość nieznana): żółtawe zabarwienie skóry lub białek oczu (poważne uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczką) lub gorączka, wysypka skórna i powiększone nerki, czasami z bólem przy oddawaniu moczu i bólem w dolnej części pleców (poważne zapalenie nerek), mogące prowadzić do niewydolności nerek

Inne działania niepożądane to:

- Często (mogą wystąpić u 1 na 10 użytkowników) łagodne polipy w żołądku
- Czasami (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 użytkowników) ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcia i gazy; zaparcia; suchość w ustach; ból i dyskomfort w górnej części brzucha; wysypka swędząca (wysypka/egzantem/erupcje); swędzenie; uczucie osłabienia, wyczerpania lub złego samopoczucia; problemy ze snem; złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa
- Rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 użytkowników) zniekształcenie lub całkowity brak smaku; zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie; pokrzywka; ból stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; wysoka gorączka; obrzęk rąk i/lub nóg (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja; ginekomastia u mężczyzn
- Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników) dezorientacja
- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) halucynacje, dezorientacja (szczególnie u pacjentów z historią tych objawów), mrowienie, uczucie kłucia, drętwienie, pieczenie lub brak czucia, wysypka skórna, możliwie z bólem stawów; zapalenie jelita grubego, które powoduje uporczywą wodnistą biegunkę.

Działania niepożądane wykrywane w badaniach krwi:

- Czasami (może wystąpić u mniej niż 1 na 100 użytkowników) wzrost poziomu enzymów wątrobowych.
- Rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 1000 użytkowników) wzrost poziomu bilirubiny; podwyższony poziom tłuszczów we krwi; znaczne zmniejszenie liczby krążących białych krwinek (granulocytów), któremu towarzyszy wysoka gorączka
- Bardzo rzadko (może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników) zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do częstszego krwawienia lub powstawania siniaków; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do częstszych infekcji; jednoczesne nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi
- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) zmniejszenie poziomu sodu, magnezu, wapnia lub potasu we krwi (patrz punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz

również zgłaszać działania niepożądane za pośrednictwem Holenderskiego Centrum Działań Niepożądanych Lareb, strona internetowa: www.lareb.nl. Zgłaszając działania niepożądane, pomagasz nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak przechowywać ten lek?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności znajduje się na pudełku po „EXP:”. Podana jest tam miesiąc i rok. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności.

Dla tego leku nie ma specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku, jeśli minęło 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania.

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza na śmieci. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Prawidłowe usuwanie leków zapewnia ich właściwe zniszczenie i zapobiega przedostawaniu się do środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje zawiera ten lek?

- Substancją czynną w tym leku jest: pantoprazol. Każda tabletki dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci seskwihydratu sodu).
- Inne substancje w tym leku to:
Rdzeń tabletki: stearynian wapnia, celuloza mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza (typ EXF), węglan sodu bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna.
Otoczka: hypromeloza, tlenek żelaza żółty (E172), makrogol 400, kopolimer kwasu metakrylowego i etylakrylanu (1:1), polisorb 80, Ponceau 4R karmin aluminiowy (E124), chinolina żółta karmin aluminiowy (E104), laurylosiarczan sodu, dwutlenek tytanu (E171), tri-etylocytrynian.

Jak wygląda Pantoprazol Sandoz 40 mg i co zawiera opakowanie?

Tabletki dojelitowe

Pantoprazol Sandoz 40 mg, tabletki dojelitowe są żółte, owalne (pokryte specjalną powłoką), około 11,7 x 6,0 mm i dostępne w:

blistry z 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 84, 90, 98, 100, 100x1, 140, 168 tabletek

słoiki z 14, 28, 56, 98, 100, 105, 250 lub 500 tabletkami.

Nie wszystkie wymienione wielkości opakowań są wprowadzane do obrotu.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent

Posiadacz pozwolenia:
Sandoz B.V., Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, Holandia

Producenci:
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke Allee 1
D39179 Barleben
Niemcy

Lek Spółka Akcyjna
Ul. Domaniewska 50 c
02-672 Warszawa
Polska

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Lublana
Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2 D
9220 Lendava
Słowenia

Sandoz S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A
540472 Targu-Mures
Rumunia

Lek S.A.
ul.Podlipie 16
95-010 Stryków
Polska

Zarejestrowany pod numerem

Pantoprazol Sandoz 40 mg, tabletki dojelitowe - RVG 33658.

Ten lek jest zarejestrowany w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Zjednoczonym Królestwie (Irlandia Północna) pod następującymi nazwami

Holandia: Pantoprazol Sandoz 40 mg, tabletki dojelitowe
Austria: Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletki dojelitowe
Belgia: Pantoprazol 40 mg tabletki dojelitowe
Niemcy: Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletki dojelitowe
Dania: Pantoprazol Sandoz

Grecja: Ozepran

Hiszpania: Pantoprazol sandoz 40 mg tabletki dojelitowe EFG

Finlandia: Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletki dojelitowe

Francja: Pantoprazole Sandoz 40 mg, tabletki dojelitowe

Włochy: PANTOPRAZOLO SANDOZ 40 mg tabletki dojelitowe

Norwegia: Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletki dojelitowe

Polska: IPP 40

Portugalia: Pantoprazol sandoz, tabletki dojelitowe 40 mg

Szwecja: Pantoprazol Sandoz 40 mg tabletki dojelitowe

Słowenia: ACIPAN 40 mg tabletki dojelitowe

Słowacja: Pantoprazol Sandoz 40 mg, tabletki dojelitowe

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna): Pantoprazole 40 mg tabletki dojelitowe

Ta ulotka została zatwierdzona po raz ostatni w lutym 2025 roku.