

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Proscar 5 mg, kaetud tabletid
finasteriid

Lugege hoolikalt kogu pakendi infoleht enne selle ravimi kasutamist, sest see sisaldab teie jaoks olulist teavet.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Proscar ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS ON PROSCAR JA MILLEKS SEDA RAVIMIT KASUTATAKSE?

See ravim sisaldab toimeainet finasteriidi. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse 5-alfa-reduktaasi inhibiitoriteks. Toimeaine seondub ensüümiga 5-alfa-reduktaas, mis pärsib aine moodustumist, mis mängib rolli eesnäärme suurenemisel. Selle pärssimise tulemusena takistatakse eesnäärme edasist suurenemist.

Pikaajalisel kasutamisel väheneb enamikul juhtudel suurenenud eesnäärme suurus. See ravim on mõeldud kasutamiseks ainult meestele.

Miks teie arst määras teile Proscari?

Finasteriid on spetsiifiline ensüümi inhibiitor, mida kasutatakse healoomulise eesnäärme suurenemise (benigne eesnäärme hüperplaasia, BPH) raviks meestel. Proscar vähendab suurenenud eesnääret ja leevendab kuseteede sümptomeid. See ravim vähendab äkilise urineerimisvõimetuse (äge uriinipeetus) ja operatsiooni vajaduse riski.

2. MILLAL EI TOHI SEDA RAVIMIT KASUTADA VÕI PEATE OLEMA SELLEGA ERITI ETTEVAATLIK?

Millal ei tohi seda ravimit kasutada?

Olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate selle infolehe jaotisest 6.

Naised ja lapsed ei tohi seda ravimit kasutada.

Seisund, mille jaoks Proscar on ette nähtud, esineb ainult meestel. Rasedad või võimalikud rasedad naised ei tohi puutuda katki läinud või purustatud tablette (vt jaotis 'Rasedus, imetamine ja viljakus').

Mida peate teadma enne ja Proscari kasutamise ajal
Kui teie seksuaalpartner on rase või võib olla rase, ei tohi te lasta tal kokku puutuda oma spermaga. See võib sisaldada väga väikest kogust ravimit.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?
Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Rinnavähk
Vt jaotis 4.

Mõju eesnäärme-spetsiifilisele antigeenile (PSA)
See ravim võib mõjutada vereanalüüsi tulemusi, mida nimetatakse PSA-ks (eesnäärme-spetsiifiline antigeen). Seda testi kasutatakse eesnäärmevähi uurimisel. Kui teete PSA-testi, rääkige oma arstile või apteekrile, et kasutate seda ravimit, kuna see ravim vähendab PSA kontsentratsiooni.

Mõju viljakusele
Viljatatus on teatatud meestel, kes on pikka aega kasutanud finasteriidi ja kellel olid ka muud riskitegurid, mis võivad viljakust mõjutada. Pärast finasteriidi kasutamise lõpetamist on teatatud, et seemnevedeliku kvaliteet paranes või muutus normaalseks. Pikaajalisi uuringuid finasteriidi mõju kohta meeste viljakusele ei ole tehtud.

Meeleolumuutused ja depressioon
Meeleolumuutused nagu depressiivne meeleolu, depressioon ja harvemini enesetapumõtted on teatatud patsientidel, keda raviti Proscariga. Võtke võimalikult kiiresti ühendust oma arstiga meditsiinilise nõu saamiseks, kui teil tekib mõni neist sümptomitest.

Lapsed
Seda ravimit ei tohi kasutada lastel. Puuduvad andmed, mis näitaksid finasteriidi efektiivsust või ohutust lastel.

Proscari kasutamist maksafunktsiooni häiretega patsientidel ei soovitata.

Laske oma arstil regulaarselt ravi mõju kontrollida.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?
Kui te kasutate lisaks Proscarile veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või kavatsete seda peagi teha, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Millele peaksite tähelepanu pöörama söögi ja joogi osas?
Proscari võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Proscar on mõeldud ainult healoomulise eesnäärme suurenemise raviks meestel. Meeste viljakuse mõju kohta vaadake ülaltoodud jaotist 'Mõju viljakusele'.

Rasedad või võimalik, et rasedad naised ei tohi seda ravimit kasutada. Nad ei tohi puutuda katki läinud või purustatud tablette. Kui selle ravimi toimeaine satub suu kaudu või naha kaudu raseda naise organismi, kes kannab poisslast, võib see põhjustada poisslapse suguelundite väärarenguid. Kui rase naine puutub kokku selle ravimi toimeainega, peab ta viivitamatult oma

arstiga ühendust võtma. Proscari tabletid on kaetud kaitsekihiga, et tavapärasel kasutamisel ei tekiks kokkupuudet toimeainega, kui tablette ei purustata ega katki tehta. Kui teil on veel küsimusi, võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine

Sõiduvõime ja masinate kasutamine
Proscar sisaldab laktoosi

Proscar sisaldab laktoosi
Proscar sisaldab naatriumi

Proscar sisaldab naatriumi
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. KUIDAS SEDA RAVIMIT KASUTADA?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Soovitav annus on 1 tablett päevas. Tabletti võib võtta koos toiduga või ilma. Teie arst ütleb teile, kui kaua peate Proscari kasutama.

Pidage meeles, et teie eesnäärme suurenemine, mis põhjustas need kaebused, võttis aastaid. Proscar toimib nende kaebuste ja teie seisundi vastu ainult siis, kui kasutate seda pikaajaliselt.

Teie arst võib määrata Proscari koos teise ravimiga, doksasosiiniga, et paremini kontrollida teie BPH-d.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?
Kui olete seda ravimit liiga palju võtnud, ei soovitata spetsiifilist ravi. Võtke nõu saamiseks ühendust oma arstiga.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?
Võtke Proscari vastavalt raviskeemile. Kui olete aga unustanud annuse võtta, ärge võtke kahekordset annust, et unustatud tabletti tasa teha. võtke järgmine tablett nagu tavaliselt.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Mitte kõigil ei esine neid. Järgmised kõrvaltoimed on teatatud Proscari kasutamisel.

Lõpetage selle ravimi kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil esineb mõni järgmistest sümptomitest (angioödeem): näo, keele või kurgu turse; neelamisraskused; nahalööve tugeva sügeluse ja punnidega (nõgestõbi, urtikaaria) ning hingamisraskused.

Kui märkate muutusi oma rinnakoes, nagu tükid, valu, rohkem rinnakudet või eritist nibust, peate sellest kohe oma arstile teatama, kuna need võivad olla tõsise seisundi, näiteks rinnavähi, tunnused.

Sageli (esineb vähem kui 1-l inimesel 10-st):
vähenenud seksuaalsoov
probleemid erektsiooni saamisega
seemnevedeliku hulga vähenemine.

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l 100-st kasutajast):
ejakulatsiooniprobleemid
nahalööve
paistes ja/või tundlikud rinnad.

Pole teada (sagedust ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata):
allergilised reaktsioonid nagu lööve ja sügelus
kiire südametegevus
depressioon
enesetapumõtted
erektsiooniprobleemid, mis püsisid pärast ravi lõpetamist
vähenenud seksuaaliha, mis püsis pärast ravi lõpetamist
valu munandites
veri spermas
meeste viljatuse ja/või halb seemnerakkude kvaliteet
kõrgenenud maksaensüümide väärtused
ärevus.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka Hollandi kõrvaltoimete keskuse Lareb kaudu, veebisait: www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatamine aitab meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. KUIDAS SEDA RAVIMIT SÄILITADA?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitada temperatuuril alla 30°C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikusaeg on märgitud pakendile sildil pärast "EXP:". Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need õigesti ja need ei satu keskkonda.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Millised ained on selles ravimis?

- Selle ravimi toimeaine on finasteriid. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg finasteriidi.
- Selle ravimi muud ained on laktoosmonohüdraat, eelgeelistatud tärklis, naatriumtärklisglükolaat, naatriumdokusaat, magneesiumstearaat (E572), talk(E553b), mikrokristalne tselluloos (E553b), mikrokristalne tselluloos Kuidas Proscar välja näeb ja mida pakend sisaldab?

Proscar õhukese polümeerikattega tabletid 5 mg on õunakuju, sinised, ühel küljel on pressitud kood 'MSD 72' ja teisel küljel 'Proscar'.

Pakend: karp kahe blisterpakendiga, milles on 14 tabletti.

Registrisse kantud all

RVG 128073//15482 Proscar 5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid (Poola)
Müügiloo hoidja ja tootja

Müügiloo hoidjageen tootja

Registreerija:

Euro Registratie Collectief b.v.

Kempkens 2200

5465 PR Veghel

Pakendaja (vt etikett välispakendil):

Brocef B.V., Maroastraat 43, 1060 LG Amsterdam

või

Stephar B.V., Kempkens 2200, 5465 PR Veghel

Tootja

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud oktoobris 2024.

BS001409 - mmjj / 110724-0724_DRNZ9E_B