

## Käyttöohje: Tietoa käyttäjälle

### RamiLich® 2,5 mg tabletit

### Ramipriili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytön, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.

- Säilytä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa muita, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin. Tämä koskee myös sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Katso kohta 4.

### Mitä tämä pakkausseloste sisältää

1. Mitä RamiLich on ja mihin sitä käytetään?
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat RamiLichia?
3. Miten RamiLichia otetaan?
4. Mitkä ovat mahdolliset haittavaikutukset?
5. Miten RamiLichia säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### 1. Mikä on RamiLich ja mihin sitä käytetään?

RamiLich sisältää vaikuttavana aineena ramipriilia. Tämä kuuluu ACE-estäjien (ACE = angiotensiiniä konvertoiva entsyymi) lääkeryhmään.

RamiLich vaikuttaa siten, että se

- vähentää elimistön tuottamien verenpainetta nostavien aineiden määrää,
- rentouttaa ja laajentaa verisuoniasi,
- helpottaa sydämen työtä pumpata verta kehon läpi.

RamiLichia käytetään

- korkean verenpaineen (hypertensio) hoitoon,
- vähentämään sydäninfarktin tai aivohalvauksen riskiä,
- vähentämään munuaisten toimintahäiriöiden riskiä tai hidastamaan niiden etenemistä (sekä diabeetikoilla että ei-diabeetikoilla),
- sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun sydän ei pumpaa riittävästi verta kehon läpi (sydämen vajaatoiminta),
- hoitoon sydäninfarktin (sydänkohtauksen) jälkeen, kun siihen liittyy sydämen vajaatoiminta.

### 2. Mitä sinun tulisi huomioida ennen RamiLichin ottamista?

RamiLichia ei saa ottaa,

- jos olet allerginen ramipriilille, jollekin muulle ACE-estäjälle tai jollekin tämän lääkkeen kohdassa 6 mainitulle muulle aineelle. Yliherkkyysoireiden merkkejä ovat ihottuma, nielemis- tai hengitysvaikeudet, huulten, kasvojen, kurkun tai kielen turvotus.

jos sinulla on aiemmin ollut vakava allerginen reaktio, niin sanottu angioedeema. Oireita ovat kutina, nokkosihottuma (urtikaria), punaiset läiskät käsissä, jaloissa ja kaulassa, kurkun ja kielen turvotus, silmien ja huulten ympärillä oleva turvotus, hengitys- ja nielemisvaikeudet.

- jos sinulla on aiemmin ollut vakava allerginen reaktio, niin sanottu angioedeema. Oireita ovat kutina, nokkosihottuma (urtikaria), punaiset läiskät käsissä, jaloissa ja kaulassa, kurkun ja kielen turvotus, silmien ja huulten turvotus, hengitys- ja nielemisvaikeudet.
- jos olet dialyysihoidossa tai muussa veripesussa, koska RamiLich ei välttämättä sovi sinulle käytetystä laitteesta riippuen.
- jos sinulla on munuaissairaus, jossa munuaisten verenkierto on rajoittunut (munuaisvaltimon ahtauma).
- raskauden viimeisten 6 kuukauden aikana (katso kohta "Raskaus ja imetys").
- jos sinulla on epätavallisen matala tai vaihteleva verenpaine. Tämä on lääkärisi arvioitava.
- jos sinulla on diabetes mellitus tai heikentynyt munuaistoiminta ja sinua hoidetaan verenpainelääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.

Et saa ottaa RamiLichia, jos jokin edellä mainituista kohdista koskee sinua. Jos olet epävarma, kysy lääkäriltäsi ennen RamiLichin ottamista.

#### Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärisi tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat RamiLichia,

- jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaissairaus.
- jos olet menettänyt suuria määriä kehon suoloja tai nesteitä (oksentelun, ripulin, poikkeuksellisen voimakkaan hikoilun, vähäsuolaisen ruokavalion, pitkäaikaisen diureettien [vesitablettien] käytön vuoksi tai jos olet dialyysipotilas).
- jos allergiaasi mehiläisen- tai ampiaisenpistoille on tarkoitus hoitaa (hyposensibilisaatio).
- jos sinulle on tarkoitus antaa nukutusaine leikkauksen tai hammaslääkärin yhteydessä. Saattaa olla tarpeen keskeyttää RamiLich-hoitosi päivää ennen; kysy lääkäriltäsi neuvoa.
- jos sinulla on korkea kaliumpitoisuus veressä (tulokset verikokeista).
- jos käytät lääkkeitä tai sinulla on sairauksia, jotka voivat alentaa veren natriumpitoisuutta; lääkärisi saattaa tehdä säännöllisiä verikokeita tarkistaakseen erityisesti natriumin pitoisuuden veressäsi, erityisesti jos olet iäkäs.
- jos käytät lääkkeitä, joita kutsutaan mTOR-estäjiksi (esim. temsirolimuusi, everolimuusi, sirolimuusi), vildagliptiiniä tai racekadotriilia, koska ne voivat lisätä angioedeeman (vakava allerginen reaktio) riskiä.
- jos sinulla on kollageenisairaus, kuten skleroderma tai systeeminen lupus erythematosus.
- Kerro lääkärillesi, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Ramipriilia ei suositella raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana ja se voi aiheuttaa vakavia vaurioita syntymättömälle lapsellesi kolmen kuukauden raskauden jälkeen (katso kohta "Raskaus ja imetys").
- jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä korkean verenpaineen hoitoon:
  - angiotensiini II -reseptorin salpaaja (näitä kutsutaan myös sartaneiksi – esim. valsartaani, telmisartaani, irbesartaani), erityisesti jos sinulla on munuaisongelmia diabeteksen vuoksi. - Aliskireeni.

Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineesi ja elektrolyyttiarvosasi (esim. kalium) veressäsi säännöllisin väliajoin.

Katso myös kohta "RamiLichia ei saa ottaa".

### Lapset ja nuoret

RamiLichin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska RamiLichin turvallisuutta ja tehoa lapsilla ei ole vielä osoitettu.

Jos jokin edellä mainituista kohdista koskee sinua (tai et ole varma), kysy lääkäriltäsi ennen RamiLichin ottamista.

RamiLichin ottaminen yhdessä muiden lääkkeiden kanssa

Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä, olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä tai aiot käyttää muita lääkkeitä. RamiLich voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, mutta myös sen oma teho voi muuttua muiden lääkkeiden vaikutuksesta.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska ne voivat heikentää RamiLichin tehoa:

- Kipua ja tulehdusta lievittävät lääkkeet (esim. ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet [NSAID] kuten ibuprofeeni, indometasiini ja asetyylisalisyylihappo),
- Lääkkeet matalan verenpaineen, sokin, sydämen vajaatoiminnan, astman tai allergioiden hoitoon, kuten efedriini, noradrenaliini tai adrenaliini. Lääkärisi on tarkistettava verenpaineesi.

Kerro lääkärillesi, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska RamiLichin samanaikainen käyttö lisää haittavaikutusten riskiä:

- Kipua ja tulehdusta lievittävät lääkkeet (esim. ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet [NSAID] kuten ibuprofeeni, indometasiini ja asetyylisalisyylihappo),
- Syöpälääkkeet (kemoterapia),
- Lääkkeet, joilla estetään siirretyn elimen hylkiminen, kuten siklosporiini,
- Diureetit (nesteenoitollääkkeet) kuten furosemidi,
- Lääkkeet, jotka voivat nostaa veren kaliumpitoisuutta, kuten spironolaktoni, triamtereeni, amiloridi, kaliumsuolat, trimetopriimi yksinään tai yhdessä sulfametoksatsolin kanssa (infektioita vastaan) ja hepariini (verenohennuslääke),
- steroidipitoiset lääkkeet tulehduksia vastaan, kuten prednisoloni,
- Allopurinoli (veren virtsahappopitoisuuden alentamiseen),
- Prokaiiniamidi (sydämen rytmihäiriöitä vastaan),
- Temsirolimus (syöpää vastaan),
- Sirolimuusi, everolimuusi (elinsiirtojen hylkimisen estämiseen),
- Vildagliptiini (tyypin 2 diabeteksen hoitoon),
- Racekadotriili (ripulin hoitoon).
- Lääkärisi saattaa joutua säättämään annostustasi ja/tai ryhtymään muihin varotoimiin, jos käytät angiotensiini II -reseptorin salpaajaa tai aliskireeniä (katso myös kohdat "RamiLichia ei saa käyttää" ja "Varoitukset ja varoimet").

Kerro lääkärillesi, jos käytät seuraavia lääkkeitä, koska RamiLich voi vaikuttaa niiden tehoon:

Diabeteslääkkeet, kuten suun kautta otettavat verensokeria alentavat lääkkeet ja insuliini. RamiLich voi alentaa verensokeritasoa. RamiLichin käytön aikana verensokeritasoa on siksi seurattava tarkasti.

- Litium (mielenterveyshäiriöihin). RamiLich voi nostaa veren litiumpitoisuutta. Lääkärisi on siksi seurattava litiumpitoisuuksia huolellisesti.

- Jos jokin edellä mainituista kohdista koskee sinua (tai et ole varma), kysy lääkäriltäsi ennen RamiLichin käyttöä.

RamiLichin käyttö yhdessä ruoan ja alkoholin kanssa

RamiLichin ottaminen ruoan ja alkoholin kanssa

- RamiLich voidaan ottaa aterioiden yhteydessä tai erikseen.
- Raskaus ja imetys

Raskaus

Raskaus

Kerro lääkärillesi, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi).

Et saa käyttää Ramiprilia raskauden ensimmäisten kahdentoista viikon aikana, etkä missään tapauksessa saa käyttää RamiLichia 13. raskausviikon jälkeen, koska RamiLichin käyttö tässä vaiheessa voi aiheuttaa vakavia vaurioita syntymättömälle lapsellesi.

Jos tulet raskaaksi Ramiprilin käytön aikana, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi. Vaihtoehdoisen hoidon harkitseminen, joka on paremmin siedetty, tulisi tehdä ennen suunniteltua raskautta.

Imetys

Et saa käyttää Ramiprilia, jos imetat.

Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajamiskyky ja koneiden käyttökyky

RamiLichin käytön aikana voi esiintyä huimausta. Todennäköisyys on suurin RamiLich-hoidon alussa tai annoksen suurentamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa et saa ajaa ajoneuvoa tai käyttää työkaluja tai koneita.

### 3. Miten RamiLichia käytetään?

Ota tätä lääkettä aina tarkasti lääkärisi ohjeiden mukaisesti. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkkeen annostus

Kohonneen verenpaineen hoito

- Tavallinen aloitusannos on 1,25 mg tai 2,5 mg kerran päivässä.
- Lääkärisi säätää annosta, kunnes verenpaineesi on hallinnassa.
- Suurin annos on 10 mg kerran päivässä.
- Jos käytät jo diureetteja (nesteenoistolääkkeitä), lääkärisi saattaa vähentää diureettien määrää ennen RamiLich-hoidon aloittamista tai lopettaa niiden käytön kokonaan.

Sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskin vähentäminen

- Tavallinen aloitusannos on 2,5 mg kerran päivässä.
- Lääkärisi voi päättää nostaa annosta.
- Tavallinen annos on 10 mg kerran päivässä.

## Hoito riskin vähentämiseksi tai etenemisen hidastamiseksi Munuaisten toimintahäiriöt

- Alkuannoksesi on joko 1,25 mg tai 2,5 mg kerran päivässä.
- Lääkärisi säätää annostasi.
- Tavallinen annos on 5 mg tai 10 mg kerran päivässä.

## Sydämen vajaatoiminnan hoito

- Tavallinen aloitusannos on 1,25 mg kerran päivässä.
- Lääkärisi säätää annostasi.
- Suurin annos on 10 mg päivässä. On suositeltavaa jakaa annos kahteen osaan päivässä.

## Hoito sydäninfarktin jälkeen

- Tavallinen aloitusannos on 1,25 mg kerran päivässä tai 2,5 mg kahdesti päivässä.
- Lääkärisi säätää annostasi.
- Tavallinen annos on 10 mg päivässä. On suositeltavaa jakaa annos kahteen osaan päivässä.

## lääkkäät potilaat

Lääkärisi aloittaa pienemmällä aloitusannoksella ja nostaa sitä hitaammin hoidon aikana.

## Lääkkeen ottaminen

- Ota lääke joka päivä aina samaan aikaan.
- Ota tabletit riittävän nesteen kanssa.
- Tabletteja ei saa murskata tai pureskella.

Jos olet ottanut enemmän RamiLichia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai mene lähimmän sairaalan ensiapuun. Älä aja itse sairaalaan. Pyydä toista henkilöä viemään sinut tai soita ambulanssi. Ota lääkepakkaus mukaasi, jotta hoitava lääkäri tietää, mitä olet ottanut.

Jos unohdat ottaa RamiLich-annoksen

- Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos seuraavana suunniteltuna ajankohtana.
- Älä ota kaksinkertaista annosta, jos unohdat edellisen annoksen.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

## 4. Mitkä ovat mahdolliset haittavaikutukset?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia, mutta ne eivät välttämättä ilmene kaikilla.

Lopeta RamiLichin käyttö välittömästi ja ota heti yhteyttä lääkäriisi, jos huomaat jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

- Kasvojen, huulten tai kurkun turvotus, joka vaikeuttaa nielemistä tai hengittämistä, sekä kutina ja ihottuma. Tämä voi olla merkki vakavasta yliherkkyysreaktiosta RamiLichille.

- Vakavat ihoreaktiot, mukaan lukien ihottuma, suun haavaumat (aftat), olemassa olevan ihosairauden paheneminen, punoitus, rakkulat tai ihon irtoaminen (kuten Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, erythema multiforme).

Ilmoita lääkärillesi välittömästi, jos ilmenee

- nopeutunut syke, epäsäännöllinen tai voimakas sydämenlyönti (sydämentykytys), rintakipu tai puristava tunne rinnassa tai vakavammat tapahtumat, kuten sydänkohtaus tai aivohalvaus,
- hengenahdistus tai yskä, jotka voivat olla merkkejä keuhkosairaudesta,
- helposti syntyvät mustelmat, verenvuodot, jotka kestävät normaalia pidempään, kaikki verenvuodon merkit (esim. ikenien verenvuoto), purppuranpunaiset läiskät iholla tai lisääntynyt infektioherkkyys, kurkkukipu ja kuume, väsymys, heikkouden tunne, huimaus tai kalpea iho, jotka voivat olla merkkejä veri- tai luuydinsairaudesta,
- voimakkaat vatsakivut, jotka voivat säteillä selkään ja olla merkkejä haimatulehduksesta (pankreatiitti),
- kuume, vilunväristykset, väsymys, ruokahaluttomuus, vatsakipu, pahoinvointi, ihon tai silmien keltaisuus (keltaisuus), jotka voivat olla merkkejä maksasairauksista, kuten hepatiitista (maksatulehdus) tai maksavaurioista.

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Ilmoita lääkärillesi, jos jokin luetelluista haittavaikutuksista vaikuttaa sinuun merkittävästi tai kestää yli muutaman päivän.

Yleinen (voi vaikuttaa enintään 1:een 10:stä hoidetusta)

- Päänsärky tai väsymys
- Huimaus. Todennäköisyys on suurempi hoidon alussa RamiLichillä tai annoksen suurentamisen yhteydessä.
- Pyörtyminen, hypotensio (epätavallisen matala verenpaine), erityisesti seistessä tai äkillisesti noustessa
- Kuiva ärsytysyskä, poskiontelotulehdus (sinuiitti) tai keuhkoputkentulehdus, hengenahdistus
- Vatsa- tai suolistokivut, ripuli, ruoansulatushäiriöt, pahoinvointi tai oksentelu
- Ihottuma, jossa on tai ei ole ihon kohoumia
- Rintakipu
- Lihaskrampit tai -kivut
- Kohonneet kaliumpitoisuudet veressä

Melko harvinainen (voi vaikuttaa enintään 1:een 100:sta hoidetusta)

- Tasapainohäiriöt (huimaus)
- Kutina ja epätavalliset ihotuntemukset kuten tunnottomuus, pistely, pistäminen, polttaminen tai kihelmöinti (parestesiat)
- Makuherkkyuden menetys tai muutos
- Univaikeudet
- Masentunut mieliala, ahdistus, epätavallinen hermostuneisuus tai levottomuus
- Tukkoinen nenä, hengitysvaikeudet tai astman paheneminen
- Suolen turvotus, niin sanottu suoliston angioedeema, johon liittyy oireita kuten vatsakipu, oksentelu ja ripuli
- Närästys, ummetus tai suun kuivuminen
- Lisääntynyt virtsaneritys (diureesi) päivän aikana

- Liiallinen hikoilu
- Ruokahaluttomuus tai -väheneminen (anoreksia)
- Lisääntynyt tai epäsäännöllinen sydämenlyönti
- Turvonneet käsivarret ja jalat, mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä kehoon
- Ihon punoitus ja kuumotuksen tunne
- Näön hämärtyminen
- Nivelkipu
- Kuume
- Seksuaaliset häiriöt miehillä, vähentynyt sukupuoli-vietti miehillä ja naisilla
- Eosinofilia (tiettyjen valkosolujen määrän lisääntyminen)
- Veriarvot, jotka viittaavat maksan, haiman tai munuaisten toimintahäiriöihin

Harvinainen (voi vaikuttaa enintään 1:een 1 000:sta hoidetusta)

- Tärinän tai sekavuuden tunne
- Punainen ja turvonnut kieli
- Vakava ihon hilseily tai irtoaminen, kutiseva, koholla oleva ihottuma
- Kynsiongelmat (esim. varpaankynnen tai sormenkynnen löystyminen tai irtoaminen)
- Ihottuma tai mustelma
- Ihon täplät ja kylmät raajat
- Punaiset, kutisevat, turvonneet tai vetistävät silmät
- Kuulohäiriöt tai korvien soiminen
- Heikkouden tunne
- Punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrän väheneminen tai liian alhainen hemoglobiiniarvo verikokeissa

Hyvin harvinainen (voi vaikuttaa enintään 1:een 10 000:sta hoidetusta)

- Lisääntynyt herkkyys auringonvalolle

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Ilmoittakaa lääkärillenne, jos jokin luetelluista haittavaikutuksista vaikuttaa teihin merkittävästi tai kestää yli muutaman päivän.

- Keskittymisvaikeudet
- Turvonnut suu
- Verikoe, jossa on liian vähän verisoluja
- Liian alhaiset natriumarvot veressä
- Väkevyöity virtsa (tumma väri), pahoinvointi tai oksentelu, lihaskrampit, sekavuus ja kohtaukset, jotka voivat johtua epäsopivasta ADH-erityksestä (antidiureettisen hormonin erityys). Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos nämä oireet ilmenevät.
- Sormien ja varpaiden värimuutokset kylmässä ja kihelmöinti tai kipu lämmitessä (Raynaud'n oireyhtymä)
- Rintojen suurentuminen miehillä
- Hidastunut tai heikentynyt reaktiokyky
- Polttava tunne
- Muuttunut hajuaisti
- Hiustenlähtö

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos havaitsette haittavaikutuksia, ottakaa yhteyttä lääkäriinne tai apteekkiin. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voitte myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan

Liittovaltion lääke- ja lääkinnällisten tuotteiden instituutti  
Osasto: Lääketurvatoiminta  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3  
D-53175 Bonn  
Verkkosivusto: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)

ilmoittaa. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa tarjoamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

## 5. Miten RamiLichia säilytetään?

Säilytä tämä lääke lasten ulottumattomissa.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa, läpipainopakkauksessa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä viittaa kuukauden viimeiseen päivään.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä hävitä lääkkeitä viemäriin. Kysy apteekista, miten lääke hävitetään, jos et enää käytä sitä. Näin autat suojelemaan ympäristöä.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä RamiLich 2,5 mg tabletit sisältävät

Vaikuttava aine on ramipriili.

1 tabletti sisältää 2,5 mg ramipriilia.

Muut aineet ovat:

Hypromelloosi

Esiliisteröity tärkkelys (maissitärkkelys)

Mikrokiteinen selluloosa

Natriumstearyylifumaraatti (Ph. Eur.)

Rauta(III)-hydroksidioksidi (E 172).

Miltä RamiLich 2,5 mg tabletit näyttävät ja pakkauksen sisältö

RamiLich 2,5 mg tabletit ovat kellertävän valkoisia tai keltaisia, pitkänomaisia tabletteja, joissa on jakouurre ja koko 8 x 4 mm. Yläpuolella on kaiverrus „2,5” ja yrityksen logo, alapuolella „HMR” ja „2,5”. Tabletti voidaan jakaa yhtä suuriin annoksiin.

RamiLich 2,5 mg tabletit ovat saatavilla pakkauksissa, joissa on 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99 ja 100 tablettia PVC/Alu-läpipainopakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä tuoda markkinoille.

Lääkevalmisteen myyntiluvan haltija  
Winthrop Arzneimittel GmbH  
65927 Frankfurt am Main

Yhteismyynti  
Zentiva Pharma GmbH  
65927 Frankfurt am Main  
Puhelin: (01 80) 2 02 00 10\*  
Telefaksi: (01 80) 2 02 00 11\*

Valmistaja S.C. Zentiva S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sektori 3,  
032266 Bukarest  
Romania

tai

Sanofi S.p.A.  
Strada Statale 17, km 22  
67019 Scoppito (L'Aquila)  
Italia

tai

Delpharm Dijon  
6 Boulevard de l'Europe  
21800 Quetigny  
Ranska

Tämä lääkevalmiste on hyväksytty Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa seuraavilla nimillä:

Saksa: RamiLich 2,5 mg tabletit  
Ranska: Ramipril Zentiva 2.5 mg tabletit  
Italia: Ramipril Zentiva 2.5 mg tabletit  
Romania: Zenra 2.5 mg tabletit  
Unkari: Ramipril Zentiva 2,5 mg tabletti

Tätä pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu helmikuussa 2017.

Reseptilääke.

Muita lääkevahvuuksia ovat saatavilla: RamiLich 5 mg tabletit, jotka sisältävät 5 mg ramipriilia, ja RamiLich 10 mg tabletit, jotka sisältävät 10 mg ramipriilia.

\*0,06 € / puhelu (Saksan lankaverkko); enintään 0,42 € / min (matkapuhelin).