

Vartojimo instrukcija: Informacija vartotojui

RamiLich® 2,5 mg tabletės

Ramiprilis

Prieš pradėdami vartoti šį vaistą, atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite pakuotės lapelį. Gali būti, kad vėliau norėsite jį perskaityti dar kartą.
- Jei turite daugiau klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas buvo skirtas tik jums. Nepasidalinkite juo su kitais. Tai gali pakenkti kitiems žmonėms, net jei jų simptomai yra tokie patys kaip jūsų.
- Jei pastebėjote šalutinį poveikį, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taikoma ir šalutiniam poveikiui, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje. Žr. 4 skyrių.

Kas yra šiame pakuotės lapelyje

1. Kas yra RamiLich ir kam jis vartojamas?
2. Ką turėtumėte žinoti prieš vartodami RamiLich?
3. Kaip vartoti RamiLich?
4. Koks galimas šalutinis poveikis?
5. Kaip laikyti RamiLich?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra RamiLich ir kam jis vartojamas?

RamiLich sudėtyje yra veiklioji medžiaga ramiprilis. Jis priklauso vaistų klasei, vadinamai AKF inhibitoriais (AKF = angiotenziną konvertuojantis fermentas).

RamiLich veikia,

- mažindamas organizmo gaminamų medžiagų, kurios didina kraujospūdį, kiekį,
- atpalaiduodamas ir išplėsdamas kraujagysles,
- palengvindamas širdies darbą pumpuojant kraują per kūną.

RamiLich vartojamas

- aukšto kraujospūdžio (hipertenzijos) gydymui,
- širdies priepuolio ar insulto rizikos mažinimui,
- inkstų funkcijos sutrikimų rizikos mažinimui arba jų progresavimo lėtėjimui (tiek diabetikams, tiek nediabetikams),
- širdies nepakankamumo gydymui, kai širdis nepumpuoja pakankamai kraujo per kūną (širdies nepakankamumas),
- gydymui po širdies priepuolio (miokardo infarkto) su širdies nepakankamumo komplikacija.

2. Ką turėtumėte žinoti prieš vartodami RamiLich?

RamiLich negalima vartoti,

- jei esate alergiškas ramipriliui, kitiems AKF inhibitoriams arba bet kuriai iš 6 skyriuje nurodytų kitų šio vaisto sudedamųjų dalių.

Padidėjusio jautrumo reakcijos požymiai yra odos bėrimas, rijimo ar kvėpavimo sunkumai, lūpų, veido, gerklės ar liežuvio patinimas.

- jei praeityje turėjote sunkią alerginę reakciją, vadinamą angioedema. Požymiai yra niežulys, dilgėlinė (urtikarija), raudonos dėmės ant rankų, kojų ir kaklo, gerklės ir liežuvio patinimas, patinimas aplink akis ir lūpas, kvėpavimo ir rijimo sunkumai.
- jei jums atliekama dializė ar kita kraujo valymo forma, nes RamiLich gali būti netinkamas priklausomai nuo naudojamo prietaiso.
- jei sergate inkstų liga, kai inkstų kraujotaka yra ribota (inkstų arterijų stenozė).
- per paskutinius 6 nėštumo mėnesius (žr. skyrių „Nėštumas ir žindymas“).
- jei turite neįprastai žemą ar svyruojantį kraujospūdį. Tai turi įvertinti jūsų gydytojas.
- jei sergate cukriniu diabetu arba turite sutrikusią inkstų funkciją ir esate gydomas kraujospūdį mažinančiu vaistu, kuriame yra aliskireno.

Jūs neturėtumėte vartoti RamiLich, jei kuris nors iš aukščiau paminėtų punktų jums tinka. Jei nesate tikri, prieš vartodami RamiLich pasitarkite su savo gydytoju.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prašome pasitarti su savo gydytoju ar vaistininku prieš vartodami RamiLich,

- jei sergate širdies, kepenų ar inkstų liga.
- jei praradote didelį kiekį kūno druskų ar skysčių (dėl vėmimo, viduriavimo, neįprastai stipraus prakaitavimo, mažai druskos turinčios dietos, ilgalaikio diuretikų [vandens tablečių] vartojimo arba jei esate dializės pacientas).
- jei jūsų alergija bičių ar vapsvų įgėlimams turi būti gydoma (hiposensibilizacija).
- jei jums turi būti skiriamas anestetikas operacijos metu arba pas odontologą. Gali prireikti nutraukti RamiLich vartojimą dieną prieš tai; pasitarkite su savo gydytoju.
- jei turite aukštą kalio kiekį kraujyje (tai matoma iš kraujo tyrimų).
- jei vartojate vaistus arba turite ligų, kurios gali sumažinti natrio kiekį kraujyje; jūsų gydytojas gali reguliariai atlikti kraujo tyrimus, kad patikrintų natrio koncentraciją kraujyje, ypač jei esate vyresnio amžiaus.
- jei vartojate vaistus, vadinamus mTOR inhibitoriais (pvz., temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptiną ar racekadotrilį, nes jie gali padidinti angioedemos (rimtos alerginės reakcijos) riziką.
- jei sergate kolagenoze, kaip sklerodermija ar sisteminė raudonąja vilklige.
- Praneškite savo gydytojui, jei įtariate, kad esate nėščia (arba galite pastoti). Ramiprilis nerekomenduojamas pirmuosius tris nėštumo mėnesius ir gali sukelti rimtą žalą jūsų negimusiam vaikui po trijų nėštumo mėnesių (žr. skyrių „Nėštumas ir žindymas“).
- jei vartojate vieną iš šių vaistų aukštam kraujospūdžiui gydyti:
 - angiotenzino II receptorių antagonistą (jie taip pat vadinami sartanai –
 - pvz., valsartanas, telmisartanas, irbesartanas), ypač jei turite inkstų problemų dėl cukrinio diabeto. - Aliskirenas.

Jūsų gydytojas gali reguliariai tikrinti jūsų inkstų funkciją, kraujospūdį ir elektrolitų kiekį (pvz., kalio) jūsų kraujyje.

Taip pat žiūrėkite skyrių „RamiLich negalima vartoti“.

Vaikai ir paaugliai

RamiLich vartojimas nerekomenduojamas vaikams ir paaugliams iki 18 metų, nes RamiLich saugumas ir veiksmingumas vaikams dar nebuvo įrodytas.

Jei kuris nors iš aukščiau paminėtų punktų jums tinka (arba nesate tikri), prieš vartodami RamiLich pasitarkite su savo gydytoju.

RamiLich vartojimas kartu su kitais vaistais

Informuokite savo gydytoją arba vaistininką, jei vartojate kitus vaistus, neseniai vartojote kitus vaistus arba ketinate vartoti kitus vaistus. RamiLich gali paveikti kitų vaistų veikimą, bet taip pat gali būti paveiktas kitų vaistų.

Informuokite savo gydytoją, jei vartojate šiuos vaistus, nes jie gali susilpninti RamiLich poveikį:

- Vaistai nuo skausmo ir uždegimo (pvz., nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo [NVNU] kaip ibuprofenas, indometacinas ir acetilsalicilo rūgštis),
- Vaistai žemam kraujospūdžiui, šokui, širdies nepakankamumui, astmai ar alergijoms gydyti, tokie kaip efedrinas, noradrenalinas ar adrenalinas. Jūsų gydytojas turi patikrinti jūsų kraujospūdį.

Informuokite savo gydytoją, jei vartojate šiuos vaistus, nes kartu vartojant RamiLich padidėja šalutinio poveikio rizika:

- Vaistai nuo skausmo ir uždegimo (pvz., nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo [NVNU] kaip ibuprofenas, indometacinas ir acetilsalicilo rūgštis),
- Vaistai nuo vėžio (chemoterapija),
- Vaistai, skirti užkirsti kelią transplantuoto organo atmetimui, tokie kaip ciklosporinas,
- Diuretikai (vandens tabletės) kaip furozemidas,
- Vaistai, kurie gali padidinti kalio kiekį kraujyje, tokie kaip spironolaktonas, triamterenas, amiloridas, kalio druskos, trimetoprimas vienas arba kartu su sulfametoksazolu (nuo infekcijų) ir heparinas (kraujo skiediklis),
- steroidiniai vaistai nuo uždegimo, tokie kaip prednizolonas,
- alopurinolis (šlapimo rūgšties kiekiui kraujyje mažinti),
- prokainamidas (nuo širdies ritmo sutrikimų),
- temsirolimuzas (nuo vėžio),
- sirolimuzas, everolimuzas (transplantuotų organų atmetimo prevencijai),
- vildagliptinas (2 tipo cukrinio diabeto gydymui),
- racekadotrilis (viduriavimo gydymui).
- Jūsų gydytojas gali prireikti koreguoti jūsų dozę ir/arba imtis kitų atsargumo priemonių, jei vartojate angiotenzino II receptorių antagonistą arba aliskireną (taip pat žr. skyrius „RamiLich negalima vartoti“ ir „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“).

Informuokite savo gydytoją, jei vartojate/naudojate bet kurį iš šių vaistų, nes jų poveikį gali paveikti RamiLich:

- vaistai nuo diabeto, tokie kaip geriamieji cukraus kiekį kraujyje mažinantys vaistai ir insulinas. RamiLich gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje. Todėl vartojant RamiLich reikia atidžiai stebėti cukraus kiekį kraujyje.
- liitis (nuo psichikos sutrikimų). RamiLich gali padidinti ličio kiekį kraujyje. Todėl jūsų gydytojas turi atidžiai stebėti ličio kiekį.

Jeigu kuris nors iš aukščiau paminėtų punktų jums tinka (arba nesate tikri), prieš vartodami RamiLich pasitarkite su savo gydytoju.

RamiLich vartojimas kartu su maistu ir alkoholiu

- Alkoholio vartojimas vartojant RamiLich gali sukelti galvos svaigimą ir apsvaigimą. Jei nesate tikri dėl alkoholio kiekio, kurį galite vartoti vartodami RamiLich, pasitarkite su

savo gydytoju, nes kraujospūdį mažinantys vaistai ir alkoholis gali sustiprinti vienas kito poveikį.

- RamiLich galima vartoti su maistu arba nepriklausomai nuo jo.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Praneškite savo gydytojui, jei įtariate, kad esate nėščia (arba galite pastoti).

Ramipril neturėtumėte vartoti pirmąsias dvylika nėštumo savaitių ir jokia būdu negalite vartoti RamiLich po 13-osios nėštumo savaitės, nes šio vaisto vartojimas šiame etape gali sukelti rimtą žalą jūsų negimusiam vaikui.

Jei vartodama Ramipril pastojote, nedelsdama informuokite savo gydytoją. Prieš planuojant nėštumą reikėtų apsvarstyti galimybę pereiti prie geriau toleruojamos gydymo alternatyvos.

Žindymo laikotarpis

Ramipril neturėtumėte vartoti, jei maitinate krūtimi.

Prieš vartodami bet kokį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Gebėjimas vairuoti ir valdyti mechanizmus

Vartojant RamiLich gali atsirasti galvos svaigimas. Tikimybė yra didžiausia gydymo RamiLich pradžioje arba padidinus dozę. Tokiu atveju negalite vairuoti transporto priemonių ir valdyti įrankių ar mechanizmų.

3. Kaip vartoti RamiLich?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Jei nesate tikri, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Vaisto dozė

Hipertenzijos gydymas

- Įprastinė pradinė dozė yra 1,25 mg arba 2,5 mg kartą per parą.
- Jūsų gydytojas pritaikys dozę, kol jūsų kraujospūdis bus kontroliuojamas.
- Didžiausia dozė yra 10 mg kartą per parą.
- Jei jau vartojate diuretikų (vandens tablečių), jūsų gydytojas gali sumažinti diuretikų kiekį prieš pradėdamas gydymą RamiLich arba visiškai nutraukti jų vartojimą.

Rizikos sumažinimas patirti širdies smūgį ar insultą

- Įprastinė pradinė dozė yra 2,5 mg kartą per parą.
- Jūsų gydytojas gali nuspręsti padidinti dozę.
- Įprastinė dozė yra 10 mg kartą per parą.

Gydymas siekiant sumažinti riziką arba sulėtinti inkstų funkcijos sutrikimų progresavimą Inkstų funkcijos sutrikimai

- Jūsų pradinė dozė yra arba 1,25 mg, arba 2,5 mg kartą per dieną.
- Jūsų gydytojas koreguos jūsų dozę.
- Įprasta dozė yra 5 mg arba 10 mg kartą per dieną.

Širdies nepakankamumo gydymas

- Įprasta pradinė dozė yra 1,25 mg kartą per dieną.
- Jūsų gydytojas koreguos jūsų dozę.
- Didžiausia dozė yra 10 mg per dieną. Rekomenduojama dozę padalyti į dvi dalis per dieną.

Gydymas po širdies smūgio

- Įprasta pradinė dozė yra 1,25 mg kartą per dieną iki 2,5 mg du kartus per dieną.
- Jūsų gydytojas koreguos jūsų dozę.
- Įprasta dozė yra 10 mg per dieną. Rekomenduojama dozę padalyti į dvi dalis per dieną.

Vyresni pacientai

Jūsų gydytojas pradės nuo mažesnės pradinės dozės ir lėtai ją didins gydymo metu.

Vaisto vartojimas

- Vartokite vaistą kasdien tuo pačiu paros metu.
- Tabletes vartokite su pakankamu kiekiu skysčio.
- Tablečių negalima smulkinti ar kramtyti.

Jei vartojote daugiau RamiLich, nei turėtumėte Nedelsdami informuokite savo gydytoją arba kreipkitės į artimiausios ligoninės priėmimo skyrių. Jūs neturėtumėte patys važiuoti į ligoninę. Paprašykite kito asmens arba iškvieskite greitąją pagalbą. Pasiimkite vaisto pakuotę, kad gydantis gydytojas žinotų, ką vartojote.

Jei pamiršote išgerti RamiLich

- Jei pamiršote išgerti dozę, kitą dozę išgerkite kitą numatytą laiką.
- Nevartokite dvigubos dozės, jei pamiršote išgerti ankstesnę dozę.

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Kokios galimos šalutinės reakcijos?

Kaip ir visi vaistai, šis vaistas gali sukelti šalutinių reakcijų, tačiau jos nepasireiškia visiems.

Nedelsdami nutraukite RamiLich vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją, jei pastebėsite bet kurią iš šių sunkių šalutinių reakcijų – jums gali prireikti skubios medicininės pagalbos:

- Veido, lūpų ar gerklės patinimas, kuris apsunkina rijimą ar kvėpavimą, taip pat niežulys ir odos bėrimai. Tai gali būti sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos į RamiLich požymiai.
- Sunkios odos reakcijos, įskaitant odos bėrimą, opas burnoje (aftos), esamos odos ligos pablogėjimą, paraudimą, pūslių susidarymą ar odos atsiskyrimą (pvz., Stevenso-Džonsono sindromas, toksinė epidermio nekrolizė, daugiaformė eritema).

Nedelsdami informuokite savo gydytoją, jei pasireiškia

- pagreitėjęs širdies ritmas, nereguliarus ar stiprus širdies plakimas (palpitacijos), skausmas ar spaudimas krūtinėje arba rimtesni įvykiai, tokie kaip širdies priepuolis ar insultas,
- dusulys ar kosulys, kurie gali būti plaučių ligos požymiai,
- lengviau atsirandantys kraujosruvos, kraujavimas, kuris trunka ilgiau nei įprasta, bet kokie kraujavimo požymiai (pvz., dantenų kraujavimas), purpurinės dėmės ant odos arba padidėjęs jautrumas infekcijoms, gerklės skausmas ir karščiavimas, nuovargis, silpnumas, galvos svaigimas ar blyški oda, kurie gali būti kraujo ar kaulų čiulpų ligos požymiai,
- stiprus pilvo skausmas, kuris gali plisti į nugarą ir gali būti kasos uždegimo (pankreatito) požymis,
- karščiavimas, šaltkrėtis, nuovargis, apetito praradimas, pilvo skausmas, negalavimas, odos ar akių pageltimas (gelta), kurie gali būti kepenų ligų, tokių kaip hepatitas (kepenų uždegimas) ar kepenų pažeidimas, požymiai.

Kitos galimos šalutinės reakcijos

Informuokite savo gydytoją, jei kuri nors iš išvardytų šalutinių reakcijų jus labai paveikia arba trunka ilgiau nei kelias dienas.

Dažnas (gali pasireikšti iki 1 iš 10 gydytų asmenų)

- Galvos skausmas arba nuovargis
- Galvos svaigimas. Tikimybė didesnė gydymo RamiLich pradžioje arba padidinus dozę.
- Alpulys, hipotenzija (nejprastai žemas kraujospūdis), ypač stovint ar staiga atsistojus
- Sausas dirginantis kosulys, sinusitas arba bronchitas, dusulys
- Skrandžio ar žarnyno skausmas, viduriavimas, virškinimo sutrikimai, bloga savijauta arba vėmimas
- Odos bėrimas su ar be odos iškilimų
- Krūtinės skausmas
- Raumenų spazmai arba skausmai
- Padidėjęs kalio kiekis kraujyje

Kartais (gali pasireikšti iki 1 iš 100 gydytų asmenų)

- Pusiausvyros sutrikimai (vertigo)
- Niežulys ir nejprasti odos pojūčiai, tokie kaip tirpimas, dilgčiojimas, dygčiojimas, deginimas ar skruzdžių bėgimas (parestezijos)
- Skonio pojūčio praradimas arba pasikeitimas
- Miego sutrikimai
- Depresinė nuotaika, nerimas, nejprastas nervingumas arba neramumas
- Užsikimšusi nosis, kvėpavimo sunkumai arba astmos pablogėjimas
- Žarnyno patinimas, vadinamasis žarnyno angioedema, su simptomais, tokiais kaip pilvo skausmas, vėmimas ir viduriavimas
- Rėmuo, vidurių užkietėjimas arba burnos džiūvimas
- Padidėjęs šlapimo išsiskyrimas (diurezė) dienos metu
- Pernelyg didelis prakaitavimas
- Apetito praradimas arba sumažėjimas (anoreksija)
- Padidėjęs arba nereguliarus širdies plakimas
- Patinę rankos ir kojos, galimi kūno skysčių kaupimosi požymiai
- Odos paraudimas su karščio pojūčiu
- Neryškus matymas

- Sąnarių skausmas
- Karščiavimas
- Lytinės funkcijos sutrikimai vyrams, sumažėjęs lytinis potraukis vyrams ir moterims
- Tam tikrų baltųjų kraujo kūnelių skaičiaus padidėjimas (eozinofilija)
- Kraujo rodikliai, rodantys kepenų, kasos ar inkstų funkcijos sutrikimus

Retai (gali paveikti iki 1 iš 1 000 gydytų)

- Drebulio ar sumišimo jausmas
- Raudonas ir patinęs liežuvis
- Sunkus odos lupimasis ar atsiskyrimas, niežtinčios, iškilęs bėrimas
- Nagų problemos (pvz., pėdos ar rankos nago atsipalaidavimas ar atsiskyrimas)
- Odos bėrimas ar mėlynės
- Dėmės ant odos ir šaltos galūnės
- Raudonos, niežtinčios, patinusios ar ašarojančios akys
- Klausos sutrikimai ar ausų skambėjimas
- Silpnumo jausmas
- Raudonųjų kraujo kūnelių, baltųjų kraujo kūnelių ar trombocitų skaičiaus sumažėjimas arba per mažas hemoglobino kiekis kraujo tyrimuose

Labai retai (gali pasireikšti iki 1 iš 10 000 gydytų pacientų)

- Padidėjęs jautrumas saulei

Kitos galimos šalutinės reakcijos

Informuokite savo gydytoją, jei kuri nors iš išvardytų šalutinių reakcijų jus labai paveikia arba trunka ilgiau nei kelias dienas.

- Sutrikusi koncentracija
- Patinusi burna
- Kraujo tyrimas su per mažai kraujo ląstelių
- Per mažas natrio kiekis kraujyje
- Koncentruotas šlapimas (tamsi spalva), pykinimas ar vėmimas, raumenų spazmai, sumišimas ir traukuliai, kurie gali būti dėl netinkamos ADH sekrecijos (antidiuretinio hormono sekrecijos). Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pasireiškia šie simptomai.
- Pirštų ir kojų pirštų spalvos pasikeitimas, kai jums šalta, ir dilgčiojimas ar skausmas, kai sušylate (Raynaud sindromas)
- Krūtų padidėjimas vyrams
- Sulėtėjęs arba pablogėjęs reakcijos laikas
- Degimo pojūtis
- Pakitęs kvapo suvokimas
- Plaukų slinkimas

Šalutinių reakcijų pranešimas

Jei pastebėjote šalutinių reakcijų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma šalutinėms reakcijoms, kurios nėra nurodytos šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutines reakcijas

Federalinis vaistų ir medicinos produktų institutas

Farmakovigilancijos skyrius

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Svetainė: www.bfarm.de

pranešti. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite prisidėti prie to, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti RamiLich?

Laikykite šį vaistą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šio vaisto negalima vartoti pasibaigus ant dėžutės, lizdinės plokštelės ir buteliuko nurodytam tinkamumo laikui „Tinka iki“. Tinkamumo laikas nurodo paskutinę nurodyto mėnesio dieną.

Šiam vaistui nereikia specialių laikymo sąlygų.

Vaistų neišmeskite į nuotekas. Paklauskite savo vaistininko, kaip išmesti vaistą, jei jo nebevartojate. Taip prisidėsite prie aplinkos apsaugos.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kas yra RamiLich 2,5 mg tabletėse

Veiklioji medžiaga yra ramiprilis.

1 tabletėje yra 2,5 mg ramiprilio.

Kiti komponentai yra:

Hipromeliozė

Iš anksto želatinizuotas krakmolos (kukurūzų krakmolos)

Mikrokristalinė celiuliozė

Natrio stearilfumaratas (Ph. Eur.)

Geležies(III) hidroksido oksidas (E 172).

Kaip atrodo RamiLich 2,5 mg tabletės ir pakuotės turinys

RamiLich 2,5 mg tabletės yra gelsvai baltos iki geltonos, pailgos tabletės su laužimo linija ir 8 x 4 mm dydžio. Viršutinėje pusėje yra įspaudas „2,5“ ir įmonės logotipas, apatinėje pusėje „HMR“ ir „2,5“. Tablečių galima padalyti į lygias dozes.

RamiLich 2,5 mg tabletės yra tiekiamos pakuotėse po 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99 ir 100 tablečių PVC/Alu lizdinėse plokštelėse.

Gali būti, kad ne visos pakuotės dydžiai bus pateikti į rinką.

Farmacinis verslininkas

Winthrop Arzneimittel GmbH

65927 Frankfurtas prie Maino

Bendras platinimas

Zentiva Pharma GmbH

65927 Frankfurtas prie Maino

Telefonas: (01 80) 2 02 00 10*

Telefaksas: (01 80) 2 02 00 11*

Gamintojas S.C. Zentiva S.A.
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sektorius 3,
032266 Bukareštas
Rumunija

arba

Sanofi S.p.A.
Strada Statale 17, km 22
67019 Scoppito (L'Aquila)
Italija

arba

Delpharm Dijon
6 Boulevard de l'Europe
21800 Quetigny
Prancūzija

Šis vaistas yra registruotas Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse narėse šiais pavadinimais:

Vokietija: RamiLich 2,5 mg tabletės
Prancūzija: Ramipril Zentiva 2.5 mg tabletės
Italija: Ramipril Zentiva 2.5 mg tabletės
Rumunija: Zenra 2.5 mg tabletės
Vengrija: Ramipril Zentiva 2,5 mg tabletė

Ši pakuotės lapelio peržiūra buvo atlikta 2017 m. vasario mėn.

Receptinis vaistas.

Taip pat yra RamiLich 5 mg tabletės su 5 mg ramiprilio ir RamiLich 10 mg tabletės su 10 mg ramiprilio.

*0,06 € / skambutis (vokiečių fiksuotas tinklas); maks. 0,42 € / min (mobilusis ryšys).