

Ulotka dołączona do opakowania: Informacje dla użytkownika

RamiLich® 2,5 mg tabletki

Ramipril

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna do ponownego przeczytania.
- W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Ten lek został przepisany wyłącznie Tobie. Nie przekazuj go innym osobom. Może zaszkodzić innym, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Patrz punkt 4.

Co zawiera ta ulotka

1. Co to jest RamiLich i w jakim celu się go stosuje?
2. Na co należy zwrócić uwagę przed przyjęciem leku RamiLich?
3. Jak przyjmować RamiLich?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać RamiLich?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest RamiLich i w jakim celu się go stosuje?

RamiLich zawiera substancję czynną ramipryl. Należy ona do klasy inhibitorów ACE (ACE = enzym konwertujący angiotensynę).

RamiLich działa poprzez

- zmniejszenie produkcji substancji w organizmie, które podnoszą ciśnienie krwi,
- rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych,
- ułatwienie sercu pompowania krwi przez organizm.

RamiLich stosuje się do

- leczenia nadciśnienia tętniczego (hipertensji),
- zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu,
- zmniejszenia ryzyka lub spowolnienia postępu zaburzeń czynności nerek (zarówno u diabetyków, jak i u osób bez cukrzycy),
- leczenia niewydolności serca, gdy serce nie pompuje wystarczającej ilości krwi przez organizm (niewydolność serca),
- leczenia po zawale serca (zawał mięśnia sercowego) z powikłaniem niewydolności serca.

2. Co należy wiedzieć przed przyjęciem RamiLich?

RamiLich nie może być przyjmowany,

- jeśli jesteś uczulony na ramipryl, inny inhibitor ACE lub którykolwiek z wymienionych w punkcie 6. innych składników tego leku.

Objawy reakcji nadwrażliwości obejmują wysypkę, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

- jeśli w przeszłości wystąpiła u Ciebie ciężka reakcja alergiczna, tzw. obrzęk naczynioruchowy. Objawy obejmują swędzenie, pokrzywkę (urtikaria), czerwone plamy na dłoniach, stopach i szyi, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu.
- jeśli poddajesz się dializie lub innej formie oczyszczania krwi, ponieważ RamiLich może nie być odpowiedni dla Ciebie w zależności od używanego urządzenia.
- jeśli cierpisz na chorobę nerek, w której dopływ krwi do nerki jest ograniczony (zwężenie tętnicy nerkowej).
- w ciągu ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
- jeśli masz niezwykle niskie lub zmienne ciśnienie krwi. To oceni Twój lekarz.
- jeśli masz cukrzycę lub zaburzoną funkcję nerek i jesteś leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

Nie wolno Ci przyjmować RamiLich, jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj swojego lekarza przed przyjęciem RamiLich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem RamiLich,

- jeśli masz chorobę serca, wątroby lub nerek.
- jeśli straciłeś duże ilości soli lub płynów z organizmu (przez wymioty, biegunkę, wyjątkowo intensywne pocenie się, dietę ubogą w sól, długotrwałe przyjmowanie diuretyków [tabletek moczopędnych] lub jeśli jesteś pacjentem dializowanym).
- jeśli Twoja alergia na użądlenia pszczoł lub os ma być leczona (odczulanie).
- jeśli masz otrzymać środek znieczulający w związku z operacją lub u dentysty. Może być konieczne przerwanie leczenia RamiLich na dzień przed; zapytaj swojego lekarza o radę.
- jeśli masz wysoki poziom potasu we krwi (wynika to z wyników badań krwi).
- jeśli przyjmujesz leki lub masz choroby, które mogą obniżyć poziom sodu we krwi; Twój lekarz może przeprowadzać regularne badania krwi, aby sprawdzić stężenie sodu we krwi, zwłaszcza jeśli jesteś starszy.
- jeśli stosujesz leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus), wildagliptynę lub racekadotryl, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (poważna reakcja alergiczna).
- jeśli cierpisz na kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.
- Poinformuj swojego lekarza, jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży (lub możesz zajść w ciążę). Ramipril nie jest zalecany w pierwszych trzech miesiącach ciąży i może prowadzić do poważnych uszkodzeń Twojego nienarodzonego dziecka po trzech miesiącach ciąży (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).
- jeśli przyjmujesz którykolwiek z następujących leków do leczenia wysokiego ciśnienia krwi:
 - antagonistę receptora angiotensyny II (są one również nazywane sartanami –
 - np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli masz problemy z nerkami z powodu cukrzycy. - Aliskiren.

Twój lekarz będzie regularnie sprawdzał funkcję nerek, ciśnienie krwi i poziomy elektrolitów (np. potasu) we krwi.

Zobacz także punkt „RamiLich nie powinien być przyjmowany”.

Dzieci i młodzież

Stosowanie RamiLich nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność RamiLich u dzieci nie zostały jeszcze potwierdzone.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie (lub nie jesteś pewien), przed przyjęciem RamiLich skonsultuj się z lekarzem.

Przyjmowanie RamiLich z innymi lekami

Poinformuj lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmujesz/stosujesz inne leki, niedawno przyjmowałeś/stosowałeś inne leki lub zamierzasz przyjmować/stosować inne leki. RamiLich może wpływać na działanie innych leków, ale także sam może być pod wpływem działania innych leków.

Poinformuj lekarza, jeśli przyjmujesz/stosujesz którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one osłabiać działanie RamiLich:

- Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen, indometacyna i kwas acetylosalicylowy),
- Leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia krwi, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Twój lekarz musi sprawdzić ciśnienie krwi.

Poinformuj lekarza, jeśli przyjmujesz/stosujesz którykolwiek z następujących leków, ponieważ jednoczesne przyjmowanie RamiLich zwiększa ryzyko działań niepożądanych:

- Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen, indometacyna i kwas acetylosalicylowy),
- Leki przeciwnowotworowe (chemioterapia),
- Leki zapobiegające odrzuceniu przeszczepionego organu, takie jak cyklosporyna,
- Diuretyki (tabletki moczopędne) takie jak furosemid,
- Leki, które mogą zwiększać poziom potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amilorid, sole potasu, trimetoprim sam lub w połączeniu z sulfametoksazolem (przeciw infekcjom) i heparyna (rozrzedzająca krew),
- leki zawierające sterydy przeciwzapalne, takie jak prednizolon,
- allopuryinol (w celu obniżenia poziomu kwasu moczowego we krwi),
- prokainamid (przeciw zaburzeniom rytmu serca),
- temsyrolimus (przeciw nowotworom),
- sirolimus, ewerolimus (w celu zapobiegania odrzutom przeszczepionych organów),
- wildagliptyna (do leczenia cukrzycy typu 2),
- racekadotryl (do leczenia biegunki).
- Twój lekarz może potrzebować dostosować dawkę i/lub podjąć inne środki ostrożności, jeśli przyjmujesz antagonistę receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz także sekcje „RamiLich nie powinien być przyjmowany” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Poinformuj swojego lekarza, jeśli przyjmujesz/stosujesz którykolwiek z następujących leków, ponieważ ich działanie może być wpływane przez RamiLich:

Leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające poziom cukru we krwi i insulina. RamiLich może obniżać poziom cukru we krwi. Podczas przyjmowania RamiLich poziom cukru we krwi musi być ściśle monitorowany.

- Lit (przeciw chorobom psychicznym). RamiLich może zwiększać poziom litu we krwi. Twój lekarz musi starannie monitorować poziom litu.

- Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie (lub nie jesteś pewien), zapytaj swojego lekarza przed przyjęciem RamiLich.

Przyjmowanie RamiLich z jedzeniem i alkoholem

Przyjmowanie RamiLich z jedzeniem i alkoholem

- RamiLich można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.
- Cięża i karmienie piersią

Ciąża

Ciąża

Poinformuj swojego lekarza, jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży (lub możesz zająć w ciążę). Nie należy stosować Ramiprilu w pierwszych dwunastu tygodniach ciąży i w żadnym wypadku nie wolno stosować RamiLich po 13. tygodniu ciąży, ponieważ przyjmowanie RamiLich na tym etapie może prowadzić do poważnych uszkodzeń nienarodzonego dziecka. Jeśli zajdziesz w ciążę podczas przyjmowania Ramiprilu, natychmiast poinformuj o tym swojego lekarza. Zmiana na bardziej tolerowaną alternatywę leczenia powinna być rozważona przed planowaną ciążą.

Okres karmienia piersią

Nie należy stosować Ramiprilu, jeśli karmisz piersią.

Przed zażyciem jakiegokolwiek leku zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Podczas przyjmowania RamiLich może wystąpić zawroty głowy. Prawdopodobieństwo jest największe na początku leczenia RamiLich lub przy zwiększeniu dawki. W takim przypadku nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3. Jak przyjmować RamiLich?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku

Leczenie nadciśnienia tętniczego

- Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz dziennie.
- Lekarz dostosuje dawkę do momentu, aż ciśnienie krwi będzie pod kontrolą.
- Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz dziennie.
- Jeśli już przyjmujesz diuretyki (tabletki moczopędne), lekarz może zmniejszyć ich ilość przed rozpoczęciem leczenia RamiLich lub całkowicie je odstawić.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

- Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz dziennie.
- Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki.
- Zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg raz dziennie.

Leczenie w celu zmniejszenia ryzyka lub spowolnienia postępu Zaburzenia czynności nerek

- Twoja dawka początkowa wynosi albo 1,25 mg, albo 2,5 mg raz dziennie.
- Twój lekarz dostosuje Twoją dawkę.
- Zwykła dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz dziennie.

Leczenie niewydolności serca

- Zwykła dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz dziennie.
- Twój lekarz dostosuje Twoją dawkę.
- Maksymalna dawka wynosi 10 mg dziennie. Zaleca się podzielenie dawki na dwie porcje dziennie.

Leczenie po zawale serca

- Zwykła dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz dziennie do 2,5 mg dwa razy dziennie.
- Twój lekarz dostosuje Twoją dawkę.
- Zwykła dawka wynosi 10 mg dziennie. Zaleca się podzielenie dawki na dwie porcje dziennie.

Pacjenci starsi

Twój lekarz rozpocznie od mniejszej dawki początkowej i będzie ją stopniowo zwiększał w trakcie leczenia.

Przyjmowanie leku

- Przyjmuj lek codziennie o tej samej porze.
- Przyjmuj tabletki z wystarczającą ilością płynu.
- Tabletek nie wolno kruszyć ani żuć.

Jeśli przyjąłeś większą ilość RamiLich niż powinienś

Niezwłocznie poinformuj swojego lekarza lub udaj się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Nie wolno Ci samodzielnie jechać do szpitala. Poproś inną osobę o pomoc lub wezwij karetkę. Zabierz ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział, co zażyłeś.

Jeśli zapomnisz przyjąć RamiLich

- Jeśli zapomnisz przyjąć dawkę, przyjmij następną dawkę w kolejnym planowanym terminie.
- Nie przyjmuj podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące stosowania tego leku, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Jakie działania niepożądane są możliwe?

Jak każdy lek, również ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Natychmiast przerwij przyjmowanie RamiLich i niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz którekolwiek z poniższych poważnych działań niepożądanych – możesz potrzebować pilnej pomocy medycznej:

- Obrzęki twarzy, warg lub gardła, które utrudniają połykanie lub oddychanie, a także swędzenie i wysypki skórne. To mogą być objawy ciężkiej reakcji nadwrażliwości na RamiLich.
- Ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka, owrzodzenia w jamie ustnej (afty), pogorszenie istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub złuszczenie się skóry (jak zespół Stevens-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy).

Niezwłocznie poinformuj lekarza o wystąpieniu

- przyspieszonego tętna, nieregularnego lub silnego bicia serca (kołatanie serca), bólu lub ucisku w klatce piersiowej lub poważniejszych zdarzeń, takich jak zawał serca lub udar mózgu,
- duszności lub kaszlu, które mogą być objawami choroby płuc,
- łatwiejszego powstawania siniaków, krwawień, które trwają dłużej niż normalnie, jakichkolwiek objawów krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowych plam na skórze lub zwiększonej podatności na infekcje, ból gardła i gorączkę, zmęczenie, uczucie osłabienia, zawrotów głowy lub bladości skóry, które mogą być objawami choroby krwi lub szpiku kostnego,
- silnego bólu brzucha, który może promieniować do pleców i być objawem zapalenia trzustki (zapalenie trzustki),
- gorączki, dreszczy, zmęczenia, utraty apetytu, bólu brzucha, złego samopoczucia, zażółcenia skóry lub oczu (żółtaczką), które mogą być objawami chorób wątroby, takich jak zapalenie wątroby (zapalenie wątroby) lub uszkodzenie wątroby.

Inne możliwe działania niepożądane

Poinformuj lekarza, jeśli któreś z wymienionych działań niepożądanych znacznie Cię dotyka lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

Często (może dotyczyć do 1 na 10 leczonych)

- Bóle głowy lub zmęczenie
- Zawroty głowy. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe na początku leczenia RamiLich lub przy zwiększaniu dawki.
- Omdlenie, hipotonia (niezwykle niskie ciśnienie krwi), zwłaszcza podczas stania lub nagłego wstawania
- Suchy kaszel, zapalenie zatok (zapalenie zatok) lub zapalenie oskrzeli, duszność
- Bóle żołądka lub jelit, biegunka, niestrawność, złe samopoczucie lub wymioty
- Wysypka skórna z lub bez uniesień skórnych
- Bóle w klatce piersiowej
- Skurcze mięśni lub bóle mięśni
- Podwyższone poziomy potasu we krwi

Sporadycznie (może dotyczyć do 1 na 100 leczonych)

- Zaburzenia równowagi (zawroty głowy)
- Swędzenie i nietypowe odczucia skórne, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub mrówki (parestezje)
- Utrata lub zmiana smaku
- Zaburzenia snu

- Depresyjny nastrój, lęk, nietypowa nerwowość lub niepokój
- Zatkany nos, trudności w oddychaniu lub zaostrzenie astmy
- Obrzęk jelit, tzw. obrzęk naczynioruchowy jelitowy, z objawami takimi jak bóle brzucha, wymioty i biegunka
- Zgaga, zaparcia lub suchość w ustach
- Zwiększone wydalanie moczu (diureza) w ciągu dnia
- Nadmierne pocenie się
- Brak apetytu lub jego zmniejszenie (anoreksja)
- Zwiększone lub nieregularne bicie serca
- Opuchnięte ramiona i nogi, możliwe oznaki zatrzymania płynów w organizmie
- Zaczernienie skóry z uczuciem gorąca
- Niewyraźne widzenie
- Bóle stawów
- Gorączka
- Zaburzenia seksualne u mężczyzn, zmniejszone pożądanie seksualne u mężczyzn i kobiet
- Wzrost liczby niektórych białych krwinek (eozynofilia)
- Wyniki krwi wskazujące na zaburzenia funkcji wątroby, trzustki lub nerek

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1 000 leczonych)

- Uczucie drżenia lub dezorientacji
- Czerwony i opuchnięty język
- Poważne łuszczenie się lub odwarstwianie skóry, swędząca, wypukła wysypka
- Problemy z paznokciami (np. poluzowanie lub odpadanie paznokcia u stopy lub ręki)
- Wysypka lub siniak
- Plamy na skórze i zimne kończyny
- Czerwone, swędzące, opuchnięte lub łzawiące oczy
- Zaburzenia słuchu lub dzwonięcie w uszach
- Uczucie osłabienia
- Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo zbyt niski poziom hemoglobiny w badaniach krwi

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 leczonych)

- Zwiększona wrażliwość na słońce

Inne możliwe działania niepożądane

Poinformuj swojego lekarza, jeśli któreś z wymienionych działań niepożądanych znacznie Cię dotyczy lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

- Osłabienie koncentracji
- Opuchnięte usta
- Morfologia krwi z niedoborem krwinek
- Zbyt niskie stężenie sodu we krwi
- Skoncentrowany mocz (ciemny kolor), nudności lub wymioty, skurcze mięśni, dezorientacja i napady, które mogą być spowodowane nieodpowiednim wydzielaniem ADH (hormonu antydiuretycznego). Skontaktuj się natychmiast z lekarzem, jeśli wystąpią u Ciebie te objawy.
- Przebarwienia palców rąk i nóg, gdy jest Ci zimno, oraz mrowienie lub ból podczas ogrzewania (zespół Raynauda)
- Powiększenie piersi u mężczyzn

- Spowolniona lub pogorszona reakcja
- Uczucie pieczenia
- Zmiana percepcji zapachu
- Wypadanie włosów

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli zauważysz działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również zgłaszać działania niepożądane bezpośrednio do

Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych

Dział Farmakowigilancji

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Strona internetowa: www.bfarm.de

zgłaszać. Zgłaszając działania niepożądane, możesz przyczynić się do udostępnienia większej ilości informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak przechowywać RamiLich?

Przechowuj ten lek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na kartoniku, blistrze i butelce po „Zużyć do”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

Dla tego leku nie są wymagane żadne specjalne warunki przechowywania.

Nie wyrzucaj leków do kanalizacji. Zapytaj farmaceutę, jak pozbyć się leku, jeśli nie jest już potrzebny. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawierają tabletki RamiLich 2,5 mg

Substancją czynną jest ramipryl.

1 tabletka zawiera 2,5 mg ramiprylu.

Pozostałe składniki to:

Hypromeloza

Skrobia przedżelowana (skrobia kukurydziana)

Celuloza mikrokrystaliczna

Stearylofumarany sodu (Ph. Eur.)

Tlenek wodorotlenku żelaza(III) (E 172).

Jak wyglądają tabletki RamiLich 2,5 mg i zawartość opakowania

Tabletki RamiLich 2,5 mg są żółtawo-białe do żółtych, podłużne z rowkiem dzielącym i mają wymiary 8 x 4 mm. Na górnej stronie znajduje się wytłoczenie „2,5” i logo firmy, na dolnej stronie „HMR” i „2,5”. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Tabletki RamiLich 2,5 mg są dostępne w opakowaniach po 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99 i 100 tabletek w blistrach PVC/Alu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być wprowadzone do obrotu.

Podmiot odpowiedzialny
Winthrop Arzneimittel GmbH
65927 Frankfurt nad Menem

Dystrybucja wspólna
Zentiva Pharma GmbH
65927 Frankfurt nad Menem
Telefon: (01 80) 2 02 00 10*
Faks: (01 80) 2 02 00 11*

Producent S.C. Zentiva S.A.
B-dul Theodor Pallady nr. 50, sektor 3,
032266 Bukareszt
Rumunia

lub

Sanofi S.p.A.
Strada Statale 17, km 22
67019 Scoppito (L'Aquila)
Włochy

lub

Delpharm Dijon
6 Boulevard de l'Europe
21800 Quetigny
Francja

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Niemcy: RamiLich 2,5 mg tabletki
Francja: Ramipril Zentiva 2.5 mg comprimés
Włochy: Ramipril Zentiva 2.5 mg compresse
Rumunia: Zenra 2.5 mg comprimate
Węgry: Ramipril Zentiva 2,5 mg tabletká

Ulotka została ostatnio zaktualizowana w lutym 2017.

Na receptę.

Dostępne są również inne moce leku: RamiLich 5 mg tabletki z 5 mg ramiprylu i RamiLich 10 mg tabletki z 10 mg ramiprylu.

*0,06 € za połączenie (niemiecka sieć stacjonarna); maks. 0,42 € za minutę (telefonia komórkowa).

Transtoyou