

## PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Rectogesic® 4 mg/g Peräpuikko  
Glyseryylitrinitraatti

Lue kaikki Pidä tämä seloste tallessa. Saatat tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämän selosteen tiedot koskevat vain

Rectogesic 4 mg/g Peräpuikkoa. Tämä lääke on määrätty sinulle. Älä anna sitä muille. Se voi vahingoittaa heitä, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset vakavia haittavaikutuksia tai muita haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa:

### Mitä

1. Rectogesic on ja mihin sitä käytetään Ennen kuin käytät
2. Ennen käyttöä Rectogesic
3. Kuinka käyttää Rectogesic
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Säilytys Rectogesic
6. Lisätietoja

## 1. MITÄ RECTOGESIC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Rectogesic on peräpuikko, joka sisältää vaikuttavana aineena glyseryylitrinitraattia. Glyseryylitrinitraatti kuuluu lääkeryhmään nimeltä orgaaniset nitraatit.

Voide auttaa lievittämään kroonisten peräaukon haavaumien aiheuttamaa kipua. Peräaukon haavauma on repeämä peräaukon kanavan ihossa. Glyseryylitrinitraatin paikallinen käyttö peräaukon kanavassa vähentää peräaukon painetta ja lisää verenkiertoa, mikä vähentää kipua.

## 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RECTOGESIC-VALMISTETTA

Älä käytä Rectogesic:

jos olet allerginen glyseryylitrinitraatille tai vastaaville lääkkeille

jos olet allerginen jollekin muulle tuotteen ainesosalle

jos sinulla on matala verenpaine

jos sinulla on sydän- tai verisuonisairauksia

jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma – tila, jossa silmän sisäinen paine nousee nopeasti aiheuttaen näön menetyksen

jos sinulla on migreeni tai toistuvia päänsärkyjä

jos sinulla on kohonnut kallonsisäinen paine tai korkea paine kallossasi (esim. pään vamma tai aivoverenvuoto verenvuoto - verenvuoto aivojen repeytyneestä verisuonesta, joka voi olla hengenvaarallinen ilman nopeaa lääketieteellistä hoitoa.

Aivoverenvuoto verenvuoto jos sinulla on

anemia (alhainen raudansisältö veressäsi) (matala raudan määrä veressäsi)

Ole erityisen varovainen

## Rectogesic ::

jos sinulle annetaan hepariinia, veresi tarkkaa seurantaan tarvitaan, koska hepariiniannostasi saattaa olla tarpeen muuttaa. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin lopetat

Rectogesic jos sinulla on myös peräpukamat peräpukamat (peräpukamat) ja huomaat tavallista enemmän verenvuotoa, sinun tulee lopettaa Rectogesic ja keskustella asiasta lääkärisi kanssa jos saat voimakkaita päänsärkyjä käyttäessäsi Rectogesic, kerro asiasta lääkärillesi. Lääkärisi päättää, tarvitsetko käyttää erilaista määrää Rectogesic, tai lopettaa sen käytön kokonaan.

Rectogesic voi alentaa verenpainettasi. Kun nouset makuu- tai istuma-asennosta, sinun tulee nousta hitaasti, muuten saatat tuntea huimausta. Verenpaineesi todennäköisesti laskee, jos juot alkoholia käyttäessäsi Rectogesic.

Rectogesic ei sovellu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, koska sitä ei ole arvioitu tämän ikäryhmän henkilöillä.

Rectogesicin ottaminen muiden lääkkeiden kanssa Kerro lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet.

Seuraavat lääkkeet voivat lisätä

verenpainetta alentavaa vaikutusta Rectogesic

Masennuslääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet)

Lääkkeet erektiohäiriöihin (miesten impotenssi) (sildenafilisitraatti, tadalafiili, vardenafiili)

Lääkkeet korkeaan verenpaineeseen

Diureetit ("vesipillerit")

Yleisesti käytetyt rauhoittavat lääkkeet

Lääkkeet sydänongelmien hoitoon (isosorbididinitraatti ja amyli- tai butyylinitriitti)

## Muut lääkkeet

Asetyylikysteiini voi lisätä vaikutusta Rectogesic verenkiertoon

Hepariinin (käytetään veren hyytymisen hallintaan) vaikutus voi heikentyä, kun sitä käytetään yhdessä Rectogesic

Alteplaasin (käytetään sydänongelmien hoitoon) vaikutus voi heikentyä, kun sitä annetaan samanaikaisesti Rectogesic

Rectogesicin Rectogesic Asetyyლისისყილი (aspiriini) ja ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (tietyt kipulääkkeet) voivat heikentää

Rectogesicin terapeutista vaikutusta

Ottaminen Rectogesic ruoan ja juoman kanssa

Ole varovainen alkoholin juomisessa, sillä voide voi vaikuttaa sinuun tavallista enemmän.

Raskaus ja imetys

Sinun ei tulisi käyttää Rectogesic raskauden aikana tai imettäessä.

Kysy lääkäritäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen ottamista raskauden tai imetyksen aikana.

## Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia ajokykyyn ja koneiden käyttöön kohdistuvista vaikutuksista ei ole tehty Rectogesic 4 mg/g peräpuikkovoiteella. Jos tunnet huimausta, uneliaisuutta tai näkösi hämärtyy voiteen käytön alussa, älä aja tai käytä koneita ennen kuin nämä vaikutukset ovat hävinneet.

## Tärkeää tietoa joistakin Rectogesic

n ainesosista Tämä lääkevalmiste sisältää lanoliinia (villarasvaa), joka voi aiheuttaa ihoreaktion (esim. kosketusihottuma). Tuote sisältää myös propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

## 3. RECTOGESICIN KÄYTTÖOHJEET

### Antotapa

Rectogesic 4 mg/g Peräpuikko on tarkoitettu peräsuolen käyttöön.

Käytä aina Rectogesic täsmälleen lääkärin ohjeiden mukaisesti. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on noin 375 mg voidetta (noin 1,5 mg glyseryyliitrinitraattia), joka levitetään peräaukkoon 12 tunnin välein.

Sormen suojus, kuten kelmu tai sormisuoja, voidaan asettaa sormelle, jota käytetään voiteen levittämiseen. Sormisuoja voi hankkia paikallisesta apteekista tai kirurgisten tarvikkeiden myyjältä tai kelmua paikallisesta kaupasta. Suojattu sormi asetetaan 2,5 cm annosteluviivan viereen, joka on merkitty ulkopakkaukseen, ja voidedepuristetta puristetaan varovasti sormen päähän viivan pituudelta. Aseta voide varovasti peräaukkoon sormella. Sormi, jossa on voidetta, on asetettava ensimmäiseen sormen niveleeseen (noin 1 cm) peräaukkoon.

Levitä voidetta 12 tunnin välein lääkärin ohjeiden mukaisesti äläkä ylitä annosta. Pese kädet käytön jälkeen ja hävitä sormisuoja tai muovikeltu (ei alas vessasta).

Hoitoa voidaan jatkaa, kunnes kipu häviää, tai enintään 8 viikkoa. Jos peräaukon kipu ei parane käytön jälkeen Rectogesic sinun tulisi keskustella lääkärin kanssa uudelleen varmistaaksesi, ettei kipua aiheuta jokin muu.

Jos käytät enemmän Rectogesic kuin pitäisi

Jos olet saattanut käyttää enemmän voidetta kuin pitäisi, saatat tuntea huimausta ja heikotusta. Sinulla voi myös olla nopeita sydämenlyönnejä tai sydämentykytyksiä. Jos tunnet näitä oireita, pyyhi ylimääräinen voide pois ja ota heti yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat levittää Rectogesic

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneita yksittäisiä annoksia. Levitä seuraava annos tavanomaiseen aikaan.

Jos sinulla on kysyttävää Rectogesic, kysy lääkäriltäsi tai apteekista.

## 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Rectogesic voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä saakaan. Kerro lääkärillesi, jos huomaat jonkin seuraavista:

Hyvin yleiset (esiintyvät useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

Päänsärky, joka voi olla voimakas. Jos saat päänsärkyä haittavaikutuksena, pyyhi pois voide. Jos päänsärky on epämiellyttävä, saatat joutua kysymään lääkäriltäsi, pitäisikö sinun lopettaa lääkkeen käyttö.

Yleiset (esiintyvät useammalla kuin 1 potilaalla 100:sta, mutta harvemmallalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

Huimaus, pyörrytys seistessä, huimauksen tunne, näön hämärtyminen ja väsymys  
Pahoinvointi

Harvinaiset (esiintyvät useammalla kuin 1 potilaalla 1000:sta, mutta harvemmallalla kuin 1 potilaalla 100:sta (mahdollisesti vakavat)

Ripuli, anaalialueen epämukavuus, oksentelu, peräsuolen verenvuoto, peräsuolen häiriö

Allergiset ihoreaktiot (mahdollisesti vakavat)

Anafylaktoidinen reaktio (allerginen reaktio, mahdollisesti hengenvaarallinen kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotuksen, hengitysvaikeuksien, hengenahdistuksen tai pyörtymisen kanssa.) Jos koet jonkin näistä oireista, lopeta voiteen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Kutina tai polttava tunne anaalikanavassa

Nopea sydämen syke tai sydämentykytys

Rintakipu (angina)

Punastuminen

Methemoglobinemia (toimimattomat punasolut, jotka johtavat veren happipitoisuuden laskuun)

Pyörtyminen

Jos havaitset vakavia haittavaikutuksia tai muita haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

## 5. MITEN RECTOGESICIA SÄILYTETÄÄN

Pidä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä käytä Rectogesic -valmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on merkitty etikettiin ja pakkaukseen 'Exp.'-kohdan jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä säilytä yli 25°C lämpötilassa.

Älä jäädytä

Pidä tuubi tiiviisti suljettuna

Avaamisen jälkeen käytä voide 8 viikon kuluessa.

## 6. LISÄTIETOJA

Mitä Rectogesic sisältää

Vaikuttava aine on glyseryylitrinitraatti. Yksi gramma rektaalivoidetta sisältää 40 mg glyseryylitrinitraattia propyleeniglykolissa, mikä vastaa 4 mg glyseryylitrinitraattia. Tavanomaisessa 375 mg:n annoksessa on noin 1,5 mg glyseryylitrinitraattia Rectogesic.

Muut aineet ovat: propyleeniglykoli, lanoliini, sorbitaani seskioleaatit, kova parafiini ja valkoinen pehmeä parafiini.

Miltä Rectogesic näyttää ja pakkauksen sisältö

Rectogesic on luonnonvalkoinen sileä läpinäkymätön rektaalivoide, jota toimitetaan 30 g:n alumiini tuubeissa.

Myynti- Lupa haltija ja valmistaja

Myynti Myyntiluvan Haltija

ProStrakan Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

UK

Puh.: 01896 664000

Faksi: 01896 664001

Valmistaja

PHARBIL Waltrop GmbH

Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Saksa

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty: 24. toukokuuta 2010