

Prospect: informații pentru pacient

Relvar Ellipta 92 micrograme /22 micrograme pulbere de inhalat, predozată
Relvar Ellipta 184 micrograme /22 micrograme pulbere de inhalat, predozată
fluticazonfuroat/vilanterol

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră. Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.

- Aveți întrebări suplimentare? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul, farmacistul sau asistenta medicală.
- Conținutul acestui prospect Ce este Relvar Ellipta și pentru ce se utilizează acest medicament?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?

1. Cum se utilizează acest medicament?
2. Reacții adverse posibile
3. Cum se păstrează acest medicament?
4. Conținutul ambalajului și alte informații
5. Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizare
6. 1. Ce este Relvar Ellipta și pentru ce se utilizează acest medicament?
Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizare

1. Ce este Relvar Ellipta și pentru ce se utilizează acest medicament?

Relvar Ellipta conține două substanțe active: fluticazonfuroat și vilanterol. Există două concentrații diferite de Relvar Ellipta disponibile: fluticazonfuroat 92 micrograme/vilanterol 22 micrograme și fluticazonfuroat 184 micrograme/vilanterol 22 micrograme.

Concentrația de 92/22 micrograme este utilizată pentru tratamentul regulat al bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) la adulți și astm la adulți și adolescenți de la 12 ani în sus.

Concentrația de 184/22 micrograme este utilizată pentru tratamentul astmului la adulți și adolescenți de la 12 ani în sus. Concentrația de 184/22 micrograme nu este aprobată pentru tratamentul BPOC.

Relvar Ellipta trebuie utilizat în fiecare zi și nu doar atunci când aveți probleme de respirație sau alte simptome de BPOC și astm. Nu trebuie utilizat pentru ameliorarea unui atac brusc de respirație dificilă sau respirație șuierătoare. Dacă aveți un astfel de atac, trebuie să utilizați un

inhalator cu acțiune rapidă (cum ar fi salbutamol). Dacă nu aveți un inhalator cu acțiune rapidă, contactați medicul dumneavoastră.

Fluticazonfuroatul face parte dintr-un grup de medicamente numite corticosteroizi, sau pe scurt steroizi. Corticosteroizii reduc inflamația. Ei reduc umflarea și iritația căilor respiratorii mici din plămâni și astfel reduc treptat problemele de respirație. Corticosteroizii ajută de asemenea la prevenirea atacurilor de astm și agravarea BPOC.

Vilanterolul face parte dintr-un grup de medicamente numite bronhodilatatoare cu acțiune lungă. Acesta

relaxează mușchii căilor respiratorii mici din plămâni. Acest lucru ajută la deschiderea căilor respiratorii, permițând aerului să intre și să iasă mai ușor din plămâni. Când este utilizat regulat, ajută pentru a menține deschise căile respiratorii mici.

Când utilizați regulat aceste două substanțe active împreună, ele vă ajută să vă mențineți problemele respiratorii mai bine sub control decât atunci când utilizați fiecare medicament separat.

Astmul este o boală pulmonară gravă și de lungă durată în care mușchii din jurul căilor respiratorii mai mici se îngustează (bronhoconstricție) și devin umflate și iritate (inflamație). Simptomele apar ocazional și includ, printre altele, dificultăți de respirație, respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept și tuse. S-a demonstrat că Relvar Eliipta reduce exacerbările și simptomele astmului. Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) este o boală pulmonară gravă și de lungă durată în care căile respiratorii

devin inflamate și mai groase. Simptomele includ, printre altele, dificultăți de respirație, tuse, senzație de disconfort în piept și expectorație de mucus. S-a demonstrat că Relvar Eliipta reduce exacerbările simptomelor BPOC. 2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut? Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Dacă credeți că cele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, nu utilizați Relvar Eliipta până nu ați discutat cu

- medicul dumneavoastră.
- Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament? Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament:

dacă aveți o boală de ficat, deoarece este posibil să aveți un risc mai mare de efecte secundare. Dacă aveți un

Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament:

- dacă aveți o boală de ficat, deoarece este posibil să aveți un risc mai mare de efecte secundare. Dacă aveți un dacă aveți o boală hepatică moderată sau severă, medicul

dumneavoastră va limita doza la concentrația mai mică de Relvar Ellipta (o dată pe zi 92/22 micrograme)

- dacă aveți probleme cardiace sau hipertensiune arterială
- dacă aveți tuberculoză pulmonară (TBC) sau alte infecții persistente sau netratate infecții
- dacă vi s-a spus vreodată că aveți diabet sau un nivel ridicat de zahăr în sânge
- dacă aveți probleme cu glanda tiroidă
- dacă aveți niveluri scăzute de potasiu în sânge
- dacă aveți vedere încețoșată sau alte tulburări vizuale

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament dacă credeți că unul dintre punctele de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră.

În timp ce utilizați Relvar Ellipta

Dificultăți respiratorii imediate

Dacă aveți senzație de sufocare, tuse, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație imediat după utilizarea inhalatorului Relvar Ellipta:

opriți utilizarea acestui medicament și solicitați imediat ajutor medical, deoarece puteți avea o afecțiune gravă numită bronhospasm paradoxal.

- contactați medicul dumneavoastră dacă vedeți încețoșat sau aveți alte probleme cu vederea
- contactați medicul dumneavoastră dacă aveți mai multă sete, urinați frecvent sau sunteți inexplicabil de obosit (semne ale unui nivel ridicat de zahăr în sânge)

Infecție pulmonară

Dacă utilizați acest medicament pentru BPOC, este posibil să aveți un risc mai mare de a dezvolta o infecție a plămânilor numită pneumonie. Consultați secțiunea 4 pentru informații despre simptomele la care trebuie să fiți atent când utilizați acest medicament. Informați-vă medicul cât mai curând posibil dacă dezvoltați aceste simptome.

Copii și adolescenți până la 18 ani

Nu administrați acest medicament copiilor sub 12 ani pentru tratamentul astmului sau copiilor și adolescenților până la 18 ani pentru tratamentul BPOC.

Utilizați alte medicamente?

Utilizați, pe lângă Relvar Ellipta, alte medicamente, ați făcut-o recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Informați medicul sau farmacistul. Consultați-vă și cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur ce conține medicamentul dumneavoastră.

Unele medicamente pot influența efectul acestui medicament sau pot crește riscul de efecte secundare. Acestea includ:

- medicamente numite beta-blocante, cum ar fi metoprolol, utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau a unei probleme cardiace
- ketoconazol, utilizat pentru tratamentul infecțiilor fungice
- ritonavir sau cobicistat, utilizate pentru tratamentul infecțiilor cu HIV
- agoniști beta2-adrenergici cu acțiune lungă, cum ar fi salmeterol

Informați medicul sau farmacistul dacă utilizați unul dintre aceste medicamente. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să vă monitorizeze cu atenție dacă utilizați unul dintre aceste medicamente, deoarece pot crește efectele secundare ale Relvar Ellipta pot agrava.

Sarcina și alăptarea

Sunteți însărcinată, credeți că sunteți însărcinată, doriți să rămâneți însărcinată sau alăptați? Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament. Nu utilizați acest medicament dacă sunteți însărcinată, decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus că puteți să-l utilizați.

Nu se știe dacă substanțele din acest medicament sunt excretate în laptele matern. Dacă alăptați, contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Relvar Ellipta. Nu utilizați acest medicament dacă alăptați, decât dacă medicul dumneavoastră v-a spus că puteți să-l utilizați.

Aptitudinea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Acest medicament probabil nu afectează capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Relvar Ellipta conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul dumneavoastră înainte de a

utiliza acest medicament. 3. Cum se utilizează acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă?

Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul. Astm

Doza recomandată pentru tratamentul astmului este o inhalare (92 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol) o dată pe zi, în fiecare zi la aceeași oră. 22 micrograme vilanterol) o dată pe zi, în fiecare zi la aceeași oră.

Dacă aveți astm sever, medicul dumneavoastră poate decide că trebuie să luați o inhalare din inhalatorul cu o concentrație mai mare (184 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol). Această doză trebuie luată de asemenea o dată pe zi și în fiecare zi la aceeași oră.

BPOC

Doza recomandată pentru tratamentul BPOC este o inhalare (92 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol) o dată pe zi, în fiecare zi la aceeași oră.

Concentrația mai mare de Relvar Ellipta (184 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol) nu este potrivită pentru tratamentul BPOC.

Relvar Ellipta este pentru inhalare orală.

Utilizați Relvar Ellipta în fiecare zi la aceeași oră deoarece este activ timp de 24 de ore.

Este foarte important să utilizați acest medicament în fiecare zi, așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Acest lucru va ajuta să vă mențineți fără simptome zi și noapte.

Relvar Ellipta nu trebuie utilizat pentru ameliorarea unui atac brusc de respirație dificilă sau respirație șuierătoare. Dacă aveți un astfel de atac, trebuie să utilizați un inhalator cu acțiune rapidă (cum ar fi salbutamol). Contactați medicul dumneavoastră dacă aveți mai des decât de obicei respirație dificilă sau respirație șuierătoare

sau dacă utilizați inhalatorul cu acțiune rapidă mai des decât de obicei. Cum utilizați Relvar Ellipta?

Consultați 'Instrucțiunile pas cu pas pentru utilizare' după secțiunea 6 a acestui prospect pentru informații complete.

Relvar Ellipta este pentru inhalare orală. Nu trebuie să pregătiți inhalatorul Relvar Ellipta într-un mod special pentru a Relvar Ellipta este pentru inhalare orală. Nu trebuie să pregătiți inhalatorul Relvar Ellipta într-un mod special pentru a nu pregătiți, nici măcar atunci când utilizați inhalatorul pentru prima dată.

Dacă simptomele dumneavoastră nu se îmbunătățesc

Dacă simptomele dumneavoastră (dificultăți de respirație, respirație șuierătoare, tuse) nu se îmbunătățesc sau chiar se agravează, sau dacă trebuie să utilizați inhalatorul cu acțiune rapidă din ce în ce mai des:

contactați medicul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Dacă ați utilizat accidental mai mult Relvar Ellipta decât v-a prescris medicul, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Arătați-i, dacă este posibil, inhalatorul, ambalajul sau acest prospect.

Este posibil să observați că inima vă bate mai repede decât de obicei, că vă simțiți tremurând sau că aveți dureri de cap. Este deosebit de important să cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră dacă ați utilizat mai mult decât v-a fost prescris pentru o perioadă mai lungă de timp. Dozele mai mari de Relvar Ellipta pot reduce cantitatea de hormoni steroizi produși în mod natural de corpul dumneavoastră.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Nu inhalați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Luați următoarea doză la ora obișnuită.

Dacă respirația dumneavoastră devine șuierătoare, dacă aveți dificultăți de respirație sau alte simptome ale unui atac de astm, utilizați inhalatorul cu acțiune rapidă (de exemplu, salbutamol) și consultați apoi un medic.

Nu întrerupeți utilizarea Relvar Ellipta fără sfatul medicului

Utilizați acest medicament atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră. Este eficient doar cât timp îl utilizați. Nu întrerupeți utilizarea acestui medicament decât dacă medicul dumneavoastră vă sfătuiește, chiar dacă vă simțiți mai bine.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Atunci contactați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală.

4. Reacții adverse posibile

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea reacții adverse, deși nu toată lumea le experimentează.

Reacții alergice

Reacțiile alergice sunt rare (apar la mai puțin de 1 din 1.000 utilizatori).

Dacă aveți una dintre următoarele simptome după utilizarea Relvar Ellipta, opriți utilizarea acestui medicament și informați imediat medicul dumneavoastră.

- erupție cutanată (urticarie) sau roșeață
- umflare, uneori a feței sau a gurii (angioedem)
- dificultăți severe de respirație, tuse sau dificultăți de respirație
- senzație bruscă de slăbiciune sau amețeață (acest lucru poate duce la leșin sau pierderea cunoștinței).

Dificultăți respiratorii imediate

Dificultăți respiratorii imediate după utilizarea Relvar Ellipta sunt rare.

Dacă respirația dumneavoastră se înrăutățește sau dacă aveți mai multe dificultăți de respirație imediat după utilizarea acestui medicament, opriți utilizarea și solicitați imediat ajutor medical.

Pneumonie (infecție pulmonară) (reacție adversă frecventă, apare la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

Informați medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timpul utilizării Relvar Ellipta – acestea pot fi simptome ale unei infecții pulmonare:

- febră sau frisoane
- producție crescută de mucus, schimbarea culorii mucusului
- tuse mai frecventă sau dificultăți de respirație mai mari.

Alte reacții adverse:

Reacții adverse foarte frecvente

Acestea apar la mai mult de 1 din 10 utilizatori:

- dureri de cap
- răceală.

Reacții adverse frecvente

Acestea apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori:

- locuri dureroase, ridicate în gură sau gât cauzate de o infecție fungică (candidoză). Clătirea gurii cu apă imediat după utilizarea Relvar Ellipta poate ajuta la prevenirea dezvoltării acestei reacții adverse.
- inflamația plămânilor (bronșită)
- infecție a sinusurilor sau gâtului
- gripă (influenza)
- durere și iritație în partea din spate a gurii și gâtului
- inflamația sinusurilor
- nas înfundat, nas care curge sau mâncărime la nas
- tuse
- afecțiuni ale vocii
- slăbirea oaselor, care duce la fracturi osoase
- dureri de stomac
- dureri de spate
- temperatură ridicată (febră)
- dureri articulare
- spasme musculare.

Reacții adverse care apar uneori

Acestea apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori:

- ritm cardiac neregulat
- vedere încețoșată
- glicemie crescută (hiperglicemie).

Reacții adverse rare

Acestea apar la mai puțin de 1 din 1.000 de utilizatori:

- ritm cardiac accelerat (tahicardie)

- conștientizarea bătăilor inimii (palpitații)
- tremurături
- anxietate.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru posibile reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. Puteți raporta reacțiile adverse și direct prin sistemul național de raportare menționat în anexa V. Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este indicată pe cutie, recipient și inhalator după EXP. Este indicată o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare. Păstrați inhalatorul în recipientul închis pentru a-l proteja de umiditate și scoateți-l doar imediat înainte de

prima utilizare. Odată ce recipientul este deschis, inhalatorul poate fi utilizat maximum 6 săptămâni, începând cu ziua în care recipientul a fost deschis. Scrieți data la care inhalatorul trebuie aruncat pe eticheta inhalatorului în spațiul destinat. Data trebuie notată imediat ce inhalatorul este scos din recipient. A se păstra la temperaturi sub 25°C. Dacă inhalatorul este păstrat în frigider, lăsați-l să ajungă la temperatura camerei timp de cel puțin o oră înainte de utilizare.

Nu aruncați medicamentele pe scurgere sau în toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul

ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi eliminate într-un mod responsabil. reveniți la temperatura camerei.

Nu aruncați medicamentele în chiuvetă sau toaletă și nu le aruncați la gunoi. Întrebați farmacistul dumneavoastră ce trebuie să faceți cu medicamentele pe care nu le mai utilizați. Acestea vor fi eliminate într-un mod responsabil distruse și nu ajung în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanțele active din acest medicament sunt furoat de fluticazonă și vilanterol.
- Pentru doza de 92/22 mcg: fiecare inhalare eliberează o doză (doza care iese din piesa bucală) de 92 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol (ca trifenatat).

- Pentru doza de 184/22 mcg: fiecare inhalare eliberează o doză (doza care iese din piesa bucală) de 184 micrograme furoat de fluticazonă și 22 micrograme vilanterol (ca trifenatat).
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt monohidrat de lactoză (vezi secțiunea 2 sub 'Relvar Ellipta conține lactoză') și stearat de magneziu.

Cum arată Relvar Ellipta și ce conține un ambalaj?

Relvar Ellipta este o pulbere pentru inhalare, predozată.

Inhalatorul Ellipta constă dintr-un inhalator gri deschis cu un capac de protecție galben al piesei bucale și un contor de doze. Este ambalat într-un recipient din folie laminată cu o închidere de folie detașabilă. Recipientul conține un pachet cu desicant pentru a reduce umiditatea din ambalaj. Aruncați desicantul când ați deschis sigiliul recipientului desicantul nu trebuie mâncat sau inhalat. Inhalatorul nu trebuie păstrat în recipientul din folie laminată odată ce acesta este deschis.

Relvar Ellipta este disponibil în ambalaje cu 1 inhalator cu 14 sau 30 de doze (stoc pentru 14 sau 30

Relvar Ellipta este disponibil în ambalaje cu 1 inhalator cu 14 sau 30 de doze (stoc pentru 14 sau 30 zile) și în pachete multiple cu 90 (3 inhalatoare de 30) doze (stoc pentru 90 de zile). Nu toate dimensiunile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irlanda
D24 YK11

Producător

Glaxo Wellcome Production
Zona Industrială Nr.2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Franța

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în <{LL/AAAA}>.

Alte surse de informații

Mai multe informații despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul web al Agenției Europene pentru Medicamente: <http://www.ema.europa.eu>.

Instrucțiuni pas cu pas pentru utilizare

Ce este inhalatorul Eliipta?

Prima dată când utilizați Relvar Eliipta nu trebuie să verificați dacă funcționează corect și nu trebuie să-l pregătiți într-un mod special pentru utilizare. Trebuie doar să urmați aceste instrucțiuni pas cu pas. Instrucțiuni de utilizare.

Cutia inhalatorului dumneavoastră Relvar Eliipta conține

Folie de acoperire a recipientului

Cutie

Inhalator

Acest prospect

Desicant

Recipient

Inhalatorul este ambalat într-un recipient. Nu deschideți recipientul până când nu sunteți gata să inhalați o doză din medicamentul dumneavoastră. Când sunteți pregătit să utilizați inhalatorul, trageți folia de acoperire a recipientului pentru a-l deschide. Recipientul conține un plic cu desicant pentru a reduce umiditatea. Aruncați acest plic cu desicant – nu trebuie deschis, mâncat sau inhalat.

Desicant

Când scoateți inhalatorul din recipient, acesta este în poziția „închis”. Nu deschideți inhalatorul până când nu sunteți gata să inhalați o doză din medicament. Odată ce recipientul este deschis, scrieți data

Data de ‘Aruncare’ pe eticheta inhalatorului în spațiul destinat. Data de ‘Aruncare’ este la 6 săptămâni după data la care recipientul a fost deschis. De la această dată nu mai aveți voie să folosiți inhalatorul. Recipientul poate fi aruncat după deschidere.

Dacă inhalatorul este păstrat în frigider, lăsați inhalatorul să ajungă la temperatura camerei timp de cel puțin o oră înainte de utilizare.

Instrucțiunile de utilizare ale inhalatorului Eliipta de mai jos se aplică atât pentru inhalatorul Eliipta cu 30 doze (provizie pentru 30 de zile), cât și pentru inhalatorul Eliipta cu 14 doze (provizie pentru 14 zile).

1. Citiți acest lucru înainte de a începe

Dacă deschideți sau închideți capacul de protecție fără a inhala medicamentul, doza se pierde. Doza pierdută este păstrată în siguranță în inhalator, dar nu mai este disponibilă. Nu este posibil să luați accidental medicament suplimentar sau o doză dublă în timpul unei inhalări.

2. Pregătirea unei doze

Așteptați să deschideți capacul de protecție până când sunteți gata să inhalați doza. Nu agitați inhalatorul.

- Glisați capacul de protecție în jos până când auziți un 'clic'.

Medicamentul dumneavoastră poate fi acum inhalat.

Contorul de doze scade cu 1 pentru a confirma acest lucru.

- Dacă contorul de doze nu scade când auziți 'clic', inhalatorul nu va elibera medicament. Returnați inhalatorul la farmacistul dumneavoastră pentru sfaturi.

3. Inhalarea medicamentului

- Expirați cât mai profund posibil în timp ce țineți inhalatorul departe de gură. Nu expirați în inhalator.

- Plasați piesa bucală între buze și închideți buzele strâns în jurul ei. Nu blocați orificiul de aer cu degetele.

- Inspirați o dată lung, uniform și profund. Țineți-vă respirația cât mai mult timp posibil (cel puțin 3-4 secunde).

- Scoateți inhalatorul din gură.
- Expirați încet și cu grijă.

Este posibil să nu simțiți sau să nu gustați medicamentul, chiar dacă utilizați inhalatorul corect. utilizat.

4. Închideți inhalatorul și clătiți-vă gura

- Glisați capacul de protecție cât mai sus posibil pentru a acoperi piesa bucală.

- Clătiți-vă gura cu apă după ce ați folosit inhalatorul și nu înghițiți. Acest lucru face mai puțin probabil să aveți o gură sau gât dureros ca efect secundar. Acest lucru face mai puțin probabil să aveți o gură sau gât dureros ca efect secundar.