

## PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Ropinirol Viatris 0,25 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ropinirol Viatris 0,5 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ropinirol Viatris 1 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ropinirol Viatris 2 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ropinirol (hüdrokloriidina)

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest siin on oluline teave teie jaoks.

Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.

Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla kahjulik teistele, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.

Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Ropinirol Viatris ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

### 1. Mis on Ropinirol Viatris ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Selle ravimi toimeaine on ropinirool, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse dopamiini agonistideks. Dopamiini agonistid mõjutavad aju samamoodi nagu looduslik aine dopamiin.

Seda ravimit kasutatakse Parkinsoni tõve raviks.

Parkinsoni tõvega inimestel on teatud ajuosades madal dopamiini tase. See ravim avaldab sarnast mõju nagu looduslik dopamiin, aidates seeläbi vähendada Parkinsoni tõve sümptomeid.

Seda ravimit kasutatakse ka mõõduka kuni raske idiopaatilise rahutute jalgade sündroomi raviks. Mõõdukas kuni raske rahutute jalgade sündroom on iseloomulik patsientidele, kellel on unehäired või kes kogevad tõsist ebamugavustunnet jalgades või kätel.

Rahutute jalgade sündroom on seisund, mida iseloomustab vastupandamatu vajadus liigutada jalgu ja mõnikord ka käsi, tavaliselt koos ebamugava tundega nagu surin, põletav või torkiv tunne. Need tunded ilmnevad puhke- või tegevusetusperioodidel, nagu istumine või lamamine, eriti voodis, ja on öhtul või öösel hullemad.

Tavaliselt saab leevendust ainult kõndimise või vastavate jäsemete liigutamise kaudu, mis sageli viib unehäireteni.

See ravim leevendab ebamugavustunnet ja vähendab vajadust jäsemeid liigutada (sümptomid, mis häirivad magamist).

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

- Kui olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.
- Kui teil on raske neeruhaigus.
- Kui teil on maksahaigus.

Rääkige oma arstile, kui arvate, et mõni neist olukordadest kehtib teie kohta.

Millal peate selle ravimiga olema eriti ettevaatlik?

Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist. Ravimid ei pruugi alati kõigile sobida. Teie arst peab teadma enne selle ravimi kasutamist, kui teil on praegu või on olnud mõni järgmistest seisunditest:

- te olete rase või arvate, et võite olla rase;
- te toidate last rinnaga;
- te olete alla 18-aastane;
- kui teil on raske südamehaigus;
- kui teil on tõsiseid vaimse tervise probleeme
- kui märkate, et teil tekib ebatavaline käitumine ja/või kalduvus (näiteks liigne hasartmängude mängimise tung või suurenenud seksuaalne vajadus ja/või seksuaalne käitumine);
- kui te ei talu teatud suhkruid (nagu laktoos)

Rääkige oma arstile, kui teil tekivad sümptomid nagu depressioon, apaatia, ärevus, väsimus, higistamine või valu pärast selle ravimi kasutamise lõpetamist või vähendamist (seda nimetatakse dopamiini agonisti ärajätusündroomiks või DAWS-iks). Kui probleemid kestavad kauem kui paar nädalat, võib teie arst vajada teie annuse kohandamist.

Rääkige oma arstile, kui teie või keegi teie perest märkab, et teil tekib soov käituda ebatavaliselt ja kui te ei suuda vastu panna impulsile, ajendile või kiusatusele teatud tegevusi teha, mis võivad olla kahjulikud teile või teistele. Neid nimetatakse impulsside kontrolli häireteks ja need võivad hõlmata käitumist nagu hasartmängusõltuvus, liigsöömine, ebanormaalselt suur seksuaalne tung või seksuaalsete mõtete või tunnete suurenemine. Teie arst võib pidada vajalikuks teie ravi kohandamist või lõpetamist.

Rääkige oma arstile, kui teie või teie pere/hooldaja märkab, et teil tekivad üleaktiivsuse, eufooria või ärrituvuse perioodid (maania sümptomid). Need võivad esineda koos või ilma impulsside kontrolli häirete sümptomiteta (vt eespool). Teie arst võib vajada annuse kohandamist või lõpetamist.

Rääkige oma arstile, kui arvate, et mõni neist olukordadest kehtib teie kohta. Teie arst võib otsustada, et see ravim ei sobi teile või et teid tuleb selle kasutamise ajal täiendavalt jälgida.

Selle ravimi kasutamise ajal

Rääkige oma arstile, kui teie või teie pere märkab, et teil tekib ebatavaline käitumine (näiteks ebatavaline hasartmängude mängimise tung või suurenenud seksuaalne vajadus ja/või seksuaalne käitumine) selle ravimi kasutamise ajal. Teie arst võib pidada vajalikuks teie annuse kohandamist või lõpetamist.

#### Autojuhtimine ja masinate kasutamine

See ravim võib teid uniseks muuta. See võib panna inimesi tundma end väga unisena ja mõnikord jäävad inimesed väga äkki ilma hoiatuseta magama. See ravim võib põhjustada hallutsinatsioone (nägemine, kuulmine või tundmine asjadest, mida pole olemas). Kui teil esineb neid sümptomeid, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Kui teil võib esineda mõni neist kõrvaltoimetest, ei tohi te autot juhtida, masinaid käsitseda ega end asetada olukorda, kus unisus või magamajäämine võib põhjustada tõsise vigastuse või surma riski teile (või teistele inimestele). Ärge osalege sellistes tegevustes, kuni need sümptomid on kadunud.

Rääkige oma arstile, kui see on teie jaoks probleem.

#### Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Ropinirol Viatrix'ele veel teisi ravimeid või olete seda hiljuti teinud või on võimalik, et hakkate lähitulevikus teisi ravimeid kasutama? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka taimsete ravimite või teiste ravimite kohta, mida saate ilma retseptita.

Mõned ravimid võivad mõjutada Ropinirol Viatrix'e toimet või suurendada kõrvaltoimete riski. Ropinirol Viatrix võib samuti mõjutada teiste ravimite toimet.

Need ravimid on muu hulgas:

- antidepressant fluvoxamiin
- ravimid teiste vaimse tervise probleemide jaoks, nagu sulpiriid
- hormoonasendusravi (tuntud ka kui HRT)
- metoklopramiid, ravim, mida kasutatakse iivelduse ja kõrvetiste raviks
- antibiootikumid tsiprofloksatsiin või enoksatsiin
- mõni muu ravim Parkinsoni tõve või „rahutute jalgade sündroomi“ raviks.

Rääkige oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mõnda neist ravimitest.

Kui te kasutate neid ravimeid koos ropinirooliga, tuleb võtta lisaks vereproove:

- K-vitamiini antagonistid (kasutatakse vere hüübimise vähendamiseks), nagu varfariin (coumadin)

#### Suitsetamine ja see ravim

Rääkige oma arstile, kui te olete selle ravimi kasutamise ajal suitsetamise lõpetanud või alustanud. Teie arst võib pidada vajalikuks teie annust kohandada.

#### Millele peaksite tähelepanu pöörama söögi ja joogi osas?

Kui te võtate seda ravimit koos toiduga, on teil väiksem tõenäosus tunda iiveldust või oksendada. Parim on seda ravimit võtta koos toiduga, kui see on võimalik.

#### Rasedus ja imetamine

Selle ravimi kasutamist raseduse ajal ei soovitata, välja arvatud juhul, kui teie arst soovib, et selle ravimi võtmise kasu on suurem kui võimalik risk teie sündimata lapsele. Seda ravimit ei soovitata, kui te toidate last rinnaga, kuna see võib mõjutada teie piimatootmist.

Rääkige oma arstile kohe, kui olete rase, arvate end olevat rase või plaanite rasestuda. Teie arst annab teile ka nõu, kui te toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Teie arst võib soovitada teil selle ravimi kasutamise lõpetada.

Oluline teave mõnede ainete kohta Ropinirolis

Ropiniroli tabletid sisaldavad väikest kogust suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab, et see on sisuliselt „naatriumivaba“.

### 3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Teile võidakse seda ravimit välja kirjutada ainsa ravimina Parkinsoni tõve või „rahutute jalgade sündroomi“ sümptomite raviks. Seda ravimit võib kasutada ka koos teise ravimiga, mida nimetatakse L-dopaks (tuntud ka kui levodopa).

Ärge andke seda ravimit lastele. Tavaliselt ei kirjutata seda ravimit alla 18-aastastele isikutele.

Neelake Ropinirol Viatris tablett(id) tervelt alla koos veega. Ärge närige ega purustage tabletti.

Selle ravimi täpne annus, mida kasutajad võtavad, võib erineda. Teie arst otsustab, millise annuse peate iga päev võtma, ja te peate järgima neid juhiseid. Kui alustate selle ravimiga esmakordselt, suurendatakse teie kasutatavat annust järk-järgult.

Kui palju seda ravimit peate võtma

Parkinsoni tõbi

Võib kuluda aega, enne kui selgub, milline on teile kõige sobivam annus. Ropiniroli tavaline algannus on 0,25 mg kolm korda päevas esimese nädala jooksul. Seejärel võib teie arst annust järgmise 3 nädala jooksul kord nädalas suurendada. Seejärel võib teie arst annust kohandada, kuni kasutate annust, mis teile kõige paremini sobib. Tavaline annus on 1 mg kuni 3 mg kolm korda päevas (mis vastab kogu päevaannusele 3 mg kuni 9 mg). Kui teie haiguse sümptomid ei parane piisavalt, võib teie arst otsustada annust järk-järgult suurendada. Mõned inimesed võtavad kuni 8 mg ropiniroli kolm korda päevas (24 mg kogu päevaannus).

Kui kasutate ka teisi ravimeid Parkinsoni tõve raviks, võib teie arst soovitada teise ravimi annust aeglaselt vähendada. Kui kasutate L-dopat, võite Ropiniroli kasutamise alustamisel kogeda kontrollimatuid liigutusi (düskeesia). Rääkige sellest oma arstile, kuna arst võib pidada vajalikuks teie ravimi annust kohandada.

### „Rahutute jalgade sündroom“

Võtke seda ravimit suu kaudu üks kord päevas, iga päev samal ajal. Tavaliselt võetakse seda ravimit enne magamaminekut, kuid seda võib võtta ka kuni kolm tundi enne magamaminekut.

Algannus on 0,25 mg üks kord päevas. Pärast kahte päeva võib teie arst annust suurendada 0,5 mg-ni üks kord päevas ülejäänud esimese ravinädala jooksul. Seejärel võib teie arst annust järgmise 3 nädala jooksul kord nädalas 0,5 mg võrra suurendada kuni 2 mg-ni päevas. Mõnedel patsientidel, kellel paranemine on ebapiisav, võib annust aeglaselt suurendada kuni maksimaalselt 4 mg-ni päevas. Pärast kolme kuu pikkust ravi selle ravimiga võib teie arst annust kohandada või ravi lõpetada, sõltuvalt teie sümptomitest ja enesetundest.

Ärge võtke seda ravimit rohkem, kui arst on soovitanud.

Võib kuluda paar nädalat, enne kui tunnete Ropiniroli kasutamisel paranemist.

Mida teha, kui teie sümptomid halvenevad

Mõnikord juhtub, et inimestel, kes seda ravimit võtavad, halvenevad „rahutute jalgade sündroomi“ sümptomid. Näiteks võivad sümptomid alata varem päeval või ilmnedä pärast lühikest puhkeperioodi. Või võivad sümptomid esineda teistes kehaosades, nagu käed.

Pöörduge oma arsti poole, kui teie sümptomid halvenevad.

Teie Ropinirol Viatrix annuse võtmine

Võtke oma Ropinirol Viatrix tablett(id) tervelt koos klaasi veega. Soovitatav on seda ravimit võtta koos toiduga, kuna see vähendab iivelduse riski.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga. Näidake neile võimalusel selle ravimi pakendit. Keegi, kes on võtnud ropinirooli üleannustuse, võib kogeda järgmisi sümptomeid: iiveldus, oksendamine, peapööritus (või tunne, et kõik keerleb), unisus, väsimus (vaimne või füüsiline väsimus), minestamine, hallutsinatsioonid.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Ärge võtke lisatablette ega kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha. Võtke järgmine tablett tavapärasel ajal.

Kui olete unustanud seda ravimit võtta ühe päeva või kauem, küsige oma arstilt nõu, kuidas uuesti alustada selle ravimi võtmist.

Kui lõpetate selle ravimi kasutamise

Võtke seda ravimit nii kaua, kui arst on teile soovitanud. Ärge lõpetage kasutamist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui lõpetate järsult selle ravimi kasutamise, võivad Parkinsoni tõve sümptomid kiiresti süveneda. Järsk lõpetamine võib viia meditsiinilise seisundini, mida nimetatakse 'pahaloomuline neuroleptiline sündroom'. See seisund võib olla tõsine terviserisk. Sümptomid on: akineesia (lihaskiirgustuste kaotus), jäigid lihased, palavik, ebastabiilne vererõhk, tahhükardia (kiirenenud südametegevus), segasus, teadvuse vähenemine (näiteks kooma).

Kui peate selle ravimi kasutamise lõpetama, vähendab teie arst järk-järgult teie annust.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

#### 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi kõrvaltoimed ilmnevad peamiselt siis, kui alustate ravi või kui annust on just suurendatud. Kõrvaltoimed on üldiselt kerged ja võivad olla vähem häirivad, kui olete annust mõnda aega kasutanud. Rääkige oma arstile, kui olete kõrvaltoimete pärast mures.

##### Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st, kes kasutavad Ropiniroli:  
minestamine (sünkoop)  
unisustunne, iiveldustunne

##### Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st, kes kasutavad Ropiniroli:  
hallutsinatsioonid (asjade nägemine, mida tegelikult ei ole);  
haige olemine (oksendamise);  
pearinglus (peapööritus);  
kõrvetised;  
kõhuvalu;  
jalgade, jalgade või käte turse;  
närvilisus;  
rahutute jalgade sündroomi süvenemine (sümptomid võivad ilmned varem kui tavaliselt või tugevamalt või mõjutada varem puutumata jäsemeid nagu käed või naasta varahommikul).

##### Mõnikord esinevad kõrvaltoimed

Need võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st, kes kasutavad Ropiniroli:  
madal vererõhk (hüpotensioon);  
pearinglus või minestamine, eriti järsku püsti tõustes (selle põhjustab vererõhu järsk langus);  
päeva jooksul väga unine olemine (äärmine unisus);  
äkiline uinumine ilma eelneva unisuseta (ootamatu uinumise perioodid);  
vaimsed probleemid nagu deliirium (raske segadus), luulud (ebamõistlikud mõtted) või paranoia (ebamõistlikud kahtlused);  
luksumine.

Mõnel patsiendil võivad esineda järgmised kõrvaltoimed (sagedus teadmata; ei saa olemasolevate andmete põhjal määrata)

allergiline reaktsioon nagu punased, sügelevad nahapunnid (nõgestõbi), näo, huulte, suu, keele või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskusi, nahalööve või intensiivne sügelus (vt lõik 2);  
agressiivsus;

Ropiniroli liigne kasutamine (soov suuremate dopaminergiliste ravimite annuste järele kui vaja mootorsete sümptomite raviks, tuntud kui dopamiini düsregulatsiooni sündroom);

pärast ropinirooli ravi lõpetamist või vähendamist võivad esineda järgmised kõrvaltoimed: Depressioon, apaatia, rahutus, väsimus, higistamine või valu (tuntud ka kui dopamiini agonisti ärajätusündroom (DAWS) või dopamiini agonisti ärajätusündroom);

maksa funktsiooni muutus, mis on näidatud vereanalüüsides;  
spontaanne peenise erektsioon.

Teil võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

võimetus vastu seista impulsile, tungile või kiusatusele teatud tegevust läbi viia, mis võib olla kahjulik teile või teistele, sealhulgas:

- o tugev tung liigselt hasartmänge mängida hoolimata tõsistest tagajärgedest teile isiklikult või teie perele
- o muutunud või suurenenud seksuaalne huvi, mis tekitab muret teile või teistele, näiteks suurenenud seksuaalne iha;
- o kontrollimatu ja liigne ostlemine või raha kulutamine;
- o liigsöömine (suurte toidukoguste söömine lühikese aja jooksul) või sundsöömine (rohkem toidu söömine kui on vaja nälja rahuldamiseks).

üliaktiivsuse, ülevoolavuse või ärrituvuse perioodid

Rääkige oma arstiga, kui teil esineb üks või mitu neist sümptomitest, et arutada, mis on parim viis nende vähendamiseks.

Kui kasutate seda ravimit koos L-dopaga

Isikud, kes kasutavad seda ravimit koos L-dopaga, võivad aja jooksul kogeda teisi kõrvaltoimeid:

kontrollimatud liigutused (düskineesia) on väga sageli esinev kõrvaltoime. Kui kasutate L-dopat, võite kogeda kontrollimatuid liigutusi (düskineesiat), kui alustate ropinirooli kasutamist. Rääkige oma arstiga, kui see juhtub, sest teie arst võib pidada vajalikuks teie ravimi annust kohandada.

segasus on sageli esinev kõrvaltoime.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest võite teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskusele Lareb (Veebisait: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Kõrvaltoimetest teatades saate aidata meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikusaja lõppu. See on märgitud pakendile pärast "EXP:". Seal on kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikusaja lõpp.

Seda ravimit ei ole vaja säilitada erilistes tingimustes.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või WC-sse ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

## 6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

- Selle ravimi toimeaine on ropinirool.  
Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg või 2 mg ropinirooli (vesinikkloriidina).
- Selle ravimi teised ained on: mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat (vt lõik 2 „Ropinirol Viatris sisaldab laktoosi“), kroskarmelloosnaatrium, hüpromelloos, magneesiumstearaat.

Õhukese polümeerikatte koostis:

0,25 mg: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, polüsorbaat.

0,5 mg: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, raudoksiid kollane (E172).

1 mg: hüpromelloos, makrogool, raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), indigokarmiin (E132).

2 mg: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool, raudoksiid punane (E172), raudoksiid kollane (E172).

Kuidas Ropinirol Viatris välja näeb ja kui palju on pakendis? Teie ravim on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena.

Ropinirol Viatris 0,25 mg: valged kuni murdvalged kapslikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, millel on mõlemal küljel poolitusjoon.

Ropinirol Viatris 0,5 mg: kollased, kapslikujulised, kaksikkumerad, õhukese polümeerikattega tabletid, millel on mõlemal küljel poolitusjoon.

Ropinirol Viatris 1 mg: rohelised, kapslikujulised, kaksikkumerad, kilekattega tabletid, millel on mõlemal küljel poolitusjoon.

Ropinirol Viatris 2 mg: heleroosad, kapslikujulised, kaksikkumerad, kilekattega tabletid, millel on mõlemal küljel poolitusjoon.

Tabletti saab jagada võrdseteks annusteks.

Ropinirol Viatris on saadaval HDPE pudelis PP korgiga, mis sisaldab 12 (ainult 0,25 mg), 21, 28, 84 ja 126 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Registreerimise omanik

Viatris Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Dublin, Iirimaa

Teabe ja teavituste saamiseks:

Mylan B.V.

Krijgsman 20  
Amstelveen

Tootja  
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories  
35/36 Baldoyle Industrial Estate  
Grange Road  
Dublin 13  
Iirimaa

Mylan Hungary Kft  
H-2900 Komarom  
Mylan utca 1  
Ungari

Mylan Germany GmbH  
Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1  
Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352  
Saksamaa

Ropinirol Viatrix on registreeritud järgmiste numbrite all:  
RVG 34856 (0,25 mg), RVG 34857 (0,5 mg), RVG 34858 (1 mg), RVG 34859 (2 mg)

See ravim on registreeritud EEA liikmesriikides järgmiste nimede all:

Belgia: 'Ropinirole Viatrix 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg kaetud tabletid'  
Tšehhi: 'Ropinirole Viatrix 2 mg potahované tablety'  
Taani: 'Ropinirol Viatrix 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'  
Prantsusmaa: 'Ropinirole Viatrix 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimé pelliculé'  
Saksamaa: 'Ropinirol dura 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg kaetud tabletid'  
Itaalia: 'Ropinirole Mylan Generics 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg kaetud tabletid'  
'kaetud filmiga'  
Portugal: 'Ropinirole Mylan 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'  
Slovakkia: 'Ropinirol Viatrix 1 mg/ 2 mg'  
Holland: 'Ropinirol Viatrix 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg kaetud tabletid'  
'kaetud filmiga'  
Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa): 'Ropinirole 0.25/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg kaetud tabletid'

See pakendi infoleht on viimati heaks kiidetud augustis 2023.