

## NOTICE : INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Ropinirole Viatris 0,25 mg, comprimés pelliculés  
Ropinirole Viatris 0,5 mg, comprimés pelliculés  
Ropinirole Viatris 1 mg, comprimés pelliculés  
Ropinirole Viatris 2 mg, comprimés pelliculés

Ropinirole (sous forme de chlorhydrate)

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Vous avez des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, même si elles ont les mêmes symptômes que vous, car il pourrait leur être nocif.

Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Ropinirole Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quand ne pas utiliser ce médicament ou quand devez-vous être particulièrement prudent ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables possibles
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que Ropinirole Viatris et dans quel cas est-il utilisé ?

La substance active de ce médicament est le ropinirole, qui appartient à un groupe de médicaments appelés agonistes de la dopamine. Les agonistes de la dopamine influencent le cerveau de la même manière que la substance naturelle dopamine.

Ce médicament est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont une faible quantité de dopamine dans certaines parties de leur cerveau. Ce médicament a un effet similaire à celui de la dopamine naturelle, ce qui aide à réduire les symptômes de la maladie de Parkinson.

Ce médicament est également utilisé pour le traitement du « syndrome des jambes sans repos » idiopathique modéré à sévère. Le « syndrome des jambes sans repos » modéré à sévère est caractéristique chez les patients qui ont des troubles du sommeil ou ressentent un inconfort sévère dans leurs jambes ou leurs bras.

Le « syndrome des jambes sans repos » est une affection qui se caractérise par un besoin irrésistible de bouger les jambes et parfois les bras, généralement en combinaison avec une sensation inconfortable telle que des picotements, une sensation de brûlure ou de piqûre. Ces

sensations apparaissent pendant les périodes de repos ou d'inactivité comme être assis ou couché, surtout au lit, et sont pires le soir ou la nuit.

Habituellement, seul le soulagement peut être atteint en marchant ou en bougeant les membres concernés, ce qui conduit souvent à des troubles du sommeil.

Ce médicament soulage l'inconfort et réduit le besoin de bouger les membres (symptômes qui perturbent le sommeil).

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ?

Si vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous pouvez trouver ces substances à la rubrique 6.

Si vous avez une maladie rénale grave.

Si vous avez une maladie du foie.

Informez votre médecin si vous pensez que l'une de ces situations s'applique à vous.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Les médicaments ne conviennent pas toujours à tout le monde. Votre médecin doit savoir avant que vous n'utilisiez ce médicament si vous souffrez ou avez souffert de l'une des affections suivantes :

vous êtes enceinte ou pensez l'être ;

vous allaitez ;

vous avez moins de 18 ans ;

si vous avez une maladie cardiaque grave;

si vous souffrez de graves problèmes de santé mentale

si vous remarquez que vous développez un comportement inhabituel et/ou des pulsions (comme un besoin excessif de jouer ou un besoin sexuel accru et/ou un comportement sexuel);

si vous ne tolérez pas certains sucres (comme le lactose)

Informez votre médecin si vous ressentez des symptômes tels que dépression, apathie, anxiété, fatigue, transpiration ou douleur après l'arrêt ou la réduction de votre traitement avec ce médicament (ceci est appelé le syndrome de sevrage des agonistes dopaminergiques ou DAWS). Si les problèmes persistent plus de quelques semaines, il peut être nécessaire que votre médecin ajuste votre dosage.

Informez votre médecin si vous ou quelqu'un de votre famille remarquez que vous développez le désir de vous comporter de manière inhabituelle et si vous ne pouvez pas résister à l'impulsion, au besoin ou à la tentation d'effectuer certaines activités qui pourraient être nuisibles pour vous-même ou pour les autres. Cela s'appelle des troubles du contrôle des impulsions et peut inclure des comportements tels que le jeu compulsif, la suralimentation, un besoin sexuel anormalement élevé ou une augmentation des pensées ou des sentiments sexuels. Votre médecin peut juger nécessaire d'ajuster ou d'arrêter votre traitement.

Informez votre médecin si vous ou votre famille/soignant remarquez que vous développez des périodes d'hyperactivité, d'euphorie ou d'irritabilité (symptômes de manie). Ceux-ci peuvent survenir avec ou sans les symptômes de troubles du contrôle des impulsions (voir ci-dessus). Il peut être nécessaire que votre médecin ajuste ou arrête le dosage.

Informez votre médecin si vous pensez qu'une de ces situations s'applique à vous. Votre médecin peut décider que ce médicament n'est pas adapté pour vous, ou que vous devez être surveillé de près pendant son utilisation.

Pendant l'utilisation de ce médicament

Informez votre médecin si vous ou votre famille remarquez que vous développez un comportement inhabituel (comme un besoin inhabituel de jouer ou un besoin sexuel accru et/ou un comportement sexuel) pendant l'utilisation de ce médicament. Votre médecin peut juger nécessaire d'ajuster ou d'arrêter votre dosage.

Conduite et utilisation de machines

Ce médicament peut vous rendre somnolent. Il peut rendre les gens très somnolents et parfois, les gens s'endorment très soudainement sans avertissement. Ce médicament peut provoquer des hallucinations (voir, entendre ou sentir des choses qui n'existent pas). Si vous en souffrez, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

Si vous souffrez de l'un de ces effets secondaires, vous ne devez pas conduire, utiliser des machines ou vous placer dans une situation où la somnolence ou l'endormissement pourrait causer un risque de blessure grave ou de décès pour vous-même (ou pour d'autres personnes). Ne participez pas à de telles activités tant que vous n'avez plus ces symptômes.

Informez votre médecin si cela pose un problème pour vous.

Prenez-vous d'autres médicaments?

Prenez-vous d'autres médicaments en plus de Ropinirol Viatris, ou en avez-vous pris récemment ou envisagez-vous d'en prendre dans un avenir proche? Informez-en votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux remèdes à base de plantes ou à d'autres médicaments que vous pouvez obtenir sans ordonnance.

Certains médicaments peuvent affecter la façon dont Ropinirol Viatris fonctionne ou peuvent augmenter le risque que vous ayez un effet secondaire. Ropinirol Viatris peut également affecter le fonctionnement d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent:

l'antidépresseur fluvoxamine

médicaments pour d'autres problèmes de santé mentale tels que le sulpiride  
thérapie de remplacement hormonal (également appelée THS)

métoclopramide, un médicament utilisé pour traiter les nausées et les brûlures  
d'estomac

les antibiotiques ciprofloxacine ou énoxacine

tout autre médicament pour le traitement de la maladie de Parkinson ou du syndrome  
des jambes sans repos.

Informez votre médecin si vous utilisez ou avez récemment utilisé l'un de ces médicaments.

Des prélèvements sanguins supplémentaires devront être effectués si vous utilisez ces médicaments en combinaison avec le ropinirole :

antagonistes de la vitamine K (utilisés pour réduire la coagulation du sang) tels que la warfarine (coumadin)

Fumer et ce médicament

Informez votre médecin si vous avez arrêté ou commencé à fumer pendant l'utilisation de ce médicament. Il se peut que votre médecin juge nécessaire d'ajuster votre dosage.

À quoi devez-vous faire attention avec la nourriture et les boissons ?

Si vous prenez ce médicament avec de la nourriture, vous avez moins de chances de vous sentir nauséux ou de vomir. Il est préférable de prendre ce médicament avec de la nourriture, si possible.

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse n'est pas recommandée, sauf si votre médecin vous conseille que le bénéfice pour vous de prendre ce médicament est supérieur au risque potentiel de nuire à votre enfant à naître. Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez, car il peut affecter votre production de lait.

Informez immédiatement votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être, ou si vous prévoyez de le devenir. Votre médecin vous conseillera également si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter. Votre médecin peut alors vous recommander d'arrêter l'utilisation de ce médicament.

Informations importantes sur certaines substances dans le Ropinirole

Les comprimés de Ropinirole contiennent une petite quantité d'un sucre appelé lactose.

Si votre médecin vous a informé que vous ne tolérez pas certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement 'sans sodium'.

### 3. Comment utilisez-vous ce médicament ?

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur la bonne utilisation ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament peut vous être prescrit comme seul médicament pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson ou du « syndrome des jambes sans repos ». Ce médicament peut également être utilisé en combinaison avec un autre médicament appelé L-dopa (également connu sous le nom de lévodopa).

Ne donnez pas ce médicament aux enfants. Ce médicament n'est normalement pas prescrit aux personnes de moins de 18 ans.

Avalez le(s) comprimé(s) de Ropinirol Viatris entier(s) avec de l'eau. Ne pas mâcher ou écraser le(s) comprimé(s).

La posologie exacte de ce médicament que les utilisateurs prennent peut varier. Votre médecin décidera de la dose que vous devez prendre chaque jour et vous devez suivre cette instruction. Lorsque vous commencez à utiliser ce médicament, la posologie que vous utilisez sera progressivement augmentée.

Quelle quantité de ce médicament devez-vous prendre

Maladie de Parkinson

Il peut falloir un certain temps pour déterminer quelle est la posologie la plus appropriée de ce médicament pour vous. La posologie initiale habituelle de ropinirole est de 0,25 mg trois fois par jour pendant la première semaine. Ensuite, votre médecin peut augmenter la posologie chaque semaine au cours des 3 semaines suivantes. Ensuite, votre médecin peut ajuster la posologie jusqu'à ce que vous utilisiez la posologie qui fonctionne le mieux pour vous. La posologie habituelle est de 1 mg à 3 mg trois fois par jour (ce qui correspond à une posologie quotidienne totale de 3 mg à 9 mg). Si vos symptômes de cette maladie ne s'améliorent pas suffisamment, votre médecin peut décider d'augmenter progressivement la posologie. Certaines personnes prennent jusqu'à 8 mg de ropinirole trois fois par jour (24 mg de posologie quotidienne totale).

Si vous utilisez également d'autres médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson, il se peut que votre médecin vous conseille de réduire lentement la posologie de l'autre médicament. Si vous utilisez de la L-dopa, vous pouvez ressentir des mouvements incontrôlés (dyskinésie) lorsque vous commencez à utiliser le Ropinirol. Informez votre médecin si cela se produit, car votre médecin peut juger nécessaire d'ajuster la posologie de votre médicament.

« Syndrome des jambes sans repos »

Prenez ce médicament une fois par jour par voie orale, chaque jour à la même heure. Ce médicament est généralement pris avant le coucher, mais peut également être pris jusqu'à trois heures avant le coucher.

La posologie initiale est de 0,25 mg une fois par jour. Après deux jours, votre médecin peut augmenter la posologie à 0,5 mg une fois par jour pour le reste de votre première semaine de traitement. Ensuite, votre médecin peut augmenter la posologie chaque semaine de 0,5 mg au cours des 3 semaines suivantes jusqu'à une posologie de 2 mg par jour. Chez certains patients avec une amélioration insuffisante, la posologie peut être augmentée lentement jusqu'à un maximum de 4 mg par jour. Après trois mois de traitement avec ce médicament, votre médecin peut ajuster la posologie ou arrêter le traitement, en fonction de vos symptômes et de votre ressenti.

Ne prenez pas plus de ce médicament que ce que votre médecin a conseillé.

Il peut falloir quelques semaines avant de ressentir une amélioration avec le Ropinirol.

Que faire si vos symptômes s'aggravent

Il arrive parfois que les personnes qui prennent ce médicament voient leurs symptômes du « syndrome des jambes sans repos » s'aggraver. Par exemple, que les symptômes commencent

plus tôt dans la journée ou apparaissent après une courte période de repos. Ou que les symptômes apparaissent dans d'autres parties du corps, comme les bras.

Consultez votre médecin si vos symptômes s'aggravent.

Prendre votre dose de Ropinirol Viatris

Prenez votre/vos comprimé(s) de Ropinirol Viatris entier(s) avec un verre d'eau. Il est conseillé de prendre ce médicament avec de la nourriture, car cela réduit le risque de nausées.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Montrez-leur, si possible, l'emballage de ce médicament.

Une personne ayant pris une surdose de ropinirole peut présenter les symptômes suivants : nausées, vomissements, vertiges (ou sensation de tourner), somnolence, fatigue (mentale ou physique), évanouissement, hallucinations.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

Ne prenez pas de comprimés supplémentaires ou de dose double pour compenser une dose oubliée. Prenez le comprimé suivant à l'heure habituelle.

Si vous avez oublié de prendre ce médicament pendant un jour ou plus, demandez conseil à votre médecin sur la façon de reprendre ce médicament.

Si vous arrêtez d'utiliser ce médicament

Prenez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l'a conseillé. Ne cessez pas de l'utiliser, sauf si votre médecin vous le recommande.

Si vous arrêtez soudainement d'utiliser ce médicament, les symptômes de la maladie de Parkinson peuvent s'aggraver rapidement. Un arrêt soudain pourrait entraîner une condition médicale appelée 'syndrome malin des neuroleptiques'. Cette condition peut représenter un risque sérieux pour la santé. Les symptômes incluent : akinésie (perte de mouvement musculaire), raideur musculaire, fièvre, pression artérielle instable, tachycardie (fréquence cardiaque élevée), confusion, diminution de la conscience (par exemple, coma).

Si vous devez arrêter d'utiliser ce médicament, votre médecin réduira progressivement votre dosage.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

#### 4. Effets indésirables possibles

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables de ce médicament apparaissent principalement lorsque vous commencez votre traitement ou lorsque la dose vient d'être augmentée. Les effets indésirables sont généralement légers et peuvent être moins gênants après un certain temps d'utilisation. Informez votre médecin si vous êtes préoccupé par les effets indésirables.

#### Effets indésirables très fréquents

Ceux-ci peuvent survenir chez plus de 1 personne sur 10 utilisant le Ropinirol :

- évanouissement (syncope)
- se sentir somnolent, se sentir malade (nausées)

#### Effets indésirables fréquents

Ceux-ci peuvent survenir chez jusqu'à 1 personne sur 10 utilisant le Ropinirol :

- hallucinations (voir des choses qui ne sont pas réellement là);
- être malade (vomir);
- vertiges (sensation de tête qui tourne);
- brûlures d'estomac;
- douleur à l'estomac;
- gonflement des jambes, des pieds ou des mains;
- nervosité;
- aggravation du « syndrome des jambes sans repos » (les symptômes peuvent apparaître plus tôt que d'habitude ou être plus sévères, ou affecter des membres auparavant non touchés comme les bras, ou réapparaître tôt le matin).

#### Effets secondaires parfois observés

Ceux-ci peuvent survenir chez jusqu'à 1 personne sur 100 utilisant le Ropinirole :

- basse pression artérielle (hypotension);
- étourdissements ou évanouissements, surtout en se levant brusquement (causés par une baisse soudaine de la pression artérielle);
- être très somnolent toute la journée (sommolence extrême);
- s'endormir soudainement sans avoir été préalablement somnolent (périodes de sommeil inattendu);
- problèmes mentaux tels que délire (confusion sévère), délires (pensées déraisonnables) ou paranoïa (soupçons déraisonnables);
- le hoquet.

Chez certains patients, les effets secondaires suivants peuvent survenir (fréquence inconnue; ne peut être déterminée avec les données disponibles)

- réaction allergique telle que gonflements rouges et démangeaisons sur la peau (urticaire), gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés à avaler ou à respirer, éruption cutanée ou démangeaisons intenses (voir rubrique 2);
- agressivité;
- utilisation excessive de Ropinirole (désir de doses plus élevées de médicaments dopaminergiques que nécessaire pour traiter les symptômes moteurs, connu sous le nom de syndrome de dysrégulation de la dopamine);
- après l'arrêt ou la réduction du traitement par ropinirole, les effets secondaires suivants peuvent survenir : dépression, apathie, agitation, fatigue, transpiration ou douleur (également connu sous le nom de syndrome de sevrage des agonistes dopaminergiques (DAWS) ou syndrome de sevrage des agonistes de la dopamine);
- changement de la fonction hépatique, qui est démontré par des tests sanguins;
- érection spontanée du pénis.

Vous pouvez ressentir les effets secondaires suivants :

l'incapacité de résister à une impulsion, une envie ou une tentation de réaliser une activité particulière, qui peut être nuisible pour vous ou pour d'autres, y compris :

- o une forte envie de jouer de manière excessive malgré des conséquences graves pour vous personnellement ou pour votre famille
- o un intérêt sexuel modifié ou accru, ce qui vous inquiète ou inquiète les autres, par exemple une augmentation de la libido;
- o achats ou dépenses d'argent incontrôlés et excessifs;
- o manger de manière excessive (consommer de grandes quantités de nourriture en peu de temps) ou manger de manière compulsive (manger plus de nourriture que nécessaire pour satisfaire votre faim).

périodes d'hyperactivité, d'euphorie ou d'irritabilité

Informez votre médecin si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, car il peut être discuté de la meilleure façon de les réduire.

Si vous utilisez ce médicament en combinaison avec la L-dopa

Les personnes qui utilisent ce médicament en combinaison avec la L-dopa peuvent développer d'autres effets secondaires au fil du temps :

les mouvements incontrôlés (dyskinésie) sont un effet secondaire très fréquent. Si vous utilisez la L-dopa, vous pouvez ressentir des mouvements incontrôlés (dyskinésie) lorsque vous commencez à utiliser le ropinirole. Informez votre médecin si cela se produit, car votre médecin peut juger nécessaire d'ajuster la posologie de votre médicament.

la confusion est un effet secondaire fréquent.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique également aux effets secondaires possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le Centre Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb (Site web : [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). En signalant les effets secondaires, vous pouvez nous aider à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

## 5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Elle est indiquée sur l'emballage après « EXP: ». Il y a un mois et une année. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou dans les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Ils seront détruits de manière responsable et ne pollueront pas l'environnement.

## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles sont les substances contenues dans ce médicament ?

- La substance active de ce médicament est le ropinirole.  
Chaque comprimé pelliculé contient 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg ou 2 mg de ropinirole (sous forme d'hydrochloride).
- Les autres substances dans ce médicament sont : cellulose microcristalline, lactose monohydraté (voir rubrique 2 « Ropinirol Viatris contient du lactose »), croscarmellose sodique, hypromellose, stéarate de magnésium.

Le pelliculage contient :

0,25 mg : hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol, polysorbate.

0,5 mg : hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol, oxyde de fer jaune (E172).

1 mg : hypromellose, macrogol, oxyde de fer (E172), dioxyde de titane (E171), indigotine

(E132). 2 mg : hypromellose, dioxyde de titane (E171), macrogol, oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172).

À quoi ressemble Ropinirol Viatris et combien y en a-t-il dans un emballage ? Votre médicament est fourni sous forme de comprimé pelliculé.

Ropinirol Viatris 0,25 mg : comprimés pelliculés, blancs à blanc cassé, en forme de capsule, biconvexes, avec une barre de cassure sur les deux faces.

Ropinirol Viatris 0,5 mg : comprimés pelliculés, jaunes, en forme de capsule, biconvexes, avec une barre de cassure sur les deux faces.

Ropinirole Viatris 1 mg : comprimés pelliculés verts, en forme de capsule, biconvexes, avec une barre de cassure des deux côtés.

Ropinirole Viatris 2 mg : comprimés pelliculés rose clair, en forme de capsule, biconvexes, avec une barre de cassure des deux côtés.

Le comprimé peut être divisé en doses égales.

Ropinirole Viatris est disponible en flacon HDPE avec fermeture PP de 12 (seulement 0,25 mg), 21, 28, 84 et 126 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'enregistrement

Viatris Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Dublin, Irlande

Pour information et renseignements :

Mylan B.V.

Krijgsman 20

Amstelveen

Fabricant

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate  
Grange Road  
Dublin 13  
Irlande

Mylan Hungary Kft  
H-2900 Komarom  
Mylan utca 1  
Hongrie

Mylan Germany GmbH  
Succursale Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1  
Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352  
Allemagne

Ropinirole Viatris est enregistré sous les numéros suivants :  
RVG 34856 (0,25 mg), RVG 34857 (0,5 mg), RVG 34858 (1 mg), RVG 34859 (2 mg)

Ce médicament est enregistré dans les États membres de l'EEE sous les noms suivants :

Belgique : 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés pelliculés'  
République tchèque : 'Ropinirole Viatris 2 mg comprimés pelliculés'  
Danemark : 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'  
France : 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimé pelliculé'  
Allemagne : 'Ropinirol dura 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés pelliculés'  
Italie : 'Ropinirolo Mylan Generics 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés enrobés de film'  
Portugal : 'Ropinirole Mylan 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'  
Slovaquie : 'Ropinirol Viatris 1 mg/ 2 mg'  
Pays-Bas : 'Ropinirol Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés pelliculés tabletten'  
Royaume-Uni (Irlande du Nord) : 'Ropinirole 0.25/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimés pelliculés'

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en août 2023.