

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Ropinirol Viatris 0,25 mg, comprimate filmate
Ropinirol Viatris 0,5 mg, comprimate filmate
Ropinirol Viatris 1 mg, comprimate filmate
Ropinirol Viatris 2 mg, comprimate filmate

Ropinirol (sub formă de clorhidrat)

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie să-l recitiți.

Aveți întrebări suplimentare? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.

Aveți reacții adverse menționate la punctul 4? Sau aveți o reacție adversă care nu este menționată în acest prospect? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Conținutul acestui prospect

1. Ce este Ropinirol Viatris și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Ropinirol Viatris și pentru ce se utilizează acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este ropinirol, care aparține unui grup de medicamente numite agoniști dopaminergici. Agoniștii dopaminergici influențează creierul în același mod ca substanța naturală dopamină.

Acest medicament este utilizat în tratamentul bolii Parkinson.

Persoanele cu boala Parkinson au o cantitate scăzută de dopamină în anumite părți ale creierului lor. Acest medicament are un efect similar cu dopamina naturală, ajutând astfel la reducerea simptomelor bolii Parkinson.

Acest medicament este de asemenea utilizat pentru tratamentul sindromului picioarelor neliniștite idiopatic de la moderat la sever. Sindromul picioarelor neliniștite de la moderat la sever este caracteristic pacienților care au tulburări de somn sau disconfort sever în picioare sau brațe.

Sindromul picioarelor neliniștite este o afecțiune caracterizată printr-o nevoie irezistibilă de a mișca picioarele și uneori brațele, de obicei în combinație cu un senzație inconfortabilă precum furnicături, senzație de arsură sau înțepături. Aceste senzații apar în perioadele de

repaus sau inactivitate, cum ar fi șederea sau culcatul, în special în pat, și sunt mai grave seara sau noaptea.

De obicei, ușurarea poate fi obținută doar prin mers sau prin mișcarea membrelor afectate, ceea ce duce adesea la tulburări de somn.

Acest medicament ameliorează disconfortul și reduce nevoia de a mișca membrele (simptome care perturbă somnul).

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de atent?

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Dacă sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.

Dacă aveți o boală renală severă.

Dacă aveți o afecțiune hepatică.

Informați medicul dumneavoastră dacă credeți că una dintre aceste situații vi se aplică.

Când trebuie să fiți deosebit de atent cu acest medicament?

Consultați-vă cu medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament.

Medicamentele nu sunt întotdeauna potrivite pentru toată lumea. Medicul dumneavoastră trebuie să știe înainte de a utiliza acest medicament dacă suferiți sau ați suferit de una dintre următoarele afecțiuni:

sunteți gravidă sau credeți că sunteți gravidă;

alăptați;

aveți sub 18 ani;

aveți o afecțiune cardiacă gravă;

aveți probleme grave de sănătate mintală

observați că dezvoltați un comportament neobișnuit și/sau o tendință (cum ar fi o dorință excesivă de a juca jocuri de noroc sau o nevoie sexuală crescută și/sau comportament sexual);

nu tolerați anumite zaharuri (cum ar fi lactoza)

Informați-vă medicul dacă experimentați simptome precum depresie, apatie, anxietate, oboseală, transpirație sau durere după oprirea sau reducerea tratamentului cu acest medicament (acest lucru este cunoscut sub numele de sindrom de sevraj al agonistului dopaminei sau DAWS). Dacă problemele persistă mai mult de câteva săptămâni, poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă ajusteze doza.

Informați-vă medicul dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră observă că dezvoltați dorința de a vă comporta într-un mod neobișnuit și dacă nu puteți rezista impulsului, dorinței sau tentației de a efectua anumite activități care pot fi dăunătoare pentru dumneavoastră sau pentru alții. Acestea sunt numite tulburări de control al impulsurilor și pot fi asociate cu comportamente precum jocurile de noroc compulsive, mâncatul excesiv, o dorință sexuală anormal de mare sau o creștere a gândurilor sau sentimentelor sexuale. Medicul dumneavoastră poate considera necesar să vă ajusteze sau să oprească tratamentul.

Informați-vă medicul dacă dumneavoastră sau familia/îngrijitorul dumneavoastră observă că dezvoltați perioade de hiperactivitate, euforie sau iritabilitate (simptome de manie). Acestea pot apărea cu sau fără simptomele de anomalii în controlul impulsurilor (vezi mai sus). Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să ajusteze sau să oprească doza.

Informați-vă medicul dacă credeți că una dintre aceste situații vi se aplică. Medicul dumneavoastră poate decide că acest medicament nu este potrivit pentru dumneavoastră sau că trebuie să fiți monitorizat suplimentar în timpul utilizării acestuia.

În timpul utilizării acestui medicament

Informați-vă medicul dacă dumneavoastră sau familia dumneavoastră observă că dezvoltați un comportament neobișnuit (cum ar fi o dorință neobișnuită de a juca jocuri de noroc sau o nevoie sexuală crescută și/sau comportament sexual) în timpul utilizării acestui medicament. Medicul dumneavoastră poate considera necesar să vă ajusteze sau să oprească doza.

Aptitudinea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Acest medicament vă poate face somnolent. Poate face ca oamenii să se simtă foarte somnoroși și uneori oamenii adorm foarte brusc fără avertisment. Acest medicament poate provoca halucinații (vederea, auzirea sau simțirea lucrurilor care nu există). Dacă suferiți de acestea, nu trebuie să conduceți sau să folosiți utilaje.

Dacă ați putea suferi de una dintre aceste reacții adverse, nu trebuie să conduceți, să folosiți utilaje și să nu vă puneți într-o situație în care somnolența sau adormirea ar putea cauza un risc de rănire gravă sau deces pentru dumneavoastră (sau pentru alte persoane). Nu participați la astfel de activități până când nu mai aveți aceste simptome.

Informați-vă medicul dacă aceasta este o problemă pentru dumneavoastră.

Utilizați alte medicamente?

Utilizați alte medicamente pe lângă Ropinirol Viatris, sau ați făcut-o recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Informați-vă medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru medicamentele pe bază de plante sau alte medicamente pe care le puteți obține fără prescripție medicală.

Unele medicamente pot afecta modul în care Ropinirol Viatris funcționează sau pot crește șansa de a avea o reacție adversă. Ropinirol Viatris poate afecta, de asemenea, funcționarea altor medicamente.

Aceste medicamente includ:

- medicamentul antidepresiv fluvoxamină
- medicamente pentru alte probleme de sănătate mintală, cum ar fi sulpirida
- terapie de substituție hormonală (numită și HRT)
- metoclopramid, un medicament utilizat pentru a trata greața și arsurile la stomac
- antibioticele ciprofloxacina sau enoxacina
- orice alt medicament pentru tratamentul bolii Parkinson sau „Sindromul picioarelor neliniștite”.

Informați medicul dumneavoastră dacă utilizați sau ați utilizat recent unul dintre aceste medicamente.

Va trebui să vi se ia sânge suplimentar dacă utilizați aceste medicamente în combinație cu ropinirol:

antagoniști ai vitaminei K (utilizați pentru a reduce coagularea sângelui) cum ar fi warfarina (coumadin)

Fumatul și acest medicament

Informați medicul dumneavoastră dacă ați încetat sau ați început să fumați în timpul utilizării acestui medicament. Este posibil ca medicul dumneavoastră să considere necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

La ce trebuie să fiți atenți cu mâncarea și băutura?

Dacă luați acest medicament cu alimente, aveți mai puține șanse să vă simțiți greață sau să vomăți. Este cel mai bine să luați acest medicament cu alimente, dacă este posibil.

Sarcina și alăptarea

Utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii nu este recomandată, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă sfătuiește că beneficiul pentru dumneavoastră de a lua acest medicament este mai mare decât riscul posibil de a dăuna copilului dumneavoastră nenăscut. Acest medicament nu este recomandat dacă alăptați, deoarece poate influența producția de lapte.

Informați imediat medicul dumneavoastră dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Medicul dumneavoastră vă va oferi, de asemenea, sfaturi dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Medicul dumneavoastră vă poate recomanda să întrerupeți utilizarea acestui medicament.

Informații importante despre unele substanțe din Ropinirol

Comprimatele de Ropinirol conțin o cantitate mică de zahăr numit lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că nu tolerați anumite zaharuri, contactați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per comprimat, adică este în esență „fără sodiu”.

3. Cum utilizați acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Atunci contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Acest medicament vă poate fi prescris ca singurul medicament pentru a trata simptomele bolii Parkinson sau „sindromul picioarelor neliniștite”. Acest medicament poate fi utilizat și în combinație cu un alt medicament numit L-dopa (cunoscut și sub numele de levodopa).

Nu dați acest medicament copiilor. Acest medicament nu este de obicei prescris persoanelor mai tinere de 18 ani.

Înghițiți comprimatul(ele) de Ropinirol Viatriș înțreg(i) cu apă. Nu mestecați sau zdrobiți comprimatul(ele).

Doza exactă de acest medicament pe care o iau utilizatorii poate varia. Medicul dumneavoastră va decide ce doză trebuie să luați în fiecare zi și trebuie să respectați această instrucțiune. Când începeți să utilizați acest medicament, doza pe care o utilizați va fi crescută treptat.

Cât de mult din acest medicament trebuie să luați

Boala Parkinson

Poate dura ceva timp până când se stabilește care este doza cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Doza inițială obișnuită de ropinirol este de 0,25 mg de trei ori pe zi în prima săptămână. După aceasta, medicul dumneavoastră poate crește doza săptămânal în următoarele 3 săptămâni. După aceasta, medicul dumneavoastră poate ajusta doza până când utilizați doza care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră. Doza obișnuită este de 1 mg până la 3 mg de trei ori pe zi (ceea ce corespunde unei doze zilnice totale de 3 mg până la 9 mg). În cazul în care simptomele bolii nu se îmbunătățesc suficient, medicul dumneavoastră poate decide să crească treptat doza. Unele persoane iau până la 8 mg de ropinirol de trei ori pe zi (24 mg doză zilnică totală).

În cazul în care utilizați și alte medicamente pentru tratamentul bolii Parkinson, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să reduceți treptat doza celuilalt medicament. Dacă utilizați L-dopa, puteți experimenta mișcări necontrolate (diskinezie) când începeți să utilizați Ropinirol. Informați medicul dumneavoastră dacă acest lucru se întâmplă, deoarece medicul dumneavoastră poate considera necesar să ajusteze doza medicației dumneavoastră.

„Sindromul picioarelor neliniștite”

Luați acest medicament o dată pe zi pe cale orală, în fiecare zi la aceeași oră. Acest medicament este de obicei luat înainte de culcare, dar poate fi luat și cu până la trei ore înainte de culcare.

Doza inițială este de 0,25 mg o dată pe zi. După două zile, medicul dumneavoastră poate crește doza la 0,5 mg o dată pe zi pentru restul primei săptămâni de tratament. După aceasta, medicul dumneavoastră poate crește doza săptămânal cu 0,5 mg în următoarele 3 săptămâni până la o doză de 2 mg pe zi. La unii pacienți cu îmbunătățiri insuficiente, doza poate fi crescută treptat până la un maxim de 4 mg pe zi. După trei luni de tratament cu acest medicament, medicul dumneavoastră poate ajusta doza sau poate opri tratamentul, în funcție de simptomele dumneavoastră și de cum vă simțiți.

Nu luați mai mult din acest medicament decât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Poate dura câteva săptămâni până când simțiți o îmbunătățire cu Ropinirol.

Ce trebuie să faceți dacă simptomele dumneavoastră se agravează
Ocazional, se întâmplă ca persoanele care iau acest medicament să experimenteze o agravare a simptomelor „sindromului picioarelor neliniștite”. De exemplu, simptomele pot începe mai devreme în timpul zilei sau pot apărea după o perioadă scurtă de repaus. Sau simptomele pot apărea în alte părți ale corpului, cum ar fi brațele.

Mergeți la medicul dumneavoastră dacă simptomele dumneavoastră se agravează.

Luarea dozei dumneavoastră de Ropinirol Viatris

Luați comprimatul(ele) de Ropinirol Viatris întreg(i) cu un pahar de apă. Se recomandă să luați acest medicament cu alimente, deoarece astfel riscul de greață este mai mic.

Ați utilizat prea mult din acest medicament?

Contactați imediat medicul sau farmacistul dumneavoastră. Arătați-le, dacă este posibil, ambalajul acestui medicament.

Cineva care a luat o supradoză de ropinirol poate prezenta următoarele simptome: greață, vărsături, amețeli (sau senzația că se învâрте), somnolență, oboseală (oboseală mentală sau fizică), leșin, halucinații.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Nu luați tablete suplimentare sau o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. Luați următoarea tabletă la ora obișnuită.

Dacă ați uitat să luați acest medicament o zi sau mai mult, întrebați medicul dumneavoastră cum să reluați administrarea acestui medicament.

Dacă încetați să utilizați acest medicament

Luați acest medicament atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Nu întrerupeți utilizarea, decât dacă medicul dumneavoastră vă sfătuiește acest lucru.

Dacă încetați brusc să utilizați acest medicament, simptomele bolii Parkinson se pot agrava rapid. O întrerupere bruscă ar putea duce la dezvoltarea unei afecțiuni medicale numite 'sindrom neuroleptic malign'. Această afecțiune poate reprezenta un risc grav pentru sănătate. Simptomele sunt: akinezie (pierderea mișcării musculare), rigiditate musculară, febră, tensiune arterială instabilă, tahicardie (ritm cardiac crescut), confuzie, conștiență redusă (de exemplu, comă).

Dacă trebuie să opriți utilizarea acestui medicament, medicul dumneavoastră va reduce treptat doza.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

4. Posibile efecte secundare

Ca orice medicament, și acest medicament poate avea efecte secundare, deși nu toată lumea le experimentează.

Efectele secundare ale acestui medicament vor apărea în special atunci când începeți tratamentul sau când doza tocmai a fost crescută. Efectele secundare sunt, în general, ușoare și pot fi mai puțin deranjante după ce ați utilizat doza pentru o perioadă de timp. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți îngrijorat de efectele secundare.

Efecte secundare foarte frecvente

Acestea pot apărea la mai mult de 1 din 10 persoane care utilizează Ropinirol:

leșin (sincopă)
senzație de somnolență, senzație de greață

Efecte secundare frecvente

Acestea pot apărea la maximum 1 din 10 persoane care utilizează Ropinirol:

halucinații (văzând lucruri care nu sunt reale);
a fi bolnav (vărsături);
amețeală (senzație de vertij);
arsuri la stomac;
dureri de stomac;
umflarea picioarelor, mâinilor sau a tălpilor;
nervozitate;
agravarea „sindromului picioarelor neliniștite” (simptomele pot apărea mai devreme decât de obicei sau mai intens, sau pot afecta membrele anterior neafectate, cum ar fi brațele, sau pot reveni dimineața devreme).

Reacții adverse care apar uneori

Acestea pot apărea la maximum 1 din 100 de persoane care utilizează Ropinirol:

tensiune arterială scăzută (hipotensiune);
amețeli sau leșin, în special la ridicarea bruscă (cauzate de o scădere bruscă a tensiunii arteriale);
somniază extremă pe parcursul zilei;
adormire bruscă fără a fi somnoros înainte (perioade de adormire neașteptată);
probleme mentale precum delir (confuzie severă), iluzii (gânduri nerezonabile) sau paranoia (suspiciuni nerezonabile);
sughiț.

La unii pacienți pot apărea următoarele reacții adverse (frecvență necunoscută; nu poate fi determinată din datele disponibile)

reacție alergică precum umflături roșii, mâncărime pe piele (urticarie), umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului care poate cauza dificultăți la înghițire sau respirație, erupții cutanate sau mâncărime intensă (vezi secțiunea 2);
agresivitate;
utilizarea excesivă a Ropinirol (dorința de doze mai mari de medicamente dopaminergice decât cele necesare pentru a trata simptomele motorii, cunoscută sub numele de sindrom de dereglare a dopaminei);
după oprirea sau reducerea tratamentului cu ropinirol pot apărea următoarele reacții adverse: depresie, apatie, neliniște, oboseală, transpirație sau durere (cunoscut și sub numele de sindrom de sevraj al agonistului dopaminei (DAWS) sau sindrom de retragere a agonistului dopaminei);
modificare a funcției hepatice, care sunt demonstrate în testele de sânge;
erecție spontană a penisului.

Puteți avea următoarele reacții adverse:

incapacitatea de a rezista unui impuls, dorință sau tentație de a efectua o anumită activitate, care poate fi dăunătoare pentru dumneavoastră sau pentru alții, inclusiv:

- o dorință puternică de a juca excesiv la jocuri de noroc, în ciuda consecințelor grave pentru dumneavoastră personal sau pentru familia dumneavoastră
- o interes sexual modificat sau crescut, care vă îngrijorează pe dumneavoastră sau pe alții, de exemplu, o dorință sexuală crescută;
- o cumpărături sau cheltuieli necontrolate și excesive;

- o mâncat excesiv (consumul unor cantități mari de alimente într-o perioadă scurtă) sau mâncat compulsiv (consumul de mai multe alimente decât este necesar pentru a vă satisface foamea).
- perioade de hiperactivitate, euforie sau iritabilitate

Spuneți medicului dumneavoastră dacă experimentați unul sau mai multe dintre aceste simptome, deoarece se poate discuta care este cea mai bună modalitate de a le reduce.

Dacă utilizați acest medicament în combinație cu L-dopa

Persoanele care utilizează acest medicament în combinație cu L-dopa pot dezvolta în timp alte reacții adverse:

- mișcărilor necontrolate (diskinezie) sunt o reacție adversă foarte frecventă. Dacă utilizați L-dopa, puteți experimenta mișcări necontrolate (diskinezie) când începeți să utilizați ropinirol. Spuneți medicului dumneavoastră dacă acest lucru se întâmplă, deoarece medicul dumneavoastră poate considera necesar să ajusteze doza medicamentului dumneavoastră.
- confuzia este o reacție adversă frecventă.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru se aplică și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin Centrul Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb (Website: www.lareb.nl). Raportând reacțiile adverse, ne puteți ajuta să obținem mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP:”. Aceasta constă într-o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați medicamentele pe calea apei uzate sau a deșeurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse într-un mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

- Substanța activă din acest medicament este ropinirol. Fiecare comprimat filmat conține 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg sau 2 mg ropinirol (sub formă de clorhidrat).
- Celelalte substanțe din acest medicament sunt: celuloză microcristalină, lactoză monohidrat (vezi secțiunea 2 „Ropinirol Viatrix conține lactoză”), croscarmeloză sodică, hipromeloză, stearat de magneziu.

Filmul de acoperire conține:

0,25 mg: hipromeloză, dioxid de titan (E171), macrogol, polisorbat.

0,5 mg: hipromeloză, dioxid de titan (E171), macrogol, oxid de fier galben (E172).

1 mg: hipromeloză, macrogol, oxid de fier (E172), dioxid de titan (E171), indigocarmine (E132).

2 mg: hipromeloză, dioxid de titan (E171), macrogol, oxid de fier roșu (E172), oxid de fier galben (E172).

Cum arată Ropinirol Viatris și ce conține ambalajul? Medicamentul dumneavoastră este furnizat sub formă de comprimate filmate.

Ropinirol Viatris 0,25 mg: comprimate filmate albe până la alb-gălbui, de formă capsulară, biconvexe, cu linie mediană pe ambele fețe.

Ropinirol Viatris 0,5 mg: comprimate filmate galbene, de formă capsulară, biconvexe, cu linie mediană pe ambele fețe.

Ropinirol Viatris 1 mg: comprimate filmate, verzi, de formă capsulă, biconvexe, cu o linie de rupere pe ambele părți.

Ropinirol Viatris 2 mg: comprimate filmate, roz deschis, de formă capsulă, biconvexe, cu o linie de rupere pe ambele părți.

Comprimatele pot fi divizate în doze egale.

Ropinirol Viatris este disponibil într-un flacon HDPE cu închidere PP de 12 (doar 0,25 mg), 21, 28, 84 și 126 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul înregistrării

Viatris Ltd

Parcul Industrial Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Dublin, Irlanda

Pentru informații și clarificări:

Mylan B.V.

Krijgsman 20

Amstelveen

Producător

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlanda

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom

Mylan utca 1

Ungaria

Mylan Germany GmbH
Sucursala Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1
Bad Homburg v. d. Hoehe, Hessen, 61352
Germania

Ropinirol Viatris este înregistrat în registru sub următoarele numere:
RVG 34856 (0,25 mg), RVG 34857 (0,5 mg), RVG 34858 (1 mg), RVG 34859 (2 mg)

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale SEE sub următoarele denumiri:

Belgia: 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimate filmate'
Cehia: 'Ropinirole Viatris 2 mg comprimate filmate'
Danemarca: 'Ropinirol Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'
Franța: 'Ropinirole Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimat filmat'
Germania: 'Ropinirol dura 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimate filmate'
Italia: 'Ropinirolo Mylan Generics 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimate
filmate'
acoperite cu film'
Portugalia: 'Ropinirole Mylan 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg'
Slovacia: 'Ropinirol Viatris 1 mg/ 2 mg'
Olanda: 'Ropinirol Viatris 0.25 mg/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimate filmate'
tablete'
Regatul Unit (Irlanda de Nord): 'Ropinirole 0.25/ 0.5 mg/ 1 mg/ 2 mg comprimate filmate'

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în august 2023.