

Bipacksedel: information för användaren

Crestor 5, filmdragerade tabletter 5 mg
Crestor 10, filmdragerade tabletter 10 mg
Crestor 20, filmdragerade tabletter 20 mg
Crestor 40, filmdragerade tabletter 40 mg
Rosuvastatin

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är ordinerat endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Innehåll i denna bipacksedel

1. Vad är Crestor och vad används detta läkemedel för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Crestor och vad används detta läkemedel för?

Crestor är ett läkemedel som tillhör gruppen statiner.

Din läkare har ordinerat Crestor till dig eftersom:

- Du har mycket kolesterol i ditt blod. Detta innebär att du har en ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Crestor används hos vuxna, ungdomar upp till 18 år och barn från 6 år för att behandla förhöjt kolesterol.
- Mer motion och förändring av din kost har inte hjälpt tillräckligt för att minska mängden kolesterol i ditt blod. Därför har du fått rådet att ta en statin. Under användningen av Crestor bör du fortsätta att motionera mer och följa din kost.

Eller:

- Du har av en annan anledning en ökad risk för att få en hjärtinfarkt, en stroke eller en liknande sjukdom.

En hjärtinfarkt, en stroke och andra problem kan vara resultatet av en sjukdom som kallas åderförkalkning. Åderförkalkning orsakas av ansamling av fettliknande ämnen i dina artärer.

Varför är det viktigt att du fortsätter använda Crestor?

Crestor används för att korrigera mängden fettliknande ämnen i ditt blod, som kallas lipider. Den vanligaste lipiden är kolesterol.

I blodet finns olika typer av kolesterol – 'dåligt' kolesterol (LDL-C) och 'bra' kolesterol (HDL-C).

- Crestor kan sänka mängden 'dåligt' kolesterol och öka mängden 'bra' kolesterol.
- Det fungerar genom att hämma produktionen av 'dåligt' kolesterol i din kropp. Det förbättrar också din kropps förmåga att ta bort 'dåligt' kolesterol från ditt blod.

De flesta människor märker inte att de har för mycket kolesterol eftersom de inte har några symtom. Om du inte gör något kan fett fastna i dina blodkärl. Dina blodkärl kan då bli smalare.

Ibland kan dessa förträngda blodkärl bli helt igensatta. Ditt blod kan då inte flöda ordentligt till ditt hjärta eller hjärna. Detta kan leda till en hjärtinfarkt eller en stroke. Genom att sänka mängden kolesterol i ditt blod minskar du risken för att få en hjärtinfarkt, stroke eller liknande sjukdom.

Det är viktigt att du fortsätter använda Crestor, även om mängden kolesterol i ditt blod är bra igen. Om du fortsätter använda Crestor ser du till att mängden kolesterol i ditt blod inte ökar igen och förhindrar ansamlingar av fettliknande ämnen. Du bör dock sluta använda Crestor om din läkare säger det, eller om du är gravid.

2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta läkemedel?

- Om du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel. Dessa ingredienser finns i avsnitt 6 i denna bipacksedel.
- Om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du använder Crestor, måste du omedelbart sluta använda det. Informera din läkare om detta. Som kvinna bör du undvika att bli gravid när du använder Crestor. Du bör därför använda bra preventivmedel.
- Om du har en leversjukdom.
- Om du har allvarliga njurproblem.
- Om du ofta eller oväntat har muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelkramp.
- Om du använder en läkemedelskombination av sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (detta används mot en virusinfektion i levern som kallas hepatit C).
- Om du använder läkemedlet ciklosporin (detta används till exempel efter organtransplantation).
- Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), kontakta din läkare.

Dessutom, använd inte Crestor 40 mg (den högsta dosen):

- Om du har måttliga njurproblem (fråga din läkare om du är osäker).
- Om din sköldkörtel inte fungerar som den ska.
- Om du ofta eller oväntat har haft muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelkramp. Om du eller andra i din familj tidigare har haft muskelproblem eller muskelproblem på grund av användning av ett annat läkemedel mot högt kolesterol.
- Om du ofta dricker mycket alkohol.

- Om du är av asiatisk härkomst (från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller Indien).
- Om du använder fibrater. Fibrater är andra läkemedel för att sänka kolesterolhalten i ditt blod.
- Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), kontakta din läkare.

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?

- Om du har problem med dina njurar.
- Om du har problem med din lever.
- Om du ofta eller oväntat har haft muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelkramp. Om du eller andra i din familj tidigare har haft muskelproblem eller muskelproblem på grund av användning av ett annat läkemedel mot högt kolesterol. Om du har oväntad muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelkramp, särskilt om du känner dig sjuk eller har feber, ska du omedelbart berätta det för din läkare. Informera också din läkare eller apotekare om du ständigt har muskelsvaghet.
- om du har myasthenia (en sjukdom där generell muskelsvaghet uppstår, i vissa fall även i muskler som används vid andning) eller okulär myasthenia (en sjukdom som orsakar ögonmuskelsvaghet), eftersom statiner ibland kan förvärra tillståndet eller leda till uppkomsten av myasthenia (se avsnitt 4).
- Om du någonsin har fått ett allvarligt hudutslag eller hudavflagning, blåsor och/eller munsår efter att ha tagit Crestor eller andra relaterade läkemedel.
- Om du regelbundet dricker mycket alkohol.
- Om din sköldkörtel inte fungerar som den ska.
- Om du använder fibrater. Fibrater är andra läkemedel för att sänka kolesterolhalten i ditt blod. Läs denna bipacksedel noggrant, även om du tidigare har använt andra läkemedel mot högt kolesterol.
- Om du använder läkemedel mot en HIV-infektion, till exempel ritonavir med lopinavir och/eller atazanavir. Se "Använder du andra läkemedel?".
- Om du just nu, eller under de senaste 7 dagarna, har använt ett läkemedel som heter fusidinsyra (används mot bakterieinfektioner), oralt (via munnen) eller injicerat. Kombinationen av fusidinsyra och Crestor kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys). Se "Använder du andra läkemedel?".
- Om du är äldre än 70 år (eftersom din läkare måste välja rätt startdos av Crestor som passar dig).
- Om du har en allvarligt nedsatt lungfunktion.
- Om du är av asiatisk härkomst – det vill säga från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller Indien. Din läkare måste välja rätt startdos av Crestor som passar dig.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker):

- Då får du inte ta Crestor 40 mg (den högsta dosen). Du måste först fråga din läkare eller apotekare om du får använda Crestor.

Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats i samband med behandling med Crestor. Sluta använda Crestor och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av de symtom som beskrivs i avsnitt 4.

Hos ett litet antal personer kan statiner påverka leverns funktion. Detta kan din läkare undersöka med ett enkelt test. Detta test visar om mängden leverenzym i ditt blod är

förhöjd. Därför kan din läkare göra detta blodprov (leverfunktionstest) innan du får Crestor och under din behandling med Crestor.

Under den tid du använder detta läkemedel kommer din läkare noggrant övervaka om du har diabetes, eller om du har en ökad risk att utveckla diabetes. Du kan ha en ökad risk att utveckla diabetes om du har höga socker- och fettvärden i ditt blod, om du är överviktig och om du har högt blodtryck.

Barn och ungdomar upp till 18 år

- Om patienten är yngre än 6 år: Crestor får inte ges till barn under 6 år.
- Om patienten är yngre än 18 år: Crestor 40 mg tablett (högsta styrkan) är inte lämplig för användning hos barn och ungdomar upp till 18 år.

Använder du andra läkemedel?

Använder du andra läkemedel utöver Crestor, har du nyligen gjort det eller planerar du att göra det snart? Berätta det då för din läkare eller apotekare. Detta gäller även läkemedel som du inte behöver recept för.

Berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

- ciklosporin (används till exempel efter organtransplantationer)
- warfarin, clopidogrel eller ticagrelor (eller ett annat läkemedel som används för blodförtunnning)
- fibrater (såsom gemfibrozil eller fenofibrat) eller ett annat läkemedel som används för att sänka kolesterolhalten i ditt blod (såsom ezetimib)
- medel mot problem med din mage eller tarmar (för att minska syran i din mage)
- erytromycin (antibiotika), fusidinsyra (antibiotika – se nedan och När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel)
- ett oralt preventivmedel (p-piller)
- regorafenib (används för att behandla cancer)
- darolutamid (används för att behandla cancer)
- capmatinib (används för att behandla cancer)
- hormonbehandling
- fostamatinib (används för att behandla ett minskat antal blodplättar)
- febuxostat (används för att behandla och förebygga höga nivåer av urinsyra i blodet)
- teriflunomid (används för att behandla multipel skleros)
- leflunomid (används för behandling av reumatoid artrit),
- läkemedel för att behandla virusinfektioner såsom HIV eller en hepatit C-infektion. Detta kan vara när det används ensamt eller i kombination med ett annat läkemedel (se När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?). Det handlar om följande läkemedel: ritonavir, lopinavir, atazanavir, sofosbuvir, voxilaprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir eller pibrentasvir.
- Roxadustat eller vadadustat (används för behandling av anemi hos patienter med kronisk njursjukdom),
- tafamidis (används för behandling av en sjukdom som kallas transthyretinamyloidos)
- momelotinib (används för behandling av myelofibros hos vuxna med anemi). Effekten av dessa läkemedel kan förändras av Crestor. Dessa läkemedel kan också förändra effekten av Crestor.

Om du måste använda oral fusidinsyra för att behandla en bakteriell infektion, måste du tillfälligt sluta använda detta läkemedel. Din läkare kommer att tala om för dig när det är säkert

att återuppta användningen av Crestor. Samtidig användning av Crestor och fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta i musklerna (rabdomyolys). För mer information om rabdomyolys, se avsnitt 4.

Vad ska du tänka på med mat och dryck?
Du kan ta Crestor med eller utan mat.

Graviditet och amning

Använd inte Crestor om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du använder Crestor, måste du sluta använda det omedelbart. Informera din läkare om detta. Som kvinna bör du undvika att bli gravid när du använder Crestor. Du bör därför använda bra preventivmedel.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

De flesta människor kan köra bil och använda maskiner när de använder Crestor. Vissa människor blir dock yra under användning av Crestor. Om du känner dig yr, bör du fråga din läkare om du kan köra bil eller använda maskiner.

Crestor innehåller laktos

Om din läkare har informerat dig om att du inte tål vissa sockerarter (laktos eller mjölksocker), kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.

För en komplett lista över ämnen i detta läkemedel, se avsnittet Förpackningens innehåll och övrig information.

3. Hur använder du detta läkemedel?

Använd alltid detta läkemedel exakt som din läkare eller apotekspersonal har sagt till dig. Är du osäker på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Den rekommenderade doseringen för vuxna

Om du använder Crestor för att sänka ditt kolesterol:

Startdos

Du bör börja med Crestor 5 mg eller 10 mg, även om du tidigare har använt en högre dos av en annan statin. Valet av din startdos beror på:

- Mängden kolesterol i ditt blod.
- Risken du har för att få en hjärtattack eller stroke.
- Om du är känslig för möjliga biverkningar.

Fråga din läkare eller apotekspersonal vilken startdos Crestor som är bra för dig. Din läkare kan besluta att ge dig den lägsta dosen (5 mg) om:

- Du är av asiatisk härkomst (från Japan, Kina, Filippinerna, Vietnam, Korea eller Indien).
- Du är över 70 år.
- Du har måttliga njurproblem.
- Du har risk att få muskelvärk, muskelsvaghet eller muskelkramp (myopati).

Ökning av doseringen och den högsta doseringen per dag

Din läkare kan besluta att öka din dosering. Din läkare ser till att du använder den mängd Crestor som är bra för dig. Om du har börjat med en dosering på 5 mg kan din läkare besluta att fördubbla den till 10 mg, sedan till 20 mg och sedan vid behov till 40 mg. Om du har börjat med 10 mg kan din läkare besluta att fördubbla den till 20 mg och sedan vid behov till 40 mg. Det går fyra veckor mellan varje justering.

Den högsta doseringen Crestor per dag är 40 mg. Denna dosering är endast för patienter med mycket kolesterol i blodet och för patienter som har stor risk att få en hjärtattack eller stroke. Du kan få 40 mg om mängden kolesterol i ditt blod inte sänks tillräckligt med 20 mg.

Om du använder Crestor för att minska risken för att få en hjärtattack, stroke eller liknande tillstånd:

Den rekommenderade doseringen är 20 mg per dag. Din läkare kan dock besluta att ge dig en lägre dosering om något av ovanstående tillstånd gäller för dig.

Användning hos barn och ungdomar från 6 till 17 år

Doseringen för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år varierar från 5 till 20 mg en gång per dag. Den vanliga startdoseringen är 5 mg per dag och din läkare kan gradvis öka denna dosering för att hitta den dosering som passar dig bäst. Den maximala dagliga doseringen av Crestor är 10 eller 20 mg för barn och ungdomar från 6 till 17 år beroende på det underliggande tillståndet som behandlas. Ta din dosering en gång per dag. Crestor 40 mg tablett ska inte ges till barn.

Intag av dina tabletter

Svälj varje tablett hel med lite vatten.

Ta Crestor en gång per dag. Du kan ta det vid vilken tidpunkt som helst på dagen. Försök att ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att inte glömma att ta dem.

Regelbundna kontroller av mängden kolesterol i ditt blod

Det är viktigt att du regelbundet går till din läkare för att kontrollera mängden kolesterol i ditt blod. Din läkare ser då om mängden kolesterol i ditt blod är bra och förblir bra. Din läkare kan besluta att ge dig en högre dosering så att du tar den mängd Crestor som är bra för dig.

Har du tagit för mycket av denna medicin?

Fråga din läkare eller sjukhuset i närheten om råd.

Om du blir inlagd på sjukhus eller behandlas för något annat, måste du berätta för sjukvårdspersonalen att du använder Crestor.

Har du glömt att ta denna medicin?

Du behöver inte oroa dig, ta bara din nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Om du slutar ta denna medicin

Prata med din läkare om du vill sluta använda Crestor. Mängden kolesterol i ditt blod kan öka igen om du slutar använda Crestor.

Har du fler frågor om användningen av denna medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar. Alla får dock inte dessa biverkningar. Det är viktigt att du vet vilka dessa biverkningar kan vara. De är vanligtvis milda och försvinner efter en kort tid.

Sluta använda Crestor och kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon av följande allergiska reaktioner:

- Andningssvårigheter, med eller utan svullnad i ansiktet, läpparna, munnen och/eller halsen.
- Svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen, vilket kan orsaka svårigheter att svälja.
- Kraftig klåda på huden (med utslag).
- Rödaktiga, icke-upphöjda, runda fläckar i form av en måltavla på bålen, ofta med centrala blåsor, hudavflagning, sår i mun, hals, näsa, könsorgan och ögon. Detta allvarliga hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom (Stevens-Johnson-syndrom).
- Omfattande hudutslag, hög kroppstemperatur och förstörade lymfkörtlar (DRESS-syndrom eller läkemedelsinducerad överkänslighet).

Sluta också använda Crestor och kontakta omedelbart din läkare:

- om du upplever oväntad muskelsmärta, muskelsvaghet eller muskelkramp som varar längre än förväntat. Dessa muskelproblem är vanligare hos barn och ungdomar under 18 år än hos vuxna. Liksom med andra statiner har ett litet antal personer fått allvarliga muskelproblem. I sällsynta fall har dessa muskelproblem lett till allvarlig muskelskada (kallad rabdomyolys) som kan vara livshotande.
- om du har muskelbristning.
- om du upplever lupusliknande syndrom (inklusive utslag, ledproblem och effekter på blodcellerna).

Vanliga (mellan 1 av 10 och 1 av 100 patienter) möjliga biverkningar:

- Huvudvärk; buksmärta; förstoppning; illamående; muskelsmärta; känsla av svaghet; yrsel.
- En ökning av mängden protein i urinen – detta blir vanligtvis normalt igen utan att du behöver sluta ta dina Crestor-tabletter (endast Crestor 40 mg).
- Diabetes. Du har en högre risk för detta om du har höga socker- och fettvärden i blodet. om du är överviktig och om du har högt blodtryck. Din läkare kommer att övervaka dig under den tid du använder denna medicin.

Mindre vanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1 000 patienter) möjliga biverkningar:

- Utslag, klåda eller andra hudreaktioner.
- En ökning av mängden protein i din urin – detta blir ofta normalt av sig själv utan att du behöver sluta använda dina Crestor-tabletter (endast Crestor 5 mg, 10 mg och 20 mg).

Sällsynta (mellan 1 av 1 000 och 1 av 10 000 patienter) möjliga biverkningar:

- Allvarlig allergisk reaktion – du kan märka detta genom till exempel svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals, svårigheter att svälja och andas, kraftig klåda hud (med utslag). Om du tror att du har en allergisk reaktion, sluta använda Crestor och sök omedelbart medicinsk hjälp.

- Muskelskada hos vuxna – för säkerhets skull bör du sluta använda Crestor och omedelbart rådfråga din läkare om du har oväntade problem eller smärta i dina muskler som varar längre än du förväntar dig.
- Svår buksmärta (inflammation i bukspottkörteln).
- Ökning av leverenzymmer i ditt blod.
- Blödningar eller blåmärken uppstår lättare än normalt på grund av brist på blodplättar.
- Lupusliknande syndrom (inklusive utslag, ledavvikelser och effekter på blodcellerna).

Mycket sällsynta (hos färre än 1 av 10 000 patienter) möjliga biverkningar:

- Gulsot (gul färg på din hud och ögon); hepatit (en leverinflammation); blodspår i din urin; nervskador i dina armar och ben (som en domnad känsla); ledvärk; minnesförlust och bröstbildning hos män (gynekomasti).

Biverkningar vars frekvens inte är känd:

- Diarré (lös avföring); hosta; andfåddhet; vätskeansamling (ödem); sömnstörningar, såsom sömnlöshet och mardrömmar; sexuella problem; (allvarlig) nedstämdhet (depression); andningsproblem, såsom ihållande hosta och/eller andfåddhet eller feber; senskador och konstant muskelsvaghet.
- Myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar generell muskelsvaghet, i vissa fall i muskler som används vid andning); okulär myasthenia (en sjukdom som orsakar ögonsvaghet). Kontakta din läkare om du upplever svaghet i dina armar eller ben som förvärras efter perioder av aktivitet, dubbelseende eller hängande ögonlock, svårigheter att svälja eller andfåddhet.

Rapportering av biverkningar:

Om du upplever biverkningar, kontakta din läkare eller apotekare. Detta gäller även biverkningar som inte finns med i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar via det svenska Läkemiddelsverket, webbplats: www.lareb.nl. Genom att rapportera biverkningar hjälper du oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

5. Hur förvarar du detta läkemedel?

Blistert: Förvara under 30 °C. Förvara i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Plastflaska: Förvara under 30 °C. Håll flaskan tätt stängd för att skydda mot fukt.

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet. Det finns på kartongen, blistren/etiketten efter EXP. Det står en månad och ett år. Sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Spola inte ner läkemedel i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med läkemedel som du inte längre använder. Om du kasserar läkemedel på rätt sätt förstörs de på ett korrekt sätt och hamnar inte i miljön.

6. Innehåll i förpackningen och övrig information

Vilka ämnen finns i detta läkemedel?

Den aktiva substansen i detta läkemedel är rosuvastatin. Crestor filmdragerade tabletter innehåller rosuvastatinkalcium som motsvarar 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg rosuvastatin.

De andra ämnena i detta läkemedel är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin och titandioxid (E171).

Crestor 10 mg, 20 mg och 40 mg filmdragerade tabletter innehåller också röd järnoxid (E172). Crestor 5 mg filmdragerade tabletter innehåller också gul järnoxid (E172).

Hur ser Crestor ut och vad finns i en förpackning?

Crestor finns i en förpackning med aluminiumblister med 7, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 tabletter och plastflaskor med 30 och 100 tabletter. (Det är möjligt att inte alla nämnda förpackningsstorlekar marknadsförs.)

Crestor finns i tabletter med 4 olika styrkor:

Crestor 5 mg filmdragerade tabletter är gula, runda och har märkningen ZD4522 och 5 på ena sidan och är släta på den andra sidan.

Crestor 10 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda och har märkningen ZD4522 och 10 på ena sidan och är släta på den andra sidan.

Crestor 20 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda och har märkningen ZD4522 och 20 på ena sidan och är släta på den andra sidan.

Crestor 40 mg filmdragerade tabletter är rosa, ovala och har märkningen ZD4522 på ena sidan och märkningen 40 på den andra sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Godkännandena för försäljning av Crestor innehas av:

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

3621 ZA Breukelen

Tillverkare ansvarig för frisläppning av partier:

AstraZeneca AB, Gärtunavägen Södertälje, 152-57, Sverige

Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078 Aachen, Tyskland

Farmaceutici Formenti S.p.A., Via Di Vittorio 2, 21040 Origgio (VA), Italien

Denna produkt är registrerad under:

RVG 30823 (Crestor 5);

RVG 26872 (Crestor 10);

RVG 26873 (Crestor 20);

RVG 26874 (Crestor 40).

Denna medicin är registrerad i medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under följande namn:

Crestor 5, 10, 20 och 40 (NL, AT, BE, DK, GR, FI, IC, IE, IT, LU, NO, MT, PL, PT, SE (Nordirland)), och 5 mg, 10 mg och 20 mg (DE, ES, FR).

Denna bipacksedel godkändes senast i 10/2025