

KASUTUSJUHEND: TEAVE KASUTAJALE

Seretide Diskus 50 mikrogrammi/100 mikrogrammi/annus, ühekordse annusega inhalatsioonipulber

Seretide Diskus 50 mikrogrammi/250 mikrogrammi/annus, ühekordse annusega inhalatsioonipulber

Seretide Diskus 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annus, ühekordse annusega inhalatsioonipulber

Salmeterool / flutikasoonpropionaat

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama.

- Hoidke infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.
- See ravim on määratud ainult teile. Ärge andke seda teistele.
- See võib kahjustada teisi inimesi, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kui mõni kõrvaltoime teid oluliselt häirib või märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole nimetatud, teavitage palun oma arsti või apteekrit.

See pakendi infoleht sisaldab:

1. Mis on Seretide ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peate teadma enne Seretide kasutamist?
3. Kuidas Seretide't kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas Seretide't säilitada?
6. Lisainformatsioon

1. MIS ON SERETIDE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Seretide sisaldab 2 ravimit, salmeterooli ja flutikasoonpropionaati.

Salmeterool on pika toimeajaga bronhodilataator. Bronhodilataatorid laiendavad kopsudes bronhe, hõlbustades sisse- ja väljahingamist. Salmeterooli toime kestab vähemalt 12 tundi.

Flutikasoonpropionaat on kortikoid, mis vähendab turset ja kopsuärritust.

Arst on teile selle ravimi määranud, et vältida hingamisprobleeme nagu:

Astma

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK). Annuses 50/500 mikrogrammi vähendab Seretide Diskus KOK-i ägenemiste arvu.

Seretide't tuleb kasutada iga päev vastavalt arsti juhistele, et astma ja KOK-i sümptomid oleksid hästi kontrolli all.

Seretide hoiab ära hingeldus- ja vilistava hingamise episoodide tekke. See ei ole efektiivne, kui hingamisraskuse või vilistava hingamise sümptomid on juba olemas. Sellistel juhtudel tuleb kasutada kiire toimega „hädaabiravimit“, näiteks salbutamooli.

2. MIDA PEATE TEADMA ENNE SERETIDE KASUTAMIST?

SERETIDE't ei tohi kasutada,

Kui olete ülitundlik (allergiline) salmeteroolksinafoaadi, flutikasoonpropionaadi või ravimi muu koostisosa, laktoosmonohüdraadi suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik SERETIDE kasutamisel

Teie arst jälgib teie ravi hoolikamalt, kui teil on üks järgmistest haigustest:

Südamehaigus, sealhulgas ebaregulaarne või liiga kiire südametegevus,

Kilpnäärme ületalitlus

arteriaalne hüpertensioon,

Suhkruhaigus (Seretide võib tõsta teie veresuhkru taset),

liiga madal kaaliumitase veres,

praegune või varasem tuberkuloos (TB).

Teavitage oma arsti, kui olete juba nende haiguste all kannatanud, enne kui kasutate Seretide't.

Seretide kasutamine koos teiste ravimitega

Palun teavitage oma arsti, kui te võtate või kasutate teisi ravimeid või olete neid hiljuti võtnud või kasutanud, isegi kui need on astmaravimid või käsimüügiravimid. On võimalik, et Seretide kasutamine koos teiste ravimitega ei ole sobiv.

Teavitage oma arsti, kui te kasutate või võtate mõnda järgmistest ravimitest enne Seretide kasutamist:

Beetablokaatorid (näiteks Atenolool, Propanolool, Sotalool). Beetablokaatorid kasutatakse peamiselt kõrge vererõhu ja teiste südamehaiguste raviks.

Viiruste või seente vastased ravimid (nagu Ritonaviir, Ketokonasool ja Itrakonasool).

Mõned neist ravimitest võivad suurendada flutikasoonpropionaadi või salmeterooli kogust kehas. See võib suurendada riski, et teil tekivad Seretide kõrvaltoimed, nagu ebaregulaarne südametegevus, või kõrvaltoimed võivad süveneda.

Kortikoidid (suukaudseks manustamiseks või süstimiseks). Kui teile on neid ravimeid hiljuti manustatud, võib see suurendada neerupealiste kahjustuse riski selle ravimi tõttu.

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige oma arstiga, kui olete rase, plaanite rasestuda või toidate last rinnaga, enne Seretide kasutamist. Teie arst hindab, kas te tohib Seretide't sellel perioodil kasutada.

Autojuhtimine ja masinate käsitsemine

On ebatõenäoline, et Seretide mõjutab teie autojuhtimise või masinate käsitlemise võimet.

Olulised andmed Seretide teatud muude koostisosade kohta

Iga Seretide Diskuse annus sisaldab kuni 12,5 milligrammi laktoosi. Selle ravimi laktoosisisaldus ei põhjusta tavaliselt probleeme laktoositalumatusega inimestel.

3. KUIDAS SERETIDE'T KASUTADA?

Kasutage Seretide't iga päev, välja arvatud juhul, kui arst soovib teil selle kasutamise lõpetada.

Kasutage Seretide't alati täpselt arsti juhiste järgi. Ärge kasutage rohkem kui soovitatud annus. Kui te pole milleski kindel, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Astma korral

Täiskasvanud ja noorukid alates 12. eluaastast

Seretide 50/100 Diskus – üks inhalatsioon kaks korda päevas

Seretide 50/250 Diskus – üks inhalatsioon kaks korda päevas

Seretide 50/500 Diskus – üks inhalatsioon kaks korda päevas

Lapsed vanuses 4 kuni 12 aastat

Seretide 50/100 Diskus – üks inhalatsioon kaks korda päevas

Seda ravimit ei soovitata alla 4-aastastele lastele.

Täiskasvanutel, kes põevad kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (KOK)

Seretide 50/500 Diskus – üks inhalatsioon kaks korda päevas

Võimalik, et teie astma sümptomid on hästi kontrolli all, kui kasutate Seretide'i kaks korda päevas. Kui see on nii, võib teie arst otsustada annust vähendada ühe korra päevas. Kasutamist saab muuta järgmiselt:

üks kord öhtul, kui teil on öösel sümptomeid.

üks kord hommikul, kui teil on päeval sümptomeid.

On väga oluline, et järgiksite arsti juhiseid inhalatsioonide arvu ja ravimi kasutamise sageduse kohta.

Kui kasutate Seretide'i astma tõttu, soovib teie arst teie sümptomeid regulaarselt kontrollida.

Kui astma süveneb või teil tekivad tugevamad hingamisprobleemid, teavitage kohe oma arsti. Võimalik, et teil esineb sagedamini vilistavat hingamist, tunnete sagedamini survet rinnus või peate sagedamini kasutama kiiretoimelist hädaabiravimit. Kui see on nii, peate jätkama Seretide'i kasutamist,

kuid te ei tohi inhalatsioonide arvu muuta. Võimalik, et teie

hingamisteede haigus süveneb ja te jääte raskelt haigeks. Võtke ühendust oma arstiga, kuna võite vajada täiendavat ravi.

Kasutusviis:

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker näitab teile, kuidas oma inhalaatorit õigesti kasutada. Nad kontrollivad aeg-ajalt, kuidas te seda kasutate. Kui te ei kasuta Seretide Diskus't õigesti või ei järgi kasutusjuhendit, ei ravita astmat või KOK-i nõuetekohaselt. Diskus sisaldab Seretide'i pulbrina blisterpakendeid

Diskusel olev loendur näitab allesjäänud annuste arvu. See loendab kuni 0, numbrid 5 kuni 0 ilmuvad punaselt, et teavitada teid, et alles on jäänud vaid mõned annused. Kui loendur näitab 0, on teie inhalaator tühi.

Teie inhalaatori kasutusjuhend

1. Diskuse avamiseks hoidke ühe käega välimist korpust ja vajutage teise käe pöidlaga kergelt ettenähtud osale. Vajutage pöidlaga nii kaugele kui võimalik. Kui kuulete klõpsu, avaneb huulikus väike ava.

2. Hoidke Diskust nii, et huulik on teie poole suunatud. Võite seda hoida nii paremas kui ka vasakus käes. Vajutage hooba nii kaugele kui võimalik väljapoole. Kui kuulete klõpsu, jõuab ravimi annus huulikusse.

Iga kord, kui vajutate hooba tagasi, avatakse sees blisterpakend ja pulber on sissehingamiseks valmis. Ärge vajutage hooba asjatult, kuna nii vabastatud annused lähevad kaotsi.

3. Hoidke diskust suust eemal. Hingake nii sügavalt välja kui võimalik. Ärge puhuge diskusesse.
4. Asetage huulik huultele ja sulgege see huultega. Hingake kiiresti ja nii sügavalt kui võimalik suu kaudu diskusest sisse, mitte nina kaudu. Võtke diskus suust välja. Hoidke hinge kinni umbes 10 sekundit või nii kaua kui võimalik. Hingake aeglaselt välja.
5. Loputage seejärel suu veega ja sülitage see välja. See aitab vältida kandidoosi ja kähedust.
6. Sulgege diskus, asetades pöidla ettenähtud kohale ja liigutades inhalaatori liikuvat osa nii kaugele kui võimalik enda poole. Siis on kuulda klõpsatust. Hoob liigub tagasi algasendisse ja viiakse algasendisse tagasi.

Teie diskus on taas kasutusvalmis.

Diskuse puhastamine

Pühkige diskuse huulik puhastamiseks kuiva lapiga.

Kui olete kasutanud suuremat kogust SERETIDE't, kui peaksite

Kui olete kasutanud või võtnud liiga palju Seretide't, pöörduge kohe oma arsti, apteekri või mürgistuskeskuse poole (070/245.245).

On väga oluline, et kasutaksite Seretide't vastavalt oma arsti juhiste. Kui olete kogemata kasutanud suuremat annust kui soovitatud, teavitage oma arsti või apteekrit. Võite märgata, et teie süda lööb kiiremini kui tavaliselt ja et te värisete. Teil võivad esineda ka peavalud, lihaskrampid ja liigesevalu.

Kui olete pikka aega kasutanud liiga suuri annuseid, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt, sest liiga suured Seretide annused võivad vähendada neerupealiste steroidhormoonide tootmist.

Kui olete unustanud SERETIDE't kasutada

Kasutage järgmist annust tavapärasel ajal, kui olete unustanud oma ravimit kasutada.

Ärge kasutage kahekordset annust, kui olete eelneva annuse unustanud.

Kui lõpetate SERETIDE kasutamise

On väga oluline, et kasutaksite Seretide't iga päev vastavalt oma arsti juhiste. Kasutage seda seni, kuni arst soovib selle lõpetada. Ärge lõpetage Seretide kasutamist järsult ega vähendage annust järsult. See võib põhjustada teie hingamisprobleemide halvenemist ja harvadel juhtudel võivad tekkida kõrvaltoimed nagu:

Kõhuvalu

Väsimus ja isutus
Iiveldus ja kõhulahtisus
Kaalukaotus
Peavalu või unisus
Kaaliumitaseme langus veres
Hüpotensioon ja krambid

Väga harvadel juhtudel võivad teil tekkida sellised kõrvaltoimed, kui saate infektsiooni või olete stressis (näiteks pärast rasket õnnetust või operatsiooni). Selliste sümptomite vältimiseks võib teie arst teile lisaks määrata kortikoide (nagu prednisoloon).

Kui teil on küsimusi ravimi kasutamise kohta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

4. MILLISED KÕRVALTOIMED ON VÕIMALIKUD?

Nagu kõik ravimid, võib ka Seretide põhjustada kõrvaltoimeid, kuid need ei pruugi ilmnedagi kõigil. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks määrab teie arst teile võimalikult väikese annuse, millega teie astma või KOK saab kontrolli alla.

Allergilised reaktsioonid: Võite märgata, et teie hingamine halveneb pärast Seretide'i kasutamist äkki. Teil võib olla tugev vilistav hingamine ja palju köha. Samuti on võimalik, et teil tekib sügelus (pruritus) ja märkate turset (tavaliselt näol, huultel, keelel või kurgus). Teavitage kohe oma arsti, kui märkate selliseid sümptomeid või need ilmnevad äkki pärast Seretide'i kasutamist. Allergilised reaktsioonid Seretide'ile esinevad aeg-ajalt (need mõjutavad vähem kui ühte inimest 100-st).

Järgmised muud kõrvaltoimed võivad esineda:

Väga sageli (mõjutavad rohkem kui ühte inimest 10-st)

Peavalu: Tavaliselt paraneb see pideva ravi korral.

KOK-iga patsientidel on teatatud sagedasemast nohu esinemisest.

Sageli (mõjutavad vähem kui ühte inimest 10-st)

Kandidoos suus ja kurgus (valu, valge-kollakad tõusnud laigud) samuti valu keelel ja kähedus. Võib olla kasulik pärast iga inhalatsiooni suu veega loputada ja see kohe välja sülitada. Teie arst määrab teile seenevastase ravimi (antimükootikum), et ravida suus esinevat kandidoosi (soor).

Liigesevalu, liigeste turse ja lihasvalu.

Järgmisi kõrvaltoimeid on täheldatud ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel:

Kopsupõletik ja bronhiit (kopsuinfektsioon). Teavitage oma arsti, kui märkate mõnda järgmistest sümptomitest: röga suurenemine, röga värvuse muutus, palavik, külmavärinad, suurenenud köha, suurenenud hingamisprobleemid

Sinikad ja luumurrud

Ninakõrvalkoobaste põletik (pingetunne või ummistus ninas, põskedes ja silmade taga, mis on mõnikord seotud pulseeriva valuga).

Kaaliumisisalduse vähenemine veres (mis võib põhjustada ebaregulaarset pulssi, lihaskrampe ja nõrkust).

Aeg-ajalt (mõjutavad vähem kui ühte inimest 100-st)

Väga kiire pulss (tahhükardia)

Värisemine ja kiire või ebaregulaarne pulss (palpitatsioonid). Need toimed on samuti kahjutud ja vähenevad ravi jätkudes.

Lihaskrambid

Ärevus (see toime esineb peamiselt lastel).

Valu kurgus. Pärast iga inhalatsiooni võib olla kasulik suu veega loputada ja see kohe välja sülitada.

Harva (mõjutavad vähem kui ühte inimest 1000-st)

Hingamisprobleemid või vilistav hingamine, mis halveneb kohe pärast Seretide'i kasutamist. Kui see juhtub, ärge kasutage enam oma Seretide'i inhalaatorit. Kasutage oma „kiirabiinhalaatorit“, et hingamist kergendada, ja pöörduge kohe arsti poole.

Seretide võib mõjutada keha normaalset steroidhormoonide tootmist, eriti kui olete kasutanud suuremaid annuseid pikema aja jooksul. See võib avalduda järgmiselt:

- Kasvutõkestus lastel ja noorukitel,
- Luu hõrenemine
- Katarakt ja glaukoom
- Kaalutõus
- Ümar nägu (kuunägu) (Cushingi sündroom)

Teie arst kontrollib teid regulaarselt nende kõrvaltoimete suhtes ja jälgib, et kasutaksite oma astma kontrollimiseks võimalikult väikest Seretide'i annust.

Veresuhkru (glükoositaseme) tõus veres (hüperglükeemia). Kui olete diabeetik, võib olla vajalik sagedasem veresuhkru taseme kontroll ja teie tavapärase diabeediravi kohandamine.

Unehäired ja käitumise muutused ebatavalise hüperaktiivsuse või ärrituvusega (need toimed esinevad peamiselt lastel).

Ebaregulaarne pulss või lisasüdame löögid (arütmia). Teavitage oma arsti, kuid ärge lõpetage Seretide kasutamist, kui arst ei ole seda soovitanud.

Nahalööve.

Sagedus teadmata, kuid võimalik esinemine:

Depressioon või agressiivsus. Need kõrvaltoimed esinevad sagedamini lastel.

Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui mõni loetletud kõrvaltoime teid oluliselt häirib või kui märkate kõrvaltoimeid, mida selles infolehes ei ole mainitud.

5. KUIDAS SERETIDE'T SÄILITADA?

Hoida ravimit lastele kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage Seretide't pärast kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud etiketil ja karbil.

Kõlblikusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimit ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas ravimit hävitada, kui te seda enam ei vaja. See aitab kaitsta keskkonda.

6. LISAINFORMATSIOON

Mida SERETIDE sisaldab

Toimeained on salmeterool (nagu salmeteroolksinafoaat) (50 mikrogrammi) ja flutikasoonpropionaat (100, 250 või 500 mikrogrammi).

Muud koostisosad on laktoosmonohüdraat (sisaldab piimavalku).

Kuidas SERETIDE välja näeb ja pakendi sisu

Seretide Diskus sisaldab alumiinium Fooliumriba. Alumiinium kaitseb sissehingatavat pulbrit atmosfääri mõjude eest.

Iga annus on pakitud ühekordse annuse mahutisse.

Doseerimiskambrid on pakitud karpidesse järgmise sisuga:

1 x Diskus 28 inhalatsiooni

või 1, 2, 3 või 10 x Diskus, igaüks 60 inhalatsiooniga

Võib juhtuda, et kõiki pakendi suurusi ei turustata.

Ravimi müügiloo hoidja ja tootja

Ravimi müügiloo hoidja

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Site Apollo

Avenue Pascal, 2-4-6

B-1300 Wavre

Tootja

Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle 2
23 rue Lavoisier
F-27000 Evreux
Prantsusmaa

Glaxo Wellcome GmbH & Co
Industriestrasse 32-36
D-23843 Bad Oldesloe
Saksamaa

Glaxo Operations UK
Limited (kaubamärgina Glaxo
Wellcome Operations)
Priory Street
Ware, Hertfordshire
SG12 0DJ
Ühendkuningriik

See ravim on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikides heaks kiidetud järgmiste nimetuste all:

Austria	Seretide Diskus
Belgia	Seretide Diskus
Taani	Seretide
Soome	Seretide Diskus
Prantsusmaa	Seretide Diskus
Saksamaa	atmadisc Diskus
Kreeka	Seretide Diskus
Iirimaa	Seretide Diskus
Itaalia	Seretide Diskus
Luksemburg	Seretide Diskus
Madalmaad	Seretide Diskus
Portugal	Seretide Diskus
Hispaania	Seretide Accuhaler
Rootsi	Seretide Diskus

Ühendkuningriik Seretide Accuhaler

Retsepti tüüp
Retseptiravim.

Müügiloa numbrid

SERETIDE DISKUS 50 mikrogrammi/100 mikrogrammi/annus	BE200855
SERETIDE DISKUS 50 mikrogrammi/250 mikrogrammi/annus	BE200873
SERETIDE DISKUS 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annus	BE200882

Seda pakendi infolehte uuendati viimati (versioon 50)

Transtoyou