

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

Spironolaktoni Aurobindo 25 mg, tabletit

Spironolaktoni Aurobindo 50 mg, tabletit

Spironolaktoni Aurobindo 100 mg, tabletit

spironolaktoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.

Saatko jonkin haittavaikutuksen, joka on mainittu kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Tämän pakkausselosteen sisältö

1. Mitä Spironolaktoni Aurobindo on ja mihin sitä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
3. Miten tätä lääkettä käytetään?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Miten tätä lääkettä säilytetään?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Spironolaktoni Aurobindo on ja mihin sitä käytetään?

Spironolaktoni Aurobindo kuuluu niin sanottujen kaliumia säästävien diureettien ryhmään. Se vastustaa aldosteronin vaikutusta. Aldosteroni on elimistön oma aine, joka pidättää nestettä kehossa. Spironolaktoni vähentää siis kehon nestemäärää lisäämällä virtsan tuotantoa.

Spironolaktonilla on myös verenpainetta alentava vaikutus.

Tämä lääke on tarkoitettu potilaille, joilla on:

nesteen kertymistä kehon kudoksiin sydänsairauksien seurauksena, erityisesti vaikeasti hoidettavissa tapauksissa

kohonnut verenpaine, lisänä suolattomaan ruokavalioon ja diureetteihin, kun nämä yksinään eivät ole riittävän tehokkaita

tietyt munuaissairaudet, kun diureetit eivät ole riittävän tehokkaita tai niitä ei voida käyttää

nesteen kertymistä kehon kudoksiin ja vatsaonteloon maksan sairauksien seurauksena.

Spironolaktoni Aurobindoa käytetään myös Connin taudin (sairaus, jossa tuotetaan liikaa aldosteronia kasvaimen tai lisämunuaiskuoren laajentumisen seurauksena) leikkauksen, hoidon tai diagnoosin yhteydessä.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai on oltava erityisen varovainen?

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Tätä lääkettä ei saa käyttää, jos sinulla on tiettyjä sairauksia. Nämä sairaudet, jotka lääkärisi voi tunnistaa, ovat:

- Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineelle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6;
- Vakava munuaisten toimintahäiriö tai vakava munuaisten toiminnan heikkeneminen;
- Äkillisesti ilmenevä tai paheneva munuaissairaus, mahdollisesti yhdistettynä (lähes) täydelliseen virtsan puuttumiseen;
- Liian korkea kaliumin tai liian matala natriumin määrä veressä;
- Addisonin tauti;
- Samanaikainen käyttö muiden kaliumia säästävien diureettien kanssa.

Spiroinolaktonia ei saa antaa lapsille, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaissairaus.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen tämän lääkkeen ottamista:

- jos sinulla on munuaissairaus. Tämä on erityisen tärkeää lapsille, joilla on korkea verenpaine;
- jos sinulla on maksasairaus;
- jos olet iäkäs potilas ja/tai sinulla on tukos kehon osissa, jotka imevät ja erittävät virtsaa, tai sinulla on sairaus, joka voi johtaa elektrolyyttien (kuten natrium, kalium, kalsium, kloridi ja bikarbonaatti veressä ja muissa kehon nesteissä) häiriöihin;
- jos sinulla on vaikea sydämen vajaatoiminta. Kun sinua hoidetaan spironolaktonilla, lääkärisi tarkistaa kaliumtason veressäsi, koska on olemassa riski liiallisesta kaliumista veressäsi (hyperkalemia), joka voi olla hengenvaarallinen;
- jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta tai munuaisten vajaatoiminta, koska silloin kaliumtaso veressäsi voi nousta huomattavasti. Tämä voi vaikuttaa sydämesi toimintaan. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi olla hengenvaarallista.

Lääkärisi tai sairaanhoitajasi suorittaa säännöllisesti verikokeita neste- ja elektrolyyttitasojen (kalium ja natrium) tarkistamiseksi.

Tämä on erityisen tärkeää iäkkäille ja potilaille, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta.

Spiroinolaktonihoito voi johtaa korkeampiin kalium- ja veren ureatyyppitasoihin (merkki maksa- ja munuaisongelmista) ja natriumtason laskuun, erityisesti iäkkäillä ja/tai potilailla, joilla on sydän-, munuais- tai maksavaivoja. Korkea kaliumpitoisuus (hyperkalemia) voi äärimmäisissä tapauksissa olla hengenvaarallinen.

Spiroinolaktonin ja tiettyjen lääkkeiden, esim. trimetopriimi-sulfametoksatsoli (ko-trimoksatsoli), kaliumlisien ja kaliumrikkaan ruoan samanaikainen käyttö voi johtaa vakavaan hyperkalemiaan (kaliumin määrä veressäsi on liian korkea).

Vakavan hyperkalemian oireita ovat muun muassa:

- lihasnykäykset
- epäsäännöllinen sydämen rytmi
- ripuli
- pahoinvointi
- huimaus
- päänsärky.

Onko sinulla yllä mainittuja oireita? Ota yhteyttä lääkäriisi. Hän voi suorittaa lisätutkimuksia ja muuttaa hoitoa tarvittaessa.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Käytätkö Spironolaktoni Aurobindon lisäksi muita lääkkeitä, oletko äskettäin käyttänyt tai onko mahdollista, että aiot käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kerro siitä lääkärillesi tai apteekkarillesi.

Jotkut lääkkeet voivat nimittäin vahvistaa tai heikentää toistensa vaikutusta tai niitä ei saa käyttää samanaikaisesti muista syistä.

Lääkkeet, joiden tiedetään vaikuttavan spironolaktonin toimintaan tai joiden toimintaan spironolaktoni voi vaikuttaa, vaikuttavat kaliumin määrään veressäsi:

kaliumia säästävät diureetit ja aldosteroniantagonistit, angiotensiinikonvertaasin estäjät (ACE-estäjät), angiotensiini II -antagonistit (veren kaliumtason nousun riski voi olla lisääntynyt, erityisesti munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Lääkärisi tulee annostella huolellisesti ja seurata sinua tarkasti. Samanaikaista käyttöä tulee välttää vakavan munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä).

siklosporiini (tietty lääke elinsiirron ja autoimmuunisairauksien hoitoon): mahdollinen kaliumtason nousu veressä.

kortikosteroidit ja ACTH: spironolaktonin verenpainetta alentavan vaikutuksen heikkeneminen.

kolestyramiini (tietty lääke korkeaan kolesteroliin): voi heikentää spironolaktonin diureettista vaikutusta.

ammoniumkloridi voi lisätä veren kaliumtason nousun ja asidoosin riskiä.

tiettyt antibiootit: trimetopriimi ja trimetopriimi-sulfametoksatsoli. Nämä lääkkeet lisäävät veren kaliumtason nousun riskiä.

Muut lääkkeet, joiden kanssa voi esiintyä yhteisvaikutuksia:

Spironolaktoni Aurobindoa voidaan käyttää samanaikaisesti muiden diureettien ja verenpainelääkkeiden kanssa: joskus voi olla tarpeen alentaa niiden annosta.

noradrenaliini: jos käytetään nukutuksen aikana; noradrenaliinin verisuonia supistava vaikutus voi olla heikentynyt.

NSAID:t kuten diklofenaakki, ibuprofeeni ja naprokseeni (kipulääkeryhmä, jolla on tulehdusta ja kuumetta alentava vaikutus); spironolaktonin vaikutus voi heikentyä ja voi edistää akuutin munuaisten vajaatoiminnan esiintymistä kuivuneilla potilailla.

salisylaatit, kuten asetyyilisalisyylihappo (kipulääkkeet); spironolaktonin vaikutus voi heikentyä.

hepariini (lääke, joka estää verihyytymien muodostumista); spironolaktonin vaikutus voi voimistua.

verenohennuslääkkeet (antikoagulantit); verenohennuslääkkeiden vaikutus voi heikentyä.

digoksiini (lääke, joka parantaa sydämen pumppausvoimaa, sydänglykosidi); digoksiinin vaikutus voi voimistua.

litium (tietty lääke masennukseen): mahdollinen litiumin pitoisuuden nousu veressä.

Kerro lääkärillesi, jos käytät abirateronia eturauhassyövän hoitoon. Yhdistelmäkäyttö abirateronin kanssa ei ole suositeltavaa.

Kerro lääkäriillesi, jos käytät mitotaania lisämunuaisten pahanlaatuisten kasvainten hoitoon. Tätä lääkettä ei saa käyttää yhdessä mitotaanin kanssa.

Mihin sinun tulee kiinnittää huomiota syömisen ja juomisen suhteen?

Sinun tulee olla varovainen kaliumia runsaasti sisältävän ruoan ja kaliumia sisältävien suolan korvikkeiden kanssa, koska ne voivat nostaa veren kaliumtasoa (hyperkalemia, mahdollisesti hengenvaarallinen), erityisesti jos munuaisten toiminta on heikentynyt.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oletko raskaana, epäiletkö olevasi raskaana, haluatko tulla raskaaksi tai imetätkö? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Raskaus

Spironolaktonin käytöstä raskauden aikana ihmisillä ei ole riittävästi tietoa mahdollisten haittojen arvioimiseksi. Spironolaktonia ei saa käyttää raskauden aikana.

Imetys

Spironolaktonia ei saa käyttää, jos imetät. Sinun tulee keskustella spironolaktonin käytöstä lääkärisi kanssa, joka neuvoo sinua harkitsemaan vaihtoehtoista tapaa ruokkia vauvaasi tämän lääkkeen käytön aikana.

Hedelmällisyys Naiset:

Spironolaktoni voi aiheuttaa epäsäännöllisiä kuukautisia.

Miehet:

Spironolaktoni voi aiheuttaa impotenssia.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke voi aiheuttaa sivuvaikutuksina uneliaisuutta, huimausta, sekavuutta ja päänsärkyä. Tämä on otettava huomioon liikenteessä ja (vaarallisten) koneiden käytössä, ja sinun tulee olla erityisen varovainen.

Spironolaktoni Aurobindo sisältää laktoosia

Jos lääkärisi on kertonut, että et siedä tiettyjä sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä.

3. Kuinka käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina täsmälleen kuten lääkärisi tai apteekkisi on neuvonut. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Käyttöohjeet

Tabletit on parasta ottaa aterian yhteydessä runsaalla vedellä (puoli lasia). Jos käytät yli 100 mg päivässä, on parasta jakaa se useampaan annokseen. Yksi annos mieluiten aamiaisella.

Annostus

Lääkärisi on määrittänyt annoksen. Yleisesti ottaen alla olevat annokset antavat riittävän tuloksen. Iäkkäille suositellaan aloittamista mahdollisimman pienellä annoksella. Varovaisuutta on noudatettava, jos munuaisten toiminta on heikentynyt.

Kohonnut verenpaine

Päivittäinen annos on yleensä 50 mg - 100 mg päivässä aikuisille. Päivittäinen annos voidaan ottaa kerralla tai jakaa päivän mittaan.

Hoito tulee kestää vähintään 2 viikkoa, koska odotettu vaikutus ei aina ilmene heti. Vasta 2 viikon jälkeen lääkäri voi tarvittaessa nostaa annosta.

Nesteen kertyminen kudoksiin (ödeema) sydänsairauksien seurauksena

Päivittäinen annos voidaan ottaa kerralla tai jakaa päivän mittaan.

Suosittelun aloitusannos on 100 mg päivässä, kerralla tai jaettuna päivän mittaan. Tämä annos voi vaihdella 25 mg:sta 200 mg:aan päivässä. Ylläpitoannos määritetään yksilöllisesti.

Vakavien sydänsairauksien yhteydessä yhdessä tavanomaisen hoidon kanssa suositeltu aloitusannos on 25 mg päivässä. Jos tarpeen, ja jos siedät hyvin 25 mg:n kerta-annoksen päivässä, annosta voidaan nostaa 50 mg:aan kerran päivässä.

Jos et siedä hyvin 25 mg:n kerta-annosta päivässä, annosta voidaan vähentää 25 mg:aan joka toinen päivä.

Nesteen kertyminen kudoksiin (ödeema) maksakirroosin seurauksena:

Lääkäri määrittää annoksen tapauskohtaisesti sen jälkeen, kun virtsasi natrium- ja kaliumtasot on määritetty.

Munuaissairaudet:

Päivittäinen annos on yleensä 100 mg - 200 mg päivässä.

Leikkaus, Connin taudin toteaminen ja hoito:

Taudin toteaminen ja hoito:

Pitkäaikainen testi: 100-150 mg päivässä (=24 tuntia) ja sitten ennen leikkausta: 100-150 mg päivässä, 3-5 viikkoa ennen leikkausta.

Lyhytaikainen testi: 400 mg päivässä annetaan 4 päivän ajan.

Käyttö lapsille

Annostelun helpottamiseksi tabletti voidaan murskata tai jakaa lasilliseen vettä.

Spironolacton Aurobindo -tablettien määrä, joka lapselle tulee antaa, riippuu lapsen painosta.

Lääkäri määrittää annettavien tablettien määrän. Lasten päivittäinen annos on yleensä 3 mg painokiloa kohden päivässä (=24 tuntia).

Oletko ottanut liikaa tätä lääkettä?

Jos olet ottanut liikaa, voi ilmetä seuraavia oireita: pahoinvointi, oksentelu ja (harvinaisemmin) ripuli, uneliaisuus, (mielenterveydellinen) sekavuus, ihottuma (ihon punoitus) ja kuivuminen.

Jos epäilet yliannostusta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Oletko unohtanut ottaa tämän lääkkeen?

Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota se mahdollisimman pian.

Jos seuraavaan annokseen on vähemmän aikaa kuin unohtuneeseen annokseen, sinun ei tarvitse tehdä mitään. On parempi jättää yksi annos väliin. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen annoksen.

Jos lopetat tämän lääkkeen ottamisen

Älä koskaan muuta annostusta itse tai lopeta hoitoa itse, vaikka sinulla olisi oireita. Keskustele ensin lääkärisi kanssa. Hän voi kertoa, voitko lopettaa ja miten se on parasta tehdä.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä lääkkeellä voi olla haittavaikutuksia, vaikka kaikki eivät niitä koe.

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos koet tämän lääkkeen käytön jälkeen jonkin seuraavista oireista. Vaikka ne ovat erittäin harvinaisia, oireet voivat olla vakavia:

kutina ja rakkuloita iholla huulten ympärillä ja muualla kehossa, punainen tai violetti ihottuma, joka leviää ja muodostaa rakkuloita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä); ihon yläkerroksen irtoaminen alemmista ihokerroksista koko kehossa (toksinen epidermaalinen nekrolyysi – TEN); ihottuma, kuume ja turvotus (jotka voivat olla oireita vakavammasta, nimittäin: lääkeaineen aiheuttama reaktio eosinofiliaan ja systeemisiin oireisiin (DRESS)); keltainen iho ja silmät (spironolaktoni voi aiheuttaa heikentynyttä maksan toimintaa); epäsäännöllinen sydämenlyönti, joka voi olla kohtalokas, kihelmöinti, halvaus (lihaskuntien menetys) tai hengitysvaikeudet. Nämä voivat olla oireita kohonneesta kaliumtasosta veressäsi. Lääkärisi suorittaa säännöllisesti verikokeita kaliumtason ja muiden elektrolyyttitasojen tarkistamiseksi. Tarvittaessa hän voi lopettaa hoitosi.

Alla mainitut haittavaikutukset on luokiteltu seuraavasti esiintymistiheyden mukaan:

Hyvin yleinen: esiintyy yli 1 käyttäjällä 10:stä
Gynekomastia (rintojen kasvu), rintakipu (mies).

Usein: esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä
Liikaa kaliumia veressä (hyperkalemia), sekavuus, huimaus, pahoinvointi, kutina, ihottuma, lihaskrampit, äkillinen munuaisten toiminnan heikkeneminen (akuutti munuaisten vajaatoiminta), tunnet olosi sairaaksi tai huonovointiseksi (malaise).

Joskus: esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta
Sekavuus, päänsärky, uneliaisuus, huimaus, hyvänlaatuinen rintarauhasen kasvain (miehillä), elektrolyyttihäiriöt (tiettyjen suolojen, kuten kaliumin, natriumin määrä kehossasi), koordinaatio-ongelmat (ataksia), poikkeava maksan toiminta, ihottuma, jossa on vaaleanpunaisia kyhmyjä ja voimakasta kutinaa (nokkosihottuma tai urtikaria).

Hyvin harvoin: esiintyy alle 1 käyttäjällä 10 000:sta
Myrkytys maksassa (hepatotoksisuus), maksatulehdus (hepatiitti), ihottuma, jossa on voimakasta kutinaa (nokkosihottuma) ja kyhmyjen muodostumista (urtikaria), ihottuma, jossa on läiskiä ja kyhmyjä (makulopapulaarinen ihottuma) tai ihottuma, joka koostuu punaisista läiskistä (erytematoottinen purkauma).

Tuntematon: saatavilla olevien tietojen perusteella esiintymistiheyttä ei voida arvioida

Erittäin vakava verisairaus, johon liittyy äkillinen korkea kuume, voimakas kurkkukipu ja haavaumat suussa (agranulosytoosi), alentunut verenpaine, kuivuminen. Liian vähän valkosoluja veressä (leukopenia), vähän verihiutaleita veressä (trombosytopenia). Liian vähän natriumia veressä (hyponatremia), erityisesti intensiivisen hoidon aikana yhdessä tiatsididiureettien kanssa, veren happamoituminen (metabolinen asidoosi). Mahavuoto, haavaumat, ripuli, pahoinvointi, oksentelu ja kouristukset jaloissa. Vakava sairaus, joka yleensä johtuu lääkkeestä tai infektiosta (Stevens-Johnsonin oireyhtymä). Sairaus alkaa ihottumalla ja rakkuloilla. Rakkulat voivat olla suussa, nenässä, emättimessä, peniksen päässä, vakava ihottuma (toksinen epidermaalinen nekrolyysi). Voit kärsiä kuumeesta, rakkuloista, ihon kuoriutumuksesta, ihon irtoamisesta. Ihottuma, jossa on voimakasta ihon tulehdusta lääkkeen aiheuttaman allergian vuoksi (DRESS-oireyhtymä) ja liikaa valkosoluja (eosinofilia). Valkosolut suojaavat kehoa sairauksilta. Hiustauti, joka aiheuttaa kaljuja kohtia päähän (alopecia areata) tai liiallista ei-toivottua karvankasvua paikoissa, joissa normaalisti on vain kevyttä karvoitusta (hypertrikoosi). Pemfigoidi (tila, jossa iholla esiintyy nestetäytteisiä rakkuloita).
Miehet: impotenssi, vähentynyt seksuaalinen halu (libido).
Naiset: liiallinen karvankasvu (hirsutismi), kuukautisten puuttuminen (amenorrea), epäsäännölliset kuukautiset (epäsäännölliset kuukautiset), kuukautiset, joissa on suuria, yleensä epäsäännöllisiä välejä (oligomenorrea), kivuliaat rinnat ja äänen madaltuminen.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Hollannin Haittavaikutuskeskukseen Lareb, verkkosivusto: www.lareb.nl. Ilmoittamalla haittavaikutuksista autat meitä saamaan enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

5. Miten säilytät tämän lääkkeen?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Säilytä alle 25°C alkuperäispakkauksessa kosteuden ja valon suojaamiseksi (suihku ja keittiö eivät sovellu).

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Se löytyy pakkauksesta ja läpipainopakkauksista "EXP" (= ei käytettävä tämän jälkeen) jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivä.

Voit palauttaa käyttämättömät tabletit apteekkiisi hävitettäväksi.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekkariltasi, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Kun hävität lääkkeit oikein, ne tuhotaan asianmukaisesti eivätkä päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Vaikuttava aine on spironolaktoni. Jokainen tabletti sisältää vastaavasti 25, 50 ja 100 mg spironolaktonia.

Muut aineet (apuaineet) tässä lääkkeessä ovat: laktoosi, maissitärkkelys, kalsiumfosfaatti, polyvidoni, talkki, magnesiumstearaatti, piparminttuöljy, piidioksidi, hydroksipropyylimetyyliselluloosa, polyetyleeniglykoli, titaanidioksidi (E171), shellakka, valkoinen mehiläisvaha ja karnaubavaha.

Miltä Spironolacton Aurobindo näyttää ja mitä pakkaus sisältää?

Varmista, että käytät oikeaa lääkettä:

25 mg tabletit: pyöreät, kaksoiskuperat, valkoiset tabletit, joiden halkaisija on 8 mm.

50 mg tabletit: pyöreät, kaksoiskuperat, valkoiset tabletit, joiden halkaisija on 10 mm.

100 mg tabletit: pyöreät, kaksoiskuperat, valkoiset tabletit, joiden halkaisija on 11 mm.

Tabletit ovat saatavilla läpipainopakkausissa, joissa on 20, 30 tai 50 kappaletta, ja pulloissa, joissa on 100 ja 250 kappaletta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Alankomaat

Valmistaja
Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Alankomaat

Lääke on rekisteröity seuraavasti:

RVG 24686 Spironolaktoni Aurobindo 25 mg, tabletit

RVG 24687 Spironolaktoni Aurobindo 50 mg, tabletit

RVG 24688 Spironolaktoni Aurobindo 100 mg, tabletit

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty marraskuussa 2025.