

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
testosteroon

Lugege see infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab teie jaoks olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Teil võib seda hiljem vaja minna.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arstiga või apteekriga.

Sisu sellest infolehest Mis on

1. Mis on Testavan ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi seda ravimit kasutada või millal peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Testavan ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Mis on Testavan?

See ravim on selge geel, mis sisaldab testosterooni, meessuguhormooni, mida keha loomulikult viisil toodab.

Seda ravimit kasutatakse testosterooni asendamiseks täiskasvanud meestel, kes ei tooda piisavalt loomulikku testosterooni, mida nimetatakse 'hüpogonadismiks'. Ravim aitab teie testosteroonitaset normaalsele tasemele viia.

Mida teeb testosteroon?

Testosterooni toodavad teie kehas loomulikult viisil munandid.

See aitab sperma tootmisel ning meeste tunnuste, nagu madal hääl ja kehakarvad, arengul ja säilitamisel.

See on vajalik normaalseks seksuaalseks funktsioneerimiseks ja seksuaalse erutuse saavutamiseks.

See aitab säilitada ka lihasmassi ja -jõudu.

Milleks seda ravimit kasutatakse?

Seda ravimit kasutatakse meestel testosterooni asendamiseks erinevate terviseprobleemide raviks, mis on põhjustatud puudulikkusest testosteroonist (meessuguhormoonide puudulikkus). See puudulikkus tuleb tõestada kahe eraldi vere testosteroonitaseme mõõtmisega. Samuti peavad esinema kliinilised tunnused ja sümptomid nagu:

Impotentsus (erektiiooniprobleemid)

viljatus
vähe huvi seksi vastu
väsimus
depressiivne meeleolu
luukadu, põhjustatud madalast hormoonitasemest
osaline sekundaarsete sugutunnuste kaotus nagu hääle muutused või rasvade jaotuse muutused
kaotus osa teie näo- ja kehakarvadest.

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Kes tohib seda ravimit kasutada?

Ainult mehed tohivad seda ravimit kasutada.
Lapsed ja noorukid alla 18 aasta ei tohi seda ravimit kasutada.
Naised ei tohi seda ravimit kasutada, vanus ei ole oluline.
Ärge laske naistel (eriti rasedatel või rinnaga toitvatel naistel) või lastel kokku puutuda Testavan geeliga või nahapiirkondadega, kuhu see ravim on kantud.

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline selle ravimi mõne koostisosa suhtes. Neid aineid leiate jaotisest 6.
Kui teil on eesnäärmevähk või kahtlustatakse seda.
Kui teil on rinnavähk (see on meestel haruldane) või kahtlustatakse seda.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?

Testosteronravi võib kiirendada juba olemasoleva eesnäärmevähi arengut. Teie arst teeb vajalikud testid enne, kui saate seda ravimit kasutada. Samuti toimuvad järelkontrollid regulaarsete vereanalüüside ja eesnäärmeuuringute kaudu.

Võtke ühendust oma arstiga enne selle ravimi kasutamist, kui teil on või on kunagi olnud mõni järgmistest seisunditest:

Teil on raskusi urineerimisega suurenenud eesnäärme tõttu.

Teil on luuvähk: teie arst kontrollib teie kaltsiumitaset.

Teil on kõrge vererõhk või teid ravitakse kõrge vererõhu tõttu, sest see ravim võib põhjustada vererõhu tõusu.

Teil on raske südame-, maksa- või neeruhaigus, sest ravi selle ravimiga võib põhjustada tõsiseid probleeme kehas vedelikupeetuse vormis. See võib mõnikord kaasneda (kongestiivse) südamepuudulikkusega (vedeliku kogunemine südames).

Teil on isheemiline südamehaigus (südamehaigus, mille puhul on häiritud verevarustus südamesse).

Verehüübimishäired

- o trombofiilia (vere hüübimishäire, mis suurendab tromboosi riski (verehüübed veresoontes).
- o tegurid mis suurendavad verehüüvete riski veresoones: varasemad verehüübed veresoones, suitsetamine, rasvumine, vähk, pikk istumine, kui mõnel teie lähisugulasel on noores eas (näiteks alla 50-aastaselt) olnud verehüübe jalas, kopsus või mõnes muuselundis, või kui te vananete.

- o Kuidas ära tunda verehüüvet? Valulik turse ühes jalas või äkiline nahavärvi muutus, nagu kahvatus, punetus või sinakus, äkiline hingeldus, äkiline seletamatu köha, mille puhul võib tekkida vere köhimine; või äkiline valu rinnus, tugev peapööritus või pearinglus, tugev kõhuvalu, äkiline nägemise kaotus. Teavitage kohe arsti, kui teil esineb mõni neist sümptomitest.

Te kannatate epilepsia all..

olete haige migreen.

Teil on uneaegseid hingamisraskusi, mis esinevad sagedamini, kui teil on ülekaalulisus või pikaajalised kopsuprobleemid.

Kui mõni ülaltoodud olukord kehtib teie kohta (või kui te kahtlete), võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga. Selle ravimi kasutamine võib neid seisundeid halvendada.

Pöörduge tagasi oma arsti poole nõu saamiseks, kui teil tekivad nahareaktsioonid kohas, kuhu olete seda ravimit kandnud. Võib olla vajalik selle ravimi kasutamine lõpetada.

Enne ja/või ravi ajal peab teie arst tegema järgmised vereanalüüsid:

testosterooni tase veres, täielik vereanalüüs (test, mis tuvastab kõrvalekaldeid veres). Selle ravimi igapäevase pealekandmise ajal ja vahetult pärast seda ei tohi te niisutavaid vahendeid ega päikesekaitsetooteid kanda kohale, kuhu olete geeli kandnud.

Kuidas vältida selle ravimi ülekandumist teisele isikule?

See ravim võib kanduda teistele inimestele otsese naha-naha kontakti kaudu. See võib põhjustada nende kehas testosterooni taseme tõusu, mis võib olla ohtlik. Selline tõus võib tekkida pärast ühte kontakti, kuid võib aja jooksul aeglaselt koguneda lühikeste kontaktide kaudu.

See on eriti oluline naiste ja laste jaoks. Tavaliselt on neil kehas vaid madal testosterooni tase.

Rasedad naised ei tohi selle ravimiga kokku puutuda. Kui teie partner on rase, peate olema ettevaatlik ja kaitsma teda igasuguse kontakti eest ravimiga ja pealekandmiskohaga.

Et vältida geeli ülekandumist oma nahalt teisele inimesele, peate:

ravimit kandma aplikaatoriga (vahend ravimi pealekandmiseks) ja mitte sõrmedega. kohe pesema oma käed vee ja seebiga, kui teie käed on selle ravimiga kokku puutunud. koha kuhu olete geeli kandnud, katma riietega kohe, kui geel on kuivanud. üks vanni või duši all käimine või riiete kandmine, et katta pealekandmiskoht (näiteks T-särk), enne kui teil on otsene nahk-naha kontakt teise inimesega.

Et suurendada oma partneri ohutust, peate enne vahekorda pesema pealekandmiskoha seebi ja veega, näiteks duši all, või kui see pole võimalik, kandma T-särki, mis katab pealekandmiskoha kontaktperioodi ajal.

Mis siis, kui keegi teine puutub selle ainega kokku?

Kui keegi teine puudutab geeli või on nahk-naha kontaktis kohaga, kuhu te geeli kandsite, peab ta kontaktpiirkonna võimalikult kiiresti seebi ja veega pesema. Mida kauem on geel enne pesemist nahaga kontaktis, seda suurem on tõenäosus, et inimene omastab veidi testosterooni.

Kui see aine on edasi kandunud teisele inimesele, peate jälgima oma ümbruses olevate inimeste kehalisi või käitumuslikke muutusi. Kui keegi teie ümbruses saab mõne järgmistest sümptomitest, peab ta minema arsti juurde:

- akne (vistrikud)
- hääl madaldumine
- näo - või kehakarvade kasv
- menstruatsiooni muutused varajane
- varajane puberteet, suguelundite suurenemine või muutused laste seksuaalkäitumise tasemes

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?

Kas te kasutate lisaks Testavan veel teisi ravimeid, kas olete seda hiljuti teinud või on võimalus, et te kasutate lähitulevikus teisi ravimeid? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile. See kehtib ka ravimite kohta, mida saate ilma retseptita, ja taimsete ravimite kohta. Testavan võib mõjutada nende ravimite toimet ja teil võib olla vaja oma annuseid kohandada.

Rääkige eriti oma arstile või apteekrile, kui te võtate järgmist:

- ravimid vere vedeldamiseks (antikoagulandid): Testavan võib nende ravimite toimet tugevdada.
- kortikosteroidid (hormoonid, mida kasutatakse põletike pärssimiseks) või teised ravimid, mis võivad suurendada nende hormoonide tootmist: nii kortikosteroidid kui ka Testavan võivad põhjustada keha vedelikupeetust.
- insuliin veresuhkru taseme kontrolli all hoidmiseks (diabeedi korral): teil võib olla vaja insuliini annust vähendada, kui teid ravitakse Testavan.

Kui mõni ülaltoodud olukord kehtib teie kohta (või kui te kahtlete), võtke enne Testavan kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

See ravim ei ole mõeldud kasutamiseks rasedatele naistele ega imetavatele emadele.

Kui teie partner on rase või jääb rasedaks, järgige juhiseid jaotises „Kuidas vältida selle ravimi ülekandumist teisele isikule?“.

Rasedad naised peavad vältima igasugust nahakontakti selle ravimi kasutajate nahapiirkondadega. See ravim võib kahjustada sündimata last. Kontakti korral tuleb kontaktipiirkond võimalikult kiiresti seebi ja veega pesta.

Imetavad naised peavad vältima igasugust nahakontakti selle ravimi kasutajate nahapiirkondadega.

See ravim pärsib sperma tootmist. See protsess on pöörduv.

Testavan sisaldab propüleenglükooli

See ravim sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

Testavan sisaldab etanooli

See ravim sisaldab 538,70 mg alkoholi (etanooli) iga 1,15 g annuse kohta, mis vastab 468,40 mg/g (46,84 w/w). See võib ärritunud nahal põletustunnet tekitada.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kas kahtlete õiges kasutamises? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui palju tohib kasutada?

Selle ravimi soovitatav algannus on 23 mg testosterooni (vajutage pumpa üks kord). Annus tuleb manustada üks kord päevas umbes samal ajal ja eelistatavalt hommikul. Mõned patsiendid vajavad võimalik suuremat annust. Maksimaalne soovitatav annus on 69 mg testosterooni päevas (vajutage pumpa kolm korda). Maksimaal soovitatav annus on 69 mg testosterooni päevas (pumba kolm korda vajutamine).

Teie arst määrab selle ravimi täpse annuse, mida te täpselt vajate. Selleks mõõdab tema/tema regulaarselt kaks asja:

testosterooni tase veres teie veri ulatus, milles ravim teie puhul toimib.

Võtke ühendust oma arstiga, kui arvate, et ravimil on liiga tugev või liiga nõrk toime.

Selle ravimi kasutamine

Oluline on, et loeksite ja järgiksite neid juhiseid selle ravimi õigeks kasutamiseks.

Kandke see ravim oma nahale aplikaatori abil (vahend ravimi pealekandmiseks). Nahale kandmist nimetatakse "transdermaalseks kasutamiseks". Ravim jõuab kehasse naha kaudu.

Oluline on, et loeksite ja järgiksite neid juhiseid selle ravimi õigeks kasutamiseks.

Kandke seda ravimit oma nahale aplikaatori abil (vahend ravimi pealekandmiseks). Nahale kandmist nimetatakse "transdermaalseks kasutamiseks". Ravim jõuab kehasse läbi naha. Kandke ravimit ainult puhtale, kuivale ja normaalselt tervele nahale õlgadel või õlavarrel.

Ärge kunagi kandke seda vahendit:


peenisele ja munanditele

lõhenenud või kahjustatud nahale

avatud nahahaavanditele, haavadele või ärritunud nahale.

Tarvikud mida te vajate Pumbakomplekt

geeliga. Vaadake joonist A. Karp salvrätikutega koos salvrätikud.




figuur A

Märkus: Multipakendid sisaldavad korki peal iga pumbapea

Geelipumpa õhutamise – ainult esmakordsel kasutamisel

Enne uue pumba kasutamist tuleb see kasutusvalmis teha. Seda nimetatakse pumba õhutamiseks . nimetatud.

Eemaldage aplikaator (vahend ravimi pealekandmiseks) pumbalt üksikpakendi korral või eemaldage pumba kork mitmepakendi korral. B. Õhutage pumba, vajutades B.



figuur B

Eemaldage pumbast õhk, keerates pumbapea täielikult alla vajutada. Hoidke selle tegemisel all lappi. Korrake seda sammu, kuni geel ilmub. Vaadake joonist C.



figuur C

Ärge kasutage geeli, mis on pumbast välja tulnud õhutamise ajal, kuna see ei pruugi olla õige annus.


Visake kasutatud lapid ohutult ära, et vältida toote edasikandumist teistele, sealhulgas lastele või lemmikloomadele.

Teie pump on nüüd kasutamiseks valmis.

Järgige igapäevaseks annustamiseks samme 1 kuni 4


Samm 1: Geeli pealekandmise ettevalmistamine

Valige puhas, kuiv ja normaalselt terve nahapiirkond õlavarre ja õla peal, mida saab katta T-särk lühikese varrukaga. Vaadake joonist D.
Kandke geeli ainult õlavarrele ja õlale.



figuur D

Eemaldage pumba aplikaator. Vaadake joonist E.



figuur E

Eemaldage aplikaatori kork. Vaadake joonis F.



figuur F

Samm 2: Teie geel pealekandmine

Hoidke pumba nii, et pihusti oleks suunatud aplikaatori otsa poole.
Vajutage pumbapea üks kord täielikult alla. Vaata joonis G.



figuur G

Kasutage aplikaatorit, et geel ühtlaselt jaotada ühele õlavarrele ja õlale. Veenduge, et



figuur H

teie käed ei puutuks geeliga kokku. Vaata joonis H.

Kasutage lappi, et puhastada maha valgunud geel. Visake kasutatud lapp ohutult ära, et vältida toote edasikandumist teistele, sealhulgas lastele või lemmikloomadele.

Leidke oma annus, mille arst teile määras, allolevast tabelist.

Annus	Kuidas geeli kanda
23 mg (pump ühe korra vajutada)	Vajutage pumpa ühe korra, nagu on näidatud 2. sammus. Tehke seda ühe korra.
46 mg (pump kahe korra vajutada)	Vajutage pumpa ühe korra, nagu on näidatud 2. sammus. Korrake, et rakendada teine pumbadoos ja kandke geel teisele õlavarrele ja õlale.
69 mg (pump kolm korda vajutada)	Vajutage pumpa üks kord, nagu on näidatud 2. sammus. Korrake, et rakendada teine pumbadoos ja kandke geel teisele õlavarrele ja õlale. Korrake uuesti kolmanda pumbadoosi rakendamiseks ja kandke geel esimesena kasutatud õlavarrele ja õlale.

Samm 3: Teie aplikaator puhastamine

Puhastage aplikaator pärast kasutamist lapiga. Vaata joonis I.



figuur I

Visake kasutatud lapp ohutult ära, et vältida toote edasikandumist teistele, sealhulgas lastele või lemmikloomadele.

PIDAGE MEELES asetada kork tagasi aplikaatorile ja asetada aplikaator tagasi pumbale. Vaata joonis J.



figuur J

Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.

Samm 4: Pärast geeli pealekandmist

Peske oma käed kohe seebi ja veega, kui need on geeliga kaetud.

Geel on süttiv, kuni see kuivab. Laske geelil kuivada enne suitsetamist või lahtise tule lähedusse minekut.

Laske pealekandmiskohal täielikult kuivada enne riietumist.

Kandke riideid, mis katavad pealekandmiskoha igal ajal, et vältida toote tahtmatut ülekandumist teistele.

Oodake vähemalt 2 tundi enne duši all käimist, ujumist või vannis käimist.

Peske pealekandmiskohta seebi ja veega enne igat olukorda, kus on suur tõenäosus naha-naha kontaktiks pealekandmiskoha ja teise inimese vahel.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Kui olete kogemata seda ravimit liiga palju peale kandnud, peske pealekandmiskohta seebi ja veega niipea, kui seda mäletate.

Kasutage ainult seda ravimikogust, mille arst on määranud. Kui tunnete end ärritunult või närviliselt, võtate kaalus juurde või teil on pikaajalised või sagedased erektsioonid, võib see tähendada, et kasutate liiga palju.

Kui olete seda ravimit liiga palju kasutanud või sisse võtnud, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kas unustasite seda ravimit kasutada?

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kui peate järgmise annuse manustama 12 tunni jooksul, jätke unustatud annus vahele.

Jätkake edasi järgmise annusega tavaline annus.

Kui järgmise annuseni on rohkem kui 12 tundi, manustage unustatud annus. Jätkake järgmisel päeval edasi tavalise annusega ..

Võtke ühendust oma arstiga enne selle ravimi kasutamise lõpetamist.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see

ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi mitte kõigil ei pruugi need esineda. Sageli (esineb vähem kui 1-l 10-st kasutajast)

Sageli (esineb vähem kui 1-l kasutajal 10-st)

nahairritatsioon kuhu geeli on kantud (sealhulgas nahalööve, kuivus ja punetus)
kõrge rasvasisaldus (triglütseriidid) veres
kõrgenenud vererõhk
kõrgenenud eesnäärmepetsiifiline antigeen (PSA). PSA on valk, mida eesnääre toodab ja mida saab kasutada eesnäärmehaiguse avastamiseks.
kõrgenenud punaste vereliblede protsent veres (hematokrit), mida määratakse regulaarsete vereanalüüsidega

Mõnikord (esineb vähem kui 1-l 100-st kasutajast)

kõrgenenud hemoglobiin (punaste vereliblede komponent, mis transpordib hapnikku), mida määratakse regulaarsete vereanalüüsidega
peavalu

Muud teadaolevad kõrvaltoimed, mis on seotud testosteroonraviga, on muu hulgas:

(noorus)vistrikud (akne), nahahaigus, mille puhul nahale tekivad rasused ketud liigse rasu tootmise tõttu (seborröa), kiilaspäisus, higistamine, suurenenud kehakarvade kasv, kihelev tunne või tundetus nahal, peavalu, peapööritus, iiveldus, kuumahood, vedelikupeetus (nagu pahklude turse), kaalutõus, ajutine hingamise seiskumine une ajal (uneapnoe), hingeldus, ülitundlikkusreaktsioonid, iiveldus/halb enesetunne, meeleolumuutused (nagu agressiivsus, vaenulikkus, närvilisus, ärevus, depressioon), unetus, lihasvalu või -krambid, rindade suurenemine, suurenenud punaste vereliblede arv, vähenenud punaste vereliblede arv, verehüübed, kollatõbi (maksaprobleemid, mis mõnikord kaasnevad naha ja silmavalgete kollaseks muutumisega), ebatavalised maksafunktsiooni testide tulemused.

Muutunud seksuaalsoov, sagedasem erektsioon, pikaajalised ja valulikud erektsioonid (priapism), munandihaigus (meessugunääre), vähenenud sperma hulk, urineerimiskeskused, muutused eesnäärmes, eesnäärmevähk (puuduvad veenvad tõendid, et testosterooni asendamine hüpogonadaalsetel meestel (mehed, kellel on testosterooni puudus) põhjustab eesnäärmevähki; kuid testosteroonravi tuleks vältida meestel, kellel on juba teadaolevalt või kahtlustatavalt eesnäärmevähk).

Pikaajaline testosterooni manustamine võib viia soolade (elektrolüütide) ja vee taseme muutusteni kehas.

Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskuse Lareb, veebisait www.lareb.nl. 5. Kuidas seda ravimit säilitada?

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Selle ravimi jaoks ei ole eritingimusi säilitamiseks.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on märgitud pumba etiketil ja välispakendil pärast "EXP". Seal on märgitud kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Need hävitatakse vastutustundlikult ja ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on testosteroon.

Selle ravimi teised abiained on etanool 96%, propüleenglükool (E 1520),
Teised abiained selles ravimis on etanool 96%, propüleenglükool (E 1520),
diüleenglükoolmonoetüleeter, karbomeer 980, trolamiin, dinatriumedetaat ja puhastatud vesi.

Üks gramm geeli sisaldab 20 mg testosterooni. Üks kord pumba vajutamine annab 1,15 g (1,25 ml) geeli 23 mg testosterooniga.

Kuidas see ravim välja näeb ja kui palju on pakendis?

Testavan on ühtlane, läbipaistev kuni peaaegu läbipaistev geel.

Järgmised pakendid on saadaval koos või ilma korgi aplikaatori ja hügieenikaanega:

Üksikpakend 1 doseerimispumbaga.

Mitmepakend 3 doseerimispumbaga.

Iga pump sisaldab 85,5 g Testavan geeli ja võib vabastada 56 mõõdetud annust. Mitte kõiki nimetatud pakendisuurusi ei turustata.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Iirimaa Tootja

Copea Pharma Europe Limited, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Iirimaa

Aplikaator koos korgiga:

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Iirimaa Number loast müügiloa jaoks turule viimiseks RVG 120624

RVG 120624

See ravim on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ja Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) järgmiste nimede all:

Testarzon	20 mg/g transdermaalne geel/geel transdermaalne //transdermaalsed Geel
Bulgaria	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Taani	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Saksamaa	Testavan 20 mg/g transdermaalsed Geel
Eesti	Testavan
Soome	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Prantsusmaa	Testavan 20 mg/g geel transdermaalne
Kreeka	Testarzon 20 mg/g δαdermaalne geel
Ungari	Testarzon 20 mg/g transdermaalne geel
Irish	Testarzon 20 mg/g transdermaalne geel
Island	Testavan 20 mg/g geel kasutamiseks nahal peal nahk
Itaalia	Testavan 20 mg/g geel transdermaalne
Horvaatia	Testarzon 20 mg/g transdermaalne geel
Läti	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Liechtenstein	Testavan 20 mg/g transdermaalne Geel
Leedu	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Luksemburg	Testarzon 20 mg/g transdermaalne geel/geel transdermaalne transdermaalne Geel
Holland	Testavan 20 mg/g geel transdermaalseks kasutamiseks
Norra	Testavan 20 mg/g transdermaalgeel
Austria	Testavan 20 mg/g transdermaalne Geel
Poola	Testavan
Portugal	Testavan 20 mg/g geel transdermaalne
Rumeenia	Testavan 20 mg/g geel transdermaalne
Sloveenia	Testarzon 23 mg/rõhk transdermaalne geel
Slovakkia	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Hispaania	Testavan 20 mg/g geel transdermaalne
Tšehhi	Testavan
Ühendkuningriik (Põhja-Irish)	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel
Rootsi	Testavan 20 mg/g transdermaalne geel

Seda pakendi infolehte uuendati viimati augustis 2023