

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle

Testavan 20 mg/g transdermaaligeeli testosteroni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin uudelleen.
- Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.
- Älä anna tätä lääkettä muille, sillä se on määrätty vain sinulle. Se voi olla haitallista muille, vaikka heillä olisi samanlaisia oireita kuin sinulla.
- Onko sinulla jokin haittavaikutus, joka mainitaan kohdassa 4? Tai saatko haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa? Ota silloin yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Sisältö tässä pakkausselosteessa Mitä

1. on Testavan ja mihin tätä lääkettä käytetään?
2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai milloin on oltava erityisen varovainen?
3. Kuinka käytät tätä lääkettä?
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Kuinka säilytät tätä lääkettä?
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mikä on Testavan ja mihin tätä lääkettä käytetään?

Mikä on Testavan?

Tämä lääke on kirkas geeli, joka sisältää testosteronia, mieshormonia, jota keho tuottaa luonnollisesti.

Tätä lääkettä käytetään korvaamaan testosteronia aikuisilla miehillä, jotka eivät tuota riittävästi luonnollista testosteronia, mikä tunnetaan nimellä 'hypogonadismi'. Lääke auttaa nostamaan testosteronitasosi normaalille tasolle.

Mitä testosteroni tekee?

Testosteronia tuotetaan luonnollisesti kehossasi kiveksissä.

Se auttaa siittiöiden tuotannossa ja miespuolisten ominaisuuksien, kuten matalan äänen ja kehon karvoituksen, kehittymisessä ja ylläpitämisessä.

On välttämätöntä voida toimia normaalisti seksuaalisesti ja kiihottua seksuaalisesti.

Se auttaa myös säilyttämään lihassmassan ja -voiman.

Mihin tätä lääkettä käytetään?

Tätä lääkettä käytetään miehillä testosteronin korvaamiseen erilaisten terveysongelmien hoitamiseksi, jotka johtuvat testosteronin puutteesta. Testosteronin puute (miespuolinen hypogonadismi). Tämä puute on osoitettava kahdella erillisellä verikokeella testosteronitasosta. Lisäksi on oltava kliinisiä merkkejä ja oireita, kuten:

Impotenssi (erektio-ongelmat)

hedelmättömyys
vähän halua seksiin
väsymys
masentunut mieliala
luukato, joka johtuu alhaisesta hormonitasosta
osittainen toissijaisten sukupuoliominaisuuksien menetys, kuten muutokset äänessä tai muutokset rasvan jakautumisessa
hiustenlähtö osasta kasvojen ja kehon karvoitusta.

2. Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää tai on oltava erityisen varovainen?

Kuka voi käyttää tätä lääkettä?

Vain miehet saavat käyttää tätä lääkettä.
Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tätä lääkettä.
Naiset eivät saa käyttää tätä lääkettä, iästä riippumatta.
Älä anna naisten (erityisesti raskaana olevien tai imettävien naisten) tai lasten joutua kosketuksiin Testavan geelin tai ihoalueiden kanssa, joille tätä lääkettä on levitetty.

Milloin tätä lääkettä ei saa käyttää?

Olet allerginen jollekin tämän lääkkeen aineosalle. Nämä aineet löytyvät kohdasta 6.
Jos sinulla on eturauhassyöpä tai epäily siitä.
Jos sinulla on rintasyöpä (tämä on harvinaista miehillä) tai epäily siitä.

Milloin on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen kanssa?

Testosteronihoito voi nopeuttaa jo olemassa olevan eturauhassyövän kehittymistä. Lääkärisi suorittaa tarvittavat testit ennen kuin voit käyttää tätä lääkettä. Seuranta jatkuu säännöllisillä verikokeilla ja eturauhasen tutkimuksilla.

Ota yhteyttä lääkäriisi ennen tämän lääkkeen käyttöä, jos sinulla on tai on ollut jokin seuraavista sairauksista: .

Sinulla voi olla vaikeuksia virtsata suurentuneen eturauhasen vuoksi.

Sinulla on luusyöpä: lääkärisi tarkistaa kalsiumtasosi.

Sinulla on korkea verenpaine tai sinua hoidetaan korkean verenpaineen vuoksi, koska tämä lääke voi aiheuttaa verenpaineen nousua.

Sinulla on vakava sydän-, maksa- tai munuaissairaus, koska tämän lääkkeen käyttö voi johtaa vakaviin ongelmiin kehosi nesteiden kertymisen muodossa. Tämä liittyy joskus (kongestiiviseen) sydämen vajaatoimintaan (nesteiden kertymiseen sydämeen).

Sinulla on iskeeminen sydänsairaus (sydänsairaus, jossa verenkierto sydämeen on heikentynyt).

Verenhiyytymishäiriöt

- o trombofilia (verenhiyytymishäiriö, joka lisää tromboosiriskiä (verihyytymiä verisuonissa).
- o tekijät jotka lisäävät verihyytymien riskiä verisuonessa: aiemmat verihyytymät verisuonessa, tupakointi, ylipaino, syöpä, pitkäaikainen paikallaanolo, jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut nuorena (esimerkiksi alle noin 50-vuotiaana) verihyytymä jalassa, keuhkossa tai muussaelimessä, tai jos ikäännyt.

- o Miten tunnistat verihyytymän? Kivulias turvotus yhdessä jalassa tai äkillinen ihonvärin muutos, kuten kalpeus, punoitus tai sinertävyys, äkillinen hengästyminen, äkillinen selittämätön yskä, jossa voi olla verta; tai äkillinen rintakipu, voimakas huimaus tai pyöritys, voimakas vatsakipu, äkillinen näönmenetys. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos koet jonkin näistä oireista.

Sinä kärsit epilepsiasta ..

olet on migreeni.

Sinulla on hengitysvaikeuksia unen aikana, mikä ilmenee todennäköisemmin, jos sinulla on ylipainoa tai pitkäaikaisia keuhko-ongelmia.

Jos jokin yllä mainituista tilanteista koskee sinua (tai jos olet epävarma), ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tämän lääkkeen käyttö voi pahentaa näitä sairauksia.

Käänny lääkärisi puoleen saadaksesi neuvoja, jos saat ihoreaktioita kohtaan, johon olet levittänyt tätä lääkettä. Saattaa olla tarpeen lopettaa tämän lääkkeen käyttö.

Ennen ja/tai hoidon aikana lääkärisi tulee suorittaa seuraavat verikokeet:

testosteronitaso veressä, täydellinen verenkuvaa (koe, joka havaitsee poikkeavuuksia veressä). Tämän lääkkeen päivittäisen levittämisen aikana ja heti sen jälkeen et saa käyttää kosteuttavia aineita tai aurinkosuojatuotteita kohtaan, johon olet levittänyt geelin.

Miten voit estää tämän lääkkeen siirtymisen toiselle henkilölle?

Tämä lääke voi siirtyä toisille henkilöille suorassa iho-iho-kontaktissa. Tämä voi johtaa testosteronitason nousuun heidän kehossaan, mikä voi olla vaarallista. Tällainen nousu voi tapahtua yhden kontaktin jälkeen, mutta se voi myös ajan myötä hitaasti kasvaa lyhyiden kontaktien kautta.

Tämä on erityisen tärkeää naisille ja lapsille. Normaalisti heillä on vain alhainen testosteronitaso kehossaan.

Raskaana olevat naiset eivät saa joutua kosketuksiin tämän lääkkeen kanssa. Jos kumppanisi on raskaana, sinun on oltava varovainen ja suojeltava häntä kaikilta kosketuksilta lääkkeen ja levityskohdan kanssa.

Estääksesi geelin siirtymisen iholtasi toiselle henkilölle, sinun tulee:

levittää lääkettä applikaattorilla (väline lääkkeen levittämiseen) eikä sormillasi.

heti pestä kätesi vedellä ja saippualla, jos kätesi ovat joutuneet kosketuksiin tämän lääkkeen kanssa.

peittää kohdan, johon olet levittänyt geelin, vaatteilla heti kun geeli on kuivunut.

yksi ottaa kylpy tai suihku tai käyttää vaatteita peittämään levityspaikan (kuten T-paita) ennen kuin sinulla on suoraa ihokosketusta toisen henkilön kanssa.

Lisätäkseen kumppanisi turvallisuutta, sinun tulee pestä levityspaikka saippualla ennen yhdyntää, esimerkiksi suihkussa, tai jos se ei ole mahdollista, käyttää T-paitaa, joka peittää levityspaikan kontaktin aikana.

Mitä jos toinen henkilö altistuu tälle aineelle?

Jos toinen henkilö koskettaa geeliä tai on ihokosketuksessa alueen kanssa, johon olet levittänyt geelin, hänen tulee pestä kosketusalue mahdollisimman pian saippualla ja vedellä.

Mitä pidempään geeli on kosketuksissa ihon kanssa ennen pesua, sitä suurempi on mahdollisuus, että henkilö imee jonkin verran testosteronia.

Jos tämä aine on siirtynyt toiselle henkilölle, sinun tulee kiinnittää huomiota mahdollisiin kehon tai käyttäytymisen muutoksiin ympärilläsi olevilla ihmisillä. Jos joku ympärilläsi saa jonkin seuraavista oireista, hänen tulee mennä lääkäriin:

akne (finnit)

äänen kasvu

kasvojen - tai vartalonkarvoitusmuutokset kuukautisissa

kuukautisissa varhainen kuukautiset

varhainen murrosikä, sukuelinten suurentuminen tai muutokset seksuaalisessa käyttäytymisessä lapsilla

Käytättekö muita lääkkeitä?

Käytättekö lisäksi Testavan muita lääkkeitä, oletteko tehneet niin äskettäin tai onko mahdollista, että aiotte käyttää muita lääkkeitä lähitulevaisuudessa? Kertokaa siitä lääkärillenne tai apteekkarillenne. Tämä koskee myös lääkkeitä, joita saatte ilman reseptiä, ja rohdosvalmisteita. Testavan voi vaikuttaa näiden lääkkeiden tehoon, ja annostanne saattaa olla tarpeen muuttaa.

Kertokaa erityisesti lääkärillenne tai apteekkarillenne, jos käytätte seuraavia:

lääkkeitä veren ohentamiseen (antikoagulantit): Testavan voi voimistaa näiden lääkkeiden vaikutusta.

kortikosteroidit (hormonit, joita käytetään tulehdusten hillitsemiseen) tai muut lääkkeet, jotka voivat lisätä näiden hormonien tuotantoa: sekä kortikosteroidit että Testavan voivat aiheuttaa kehon nesteiden kertymistä.

insuliini verensokeritason hallintaan (diabeteksessa): insuliiniannostanne saattaa olla tarpeen pienentää, jos teitä hoidetaan Testavan.

Jos jokin yllä mainituista tilanteista koskee sinua (tai jos olet epävarma), ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi ennen kuin käytät Testavan -valmistetta.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu raskaana oleville tai imettäville naisille.

Jos kumppanisi on raskaana tai tulee raskaaksi, noudata ohjeita kohdassa "Kuinka estää tämän lääkkeen siirtyminen toiselle henkilölle?".

Raskaana olevien naisten tulee välttää ihokosketusta miesten kanssa, jotka käyttävät tätä lääkettä. Tämä lääke voi vahingoittaa sikiötä. Kosketuksen sattuessa kosketusalue tulee pestä mahdollisimman pian saippualla ja vedellä.

Imettävien naisten tulee välttää ihokosketusta miesten kanssa, jotka käyttävät tätä lääkettä.

Tämä lääke vähentää siittiöiden tuotantoa. Tämä prosessi on palautuva.

Testavan sisältää propyleeniglykolia

Tämä lääke sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Testavan sisältää etanolia

Tämä lääke sisältää 538,70 mg alkoholia (etanolia) per 1,15 g annos, mikä vastaa 468,40 mg/g (46,84 w/w). Se voi aiheuttaa polttavaa tunnetta ärtyneellä iholla.

3. Miten käytät tätä lääkettä?

Käytä tätä lääkettä aina tarkalleen lääkärisi tai apteekkarisi ohjeiden mukaisesti. Epäiletkö oikeaa käyttöä? Ota sitten yhteyttä lääkäriisi tai apteekkariisi.

Kuinka paljon saat käyttää?

Tämän lääkkeen suositeltu aloitusannos on 23 mg testosteronia (paina pumppua kerran). Annos tulee levittää kerran päivässä suunnilleen samaan aikaan, mieluiten aamulla. Jotkut potilaat tarvitsevat mahdollisesti suuremman annoksen. Suositeltu enimmäisannos on 69 mg testosteronia päivässä (paina pumppua kolme kertaa).. Suurin suositeltu annos on 69 mg testosteronia päivässä (pumppua kolme kertaa).

Lääkärisi määrittää tämän lääkkeen oikean annostuksen, jota tarvitset tarkalleen. Tätä varten mittaa hän/hän säännöllisesti kaksi asiaa:

testosteronitaso veressäsi ja se, kuinka hyvin lääke vaikuttaa sinuun. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos luulet, että lääkkeellä on liian voimakas tai liian heikko vaikutus.

Tämän lääkkeen käyttö On tärkeää, että luet ja noudatat näitä ohjeita lääkkeen oikeasta käytöstä.

Levitä tätä lääkettä ihollesi applikaattorin avulla (väline, jolla lääke levitetään). Iholle levittämistä kutsutaan "transdermaaliseksi käytöksi". Lääke imeytyy ihon kautta kehoon.

Tämän lääkkeen käyttö

On tärkeää, että luet ja noudatat näitä ohjeita tämän lääkkeen oikeaan käyttöön.


Levitä tätä lääkettä ihollesi applikaattorin (väline lääkkeen levittämiseen) avulla. Iholle levittämistä kutsutaan "transdermaaliseksi käytöksi". Lääke imeytyy ihon kautta kehoon. Levitä lääkettä vain puhtaalle, kuivalle ja normaalisti terveelle iholle olkapäille tai yläkäsivarsille.

Älä koskaan levitä tätä lääkettä:

penikseen ja kiveksiin
halkeillut tai vaurioitunut iho
avoin ihorikko, haavat tai ärtynyt iho.

Lisävarusteet joita tarvitset tarvitset Pumppusarja

geelin kanssa. Katso kuva A. Laatikko
pyyhkeillä pyyhkeillä pyyhkeillä.




figuur A

Huomautus: Monipakkauksissa on korkki päällä jokaisessa pumppupäässä

Poista geelipumpun ilmaus – vain ensimmäisellä käyttökerralla

Ennen kuin käytät uutta pumppua, sinun on valmistettava se käyttövalmiiksi. Tätä kutsutaan pumppun ilmaukseksi ..

Poista applikaattori (väline aineen levittämiseen) pumpusta yksittäispakkauksen tapauksessa tai poista pumppun korkki monipakkauksen tapauksessa. kuva B. Ilmaa pumppu painamalla



figuur B

Ilmaa pumppu pumppupää paina kokonaan alas. Pidä liina alla, kun teet tämän. Toista tämä vaihe, kunnes geeli ilmestyy. Katso kuva C.



figuur C

Älä käytä geeliä, joka on tullut ulos pumppusta ilmanpoiston aikana, koska se ei ehkä ole oikea annos.


Hävitä käytetyt liinat turvallisesti, jotta tuotetta ei siirry muille, mukaan lukien lapset tai lemmikit.

Pumppusi on nyt käyttövalmis.

Noudata vaiheita 1–4 päivittäistä annostusta varten


Vaihe 1: Valmistautuminen geelin levittämiseen

Valitse puhdas, kuiva ja normaalisti terve ihoalue olkavarresta ja olkapäätä, joka voidaan peittää T-paita lyhythihaisella hihalla. Katso kuva D.
Levitä geeli vain olkavarteen ja olkapäähän.



figuur D

Poista applikaattori pumpusta. Katso kuva E.



figuur E

Poista applikaattorin korkki. Katso kuva F.



figuur F

Vaihe 2: Sinun geeli levittäminen

Pidä pumppua niin, että suutin on suunnattu applikaattorin päätä kohti.
Paina pumppupää kerran kokonaan alas. Katso kuva G.



figuur G

Käytä applikaattoria levittääksesi geelin tasaisesti yhdelle olkavarrelle ja olkapäälle.



figuur H

Varmista, että kätesi eivät kosketa geeliä. Katso kuva H.
Käytä liinaa pyyhkiäksesi roiskunut geeli. Hävitä käytetyt liinat turvallisesti estääksesi tuotteen siirtymisen muille, mukaan lukien lapsille tai lemmikeille.

Etsi annos, jonka lääkärisi on määrännyt sinulle, alla olevasta taulukosta.

Annos	Kuinka geeli levitetään
23 mg (pumppu kerran painaa)	Paina pumppua kerran, kuten kohdassa 2 on esitetty. Tee tämä kerran.
46 mg (pumppu kahdesti painaa)	Paina pumppua kerran, kuten kohdassa 2 on esitetty. Toista toisen pumppausannoksen levittämiseksi ja levitä geeli toiseen olkavarteeseen ja olkapäähän.
69 mg (pumppu kolme kertaa painaa)	Paina pumppua kerran, kuten vaiheessa 2 on esitetty. Toista saadaksesi toisen pumppauksen ja levitä geeli toiseen olkavarteeseen ja olkapäähän. Toista uudelleen saadaksesi kolmannen pumppauksen ja levitä geeli olkavarteeseen ja olkapäähän, jota käytit ensin.

Vaihe 3: Sovelluksesi puhdistaminen puhdistaa

Puhdista applikaattori käytön jälkeen liinalla. Katso kuva I.



figuur I

Hävitä käytetty liina turvallisesti estääksesi tuotteen siirtymisen muille, mukaan lukien lapset tai lemmikit.
MUISTA laittaa korkki takaisin applikaattoriin ja asettaa applikaattori takaisin pumppuun.
Katso kuva J.



figuur J

Säilytä tuote turvallisesti lasten ulottumattomissa.

Vaihe 4: Geelin levittämisen jälkeen

Pese kätesi heti saippualla ja vedellä, jos niissä on geeliä.

Geeli on syttyvää, kunnes se on kuivunut. Anna geelin kuivua ennen tupakointia tai avotulen lähellä olemista.

Anna levityskohdan kuivua täysin ennen pukeutumista.

Käytä vaatteita, jotka peittävät levityskohdan koko ajan, jotta tuotetta ei siirry vahingossa muille.

Odoti vähintään 2 tuntia ennen suihkussa käymistä, uimista tai kylpemistä.

Pese levityskohdat saippualla ja vedellä ennen jokaista tilannetta, jossa on suuri mahdollisuus ihokosketukseen toisen henkilön kanssa.

Oletko käyttänyt liikaa tätä lääkettä?

Jos olet vahingossa levittänyt liikaa tätä lääkettä, pese levityskohdat saippualla ja vedellä heti kun muistat.

Käytä vain lääkärisi määräämä määrä lääkettä. Jos tunnet ärsytystä tai hermostuneisuutta, painosi nousee tai sinulla on pitkittyneitä tai usein toistuvia erektioita, saatat käyttää liikaa.

Kun olet käyttänyt tai ottanut liikaa tätä lääkettä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

Oletko unohtanut käyttää tätä lääkettä?

Älä ota kaksinkertaista annosta unohtuneen annoksen korvaamiseksi.

Jos seuraava annos on määrä levittää 12 tunnin sisällä, jätä unohtunut annos väliin.

Jatka eteenpäin seuraavan annoksen kanssa tavallinen annos.

Jos seuraavaan annokseen on yli 12 tuntia, ota unohtunut annos. Jatka seuraavana päivänä normaalisti tavallisella annoksella ..

Ota yhteyttä lääkäriisi ennen kuin lopetat tämän lääkkeen käytön.

Onko sinulla muita kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä? Ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiin.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös tämä

lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia , vaikka kaikki eivät niitä saa. Yleinen (esiintyy alle 1 käyttäjällä 10:stä)

Usein (esiintyy alle 1:llä 10:stä käyttäjästä)

ihon ärsytys missä geeliä on levitetty (mukaan lukien ihottuma, kuivuus ja punoitus)
korkea rasvapitoisuus (triglyseridit) veressä
kohonnut verenpaine
kohonnut eturauhasspesifinen antigeeni (PSA). PSA on proteiini, jota eturauhanen tuottaa ja jota voidaan käyttää eturauhassairauden havaitsemiseen.
kohonnut punasolujen osuus veressä (hematokriitti), mikä todetaan säännöllisillä verikokeilla

Joskus (esiintyy alle 1 käyttäjällä 100:sta)

kohonnut hemoglobiini (punasolujen komponentti, joka kuljettaa happea), mikä todetaan säännöllisillä verikokeilla
päänsärky

Muita tunnettuja haittavaikutuksia, jotka liittyvät testosteronihoitoon, ovat muun muassa: (nuoruusiän) akne, ihosairaus, jossa iholle muodostuu rasvaisia hilseitä liiallisen talin tuotannon vuoksi (seborrea), kaljuuntuminen, hikoilu, lisääntynyt kehon karvankasvu, kutiseva tunne tai tunnoton iho, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, kuumat aallot, nesteiden kertyminen (kuten nilkkojen turvotus), painonnousu, tilapäinen hengityksen pysähtyminen unen aikana (uniapnea), hengenahdistus, yliherkkyysoireet, pahoinvointi/huonovointisuus, mielialan muutokset (kuten aggressio, vihamielisyys, hermostuneisuus, ahdistus, masennus), unettomuus, lihaskipu tai -kouristukset, rintojen kasvu, lisääntynyt punasolujen määrä, vähentynyt punasolujen määrä, veritulpat, keltaisuus (maksavaivat, jotka joskus liittyvät ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuuteen), epätavalliset maksan toimintaa mittaavien testien tulokset (maksan toimintakokeet).

Muutokset seksuaalisessa halussa, useammin erektio, pitkäkestoiset ja kivuliaat erektiöt (priapismi), kiveksen sairaus (miespuolinen sukupuolirauhanen), vähentynyt siemennesteen määrä, vaikeudet virtsaamisessa, muutokset eturauhasessa, eturauhassyöpä (ei ole vakuuttavaa näyttöä siitä, että testosteronikorvaus hypogonadaalisilla miehillä (miehillä, joilla on testosteronivajaus) aiheuttaisi eturauhassyöpää; mutta testosteronihoitoa tulee välttää miehillä, joilla on jo tiedossa tai epäillä olevan eturauhassyöpä).

Pitkäaikainen testosteronin käyttö voi johtaa muutoksiin suolojen (elektrolyyttien) ja veden määrässä kehossa.

Haittavaikutusten ilmoittaminen

Jos koet haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi. Tämä koskee myös mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Lareb, verkkosivusto www.lareb.nl. 5. Miten säilytät tätä lääkettä?

Pidä poissa lasten näkyviltä ja ulottuvilta.

Tälle lääkkeelle ei ole erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Se löytyy pumpun etiketistä ja ulkopakkauksesta merkinnän "EXP" jälkeen. Siinä on kuukausi ja vuosi. Kuukauden viimeinen päivä on viimeinen käyttöpäivämäärä.

Älä huuhtelee lääkkeitä viemäriin tai wc:hen äläkä heitä niitä roskakoriin. Kysy apteekista, mitä tehdä lääkkeille, joita et enää käytä. Ne hävitetään vastuullisesti, eivätkä ne päädy ympäristöön.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä aineita tämä lääke sisältää?

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on testosteroni.

Muut apuaineet tässä lääkkeessä ovat etanoli 96 %, propyleeniglykoli (E 1520), Muut tämän valmisteen apuaineet ovat etanoli 96 %, propyleeniglykoli (E 1520), diethyleeniglykolimonoetylieetteri, karbomeeri 980, trolamiini, dinatriumedetaatti ja puhdistettu vesi.

Yksi gramma geeliä sisältää 20 mg testosteronia. Yksi pumpppaus antaa 1,15 g (1,25 ml) geeliä, jossa on 23 mg testosteronia.

Miltä tämä lääke näyttää ja kuinka paljon sitä on pakkauksessa?

Testavan on tasainen, läpikuultava tai lähes läpikuultava geeli.

Seuraavat pakkaukset ovat saatavilla korkkiannostelijalla tai ilman ja hygieniakannella:
Yksittäispakkaus, jossa on 1 annostelupumppu.
Monipakkaus, jossa on 3 annostelupumppua.

Jokainen pumpppu sisältää 85,5 g Testavan geeliä ja voi antaa 56 mitattua annosta. Kaikkia mainittuja pakkaukokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Irlanti Valmistaja

Copea Pharma Europe Limited, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Irlanti

Applikaattori korkki:

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Irlanti Numero luvan myöntämisestä markkinoille saattamiseen RVG 120624 tuoda

Belgia

Testarzon

20 mg/g transdermaalinen geeli/geeli	transdermaalinen 20 mg/g transdermaalinen geeli/geeli transdermaalinen/transdermaalinen Geeli
Bulgaria	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Tanska	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Saksa	Testavan 20 mg/g transdermaalinen Geeli
Viro	Testavan
Suomi	Testavan 20 mg/g transdermaali-geeli
Ranska	Testavan 20 mg/g geeli transdermaalinen
Kreikka	Testarzon 20 mg/g δερμαλινος geeli
Unkari	Testarzon 20 mg/g transdermaalinen geeli
Irlanti	Testarzon 20 mg/g transdermaalinen geeli
Islanti	Testavan 20 mg/g geeli käyttöön iholle öö iho
Italia	Testavan 20 mg/g geeli transdermaalinen
Kroatia	Testarzon 20 mg/g transdermaalinen geeli
Latvia	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Liechtenstein	Testavan 20 mg/g transdermaalinen Geeli
Liettua	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Luxemburg	Testarzon 20 mg/g transdermaalinen geeli/geeli transdermaalinen/transdermaalinen Geeli
Alankomaat	Testavan 20 mg/g geeli transdermaaliseen käyttöön
Norja	Testavan 20 mg/g transdermaali-geeli
Itävalta	Testavan 20 mg/g transdermaalinen Geeli
Puola	Testavan
Portugali	Testavan 20 mg/g geeli transdermaalinen
Romania	Testavan 20 mg/g geeli transdermaalinen
Slovenia	Testarzon 23 mg/paine transdermaalinen geeli
Slovakia	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Espanja	Testavan 20 mg/g geeli transdermaalinen
Tšekki	Testavan
Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli
Ruotsi	Testavan 20 mg/g transdermaalinen geeli

Tämä pakkausseloste on viimeksi hyväksytty elokuussa 2023