

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Testavan 20 mg/g transderminis gelis
testosteronas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti vėliau.
- Turite klausimų? Kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Tai gali būti kenksminga kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra šiame pakuotės lapelyje? Tada kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Turinys šio pakuotės lapelio Kas yra

1. Kas yra Testavan ir kam šis vaistas vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Testavan ir kam šis vaistas vartojamas?

Kas yra Testavan?

Šis vaistas yra skaidrus gelis, kuriame yra testosterono, vyriško hormono, kurį organizmas natūraliai gamina.

Šis vaistas vartojamas testosteronui pakeisti suaugusiems vyrams, kurie negamina pakankamai natūralaus testosterono, vadinamo 'hipogonadizmu'. Vaistas padeda atkurti jūsų testosterono lygį iki normalaus lygio.

Ką daro testosteronas?

Testosteronas natūraliai gaminamas jūsų organizme sėklidėse.

Jis padeda gaminti spermą ir vystyti bei išlaikyti vyriškus požymius, tokius kaip žemas balsas ir kūno plaukuotumas.

Būtina normaliai seksualiai funkcionuoti ir seksualiai susijaudinti.

Tai taip pat padeda išlaikyti raumenų masę ir stiprumą.

Kam šis vaistas naudojamas?

Šis vaistas vyrams naudojamas kaip testosterono pakaitalas gydant įvairias sveikatos problemas, kurias sukelia testosterono trūkumas testosterono (vyriškas hipogonadizmas). Šis trūkumas turi būti patvirtintas dviem atskirais testosterono lygio kraujyje matavimais. Taip pat turi būti klinikinių požymių ir simptomų, tokių kaip:

Impotencija (erekcijos problemos)
nevaisingumas

mažas noras seksas
nuovargis
depresinė nuotaika
kaulų netekimas, sukeltas žemo hormonų lygio
dalinis antrinių lytinių požymių praradimas, kaip balso pokyčiai ar riebalų pasiskirstymo pokyčiai
plaukų slinkimas dalies veido ir kūno plaukų.

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kas gali vartoti šį vaistą?

Šį vaistą gali vartoti tik vyrai.
Vaikai ir paaugliai iki 18 metų negali vartoti šio vaisto.
Moterys negali vartoti šio vaisto, nepriklausomai nuo amžiaus.
Neleiskite moterims (ypač nėščioms ar maitinančioms krūtimi) ar vaikams susisiekti su Testavan geliu ar odos sritimis, kuriose šis vaistas buvo užteptas.

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Jūs esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti 6 skyriuje.
Jei sergate prostatos vėžiu arba yra įtarimas dėl jo.
Jei sergate krūties vėžiu (tai vyrams pasitaiko retai) arba yra įtarimas dėl jo.

Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?

Testosterono gydymas gali paspartinti jau esamo prostatos vėžio vystymąsi. Jūsų gydytojas atliks reikiamus tyrimus prieš pradėdamas vartoti šį vaistą. Taip pat bus atliekami tolesni patikrinimai reguliarių kraujo tyrimų ir prostatos tyrimų būdu.

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su gydytoju, jei sergate arba kada nors sirgote viena iš šių ligų:

Jums gali būti sunku šlapintis dėl padidėjusios prostatos liaukos.
Jūs sergate kaulų vėžiu: jūsų gydytojas stebi kalcio kiekį kraujyje.
Jūs turite aukštą kraujospūdį arba esate gydomas dėl aukšto kraujospūdžio, nes šis vaistas gali padidinti kraujospūdį.
Jūs sergate sunkia širdies, kepenų ar inkstų liga, nes gydymas šiuo vaistu gali sukelti rimtų problemų skysčių susilaikymo forma jūsų kūne. Tai kartais pasireiškia (kongestiniu) širdies nepakankamumu (skysčių kaupimasis širdyje).
Jūs sergate išemine širdies liga (širdies liga, kai kraujo tiekimas į širdį yra sutrikęs).
Kraujo krešėjimo sutrikimai

- o trombofilija (kraujo krešėjimo sutrikimas, kuris padidina trombozės (kraujo krešulių kraujagyslėse) riziką).
- o veiksniai kurie padidina kraujo krešulių riziką kraujagyslėje: ankstesni kraujo krešuliai kraujagyslėje, rūkymas, nutukimas, vėžys, ilgas sėdėjimas, jei vienas iš jūsų artimų giminių jauname amžiuje (pavyzdžiui, jaunesnis nei apie 50 metų) turėjo kraujo krešulį kojoje, plaučiuose ar kitame organe, arba jei senstate.

- o Kaip atpažinti kraujo krešulį? Skausmingas patinimas vienoje kojoje arba staigus odos spalvos pasikeitimas, pavyzdžiui, blyškumas, paraudimas ar pamėlynavimas, staigus dusulys, staigus nepaaiškinamas kosulys, kai galbūt iškosėjama kraujo; arba staigus krūtinės skausmas, stiprus galvos svaigimas ar apsvaigimas, stiprus pilvo skausmas, staigus regėjimo praradimas. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei patiriate bet kurį iš šių simptomų.

Jūs sergate epilepsija ..

turite turi migrena.

Jūs turite kvėpavimo sunkumų miegant, kas dažniau pasitaiko, jei turite antsvorio arba ilgalaikių plaučių problemų.

Jei kuri nors iš aukščiau paminėtų situacijų jums tinka (arba jei abejojate), prieš vartodami šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Šio vaisto vartojimas gali pabloginti šias būkles. Jei atsiranda odos reakcijų toje vietoje, kur užtepėte šį vaistą, kreipkitės į gydytoją patarimo. Gali prireikti nutraukti gydymą šiuo vaistu.

Prieš ir/arba gydymo metu gydytojas turi atlikti šiuos kraujo tyrimus:

testosterono lygis kraujyje, pilnas kraujo tyrimas (testas, kuris nustato kraujo sutrikimus).

Vartojant šį vaistą ir iškart po jo užtepimo, negalima naudoti drėkinamųjų priemonių ar apsaugos nuo saulės produktų toje vietoje, kur užtepėte gelį.

Kaip išvengti šio vaisto perdavimo kitam asmeniui?

Šis vaistas gali būti perduotas kitiems asmenims tiesioginio odos kontakto metu. Tai gali sukelti padidėjusį testosterono lygį jų organizme, kas gali būti pavojinga. Toks padidėjimas gali įvykti po vieno kontakto, bet taip pat gali palaipsniui kauptis per trumpus kontaktus.

Tai ypač svarbu moterims ir vaikams. Paprastai jų organizme yra tik žemas testosterono lygis.

Nėščios moterys neturėtų turėti kontakto su šiuo vaistu. Jei jūsų partnerė yra nėščia, turite būti atsargūs ir apsaugoti ją nuo bet kokio kontakto su vaistu ir jo užtepimo vieta.

Kad išvengtumėte gelio perdavimo nuo savo odos kitam asmeniui, turite:

vaistą tepti aplikatoriumi (priemonė vaistui tepti) ir ne pirštais.

nedelsiant nusiplauti rankas vandeniu ir muilu, jei jūsų rankos susilietė su šiuo vaistu.

vietą, kur užtepėte gelį, uždenkti drabužiais, kai tik gelis išdžiūsta. užteptą gelio vietą uždenkite drabužiais, kai gelis išdžius.

vienas maudytis vonioje ar duše arba dėvėti drabužius, kad uždengtumėte tepimo vietą (pavyzdžiui, marškinėlius) prieš tiesioginį odos kontaktą su kitu asmeniu.

Norėdami padidinti savo partnerio saugumą, prieš lytinį aktą turite nuplauti tepimo vietą muilu, pavyzdžiui, po dušu, arba, jei tai neįmanoma, dėvėti marškinėlius, kurie uždenkia tepimo vietą kontakto metu.

Ką daryti, jei kitas asmuo buvo paveiktas šios priemonės?

Jei kitas asmuo paliečia gelį arba turi odos kontaktą su vieta, kurioje užtepėte gelį, jis/jis turi kuo greičiau nuplauti kontaktinę vietą muilu ir vandeniu. Kuo ilgiau gelis lieka ant odos prieš plaunant, tuo didesnė tikimybė, kad asmuo absorbuos šiek tiek testosterono.

Jei ši priemonė buvo perduota kitam asmeniui, turite stebėti bet kokius kūno ar elgesio pokyčius aplinkiniams žmonėms. Jei kas nors iš jūsų aplinkos pastebi vieną iš šių simptomų, jis/jis turi kreiptis į gydytoją:

spuogai (spuogeliai)

balso sumažėjimas

augimas veido - arkūno plaukų pokyčiai

menstruacijų ankstyvas menstruacija

ankstyvas brendimas, lytinių organų padidėjimas arba seksualinio elgesio pokyčiai vaikams

Ar vartojate kitų vaistų?

Ar vartojate be Testavan kitų vaistų, ar tai neseniai darėte ar yra galimybė, kad artimiausiu metu vartosite kitus vaistus? Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui. Tai taip pat taikoma vaistams, kuriuos galite gauti be recepto, ir vaistažolių preparatams. Testavan gali paveikti šių vaistų veikimą ir jums gali reikėti koreguoti dozes.

Ypač pasakykite savo gydytojui ar vaistininkui, jei vartojate šiuos:

vaistai kraujui skystinti (antikoagulantai): Testavan gali sustiprinti šių vaistų poveikį.
kortikosteroidai (hormonai, naudojami uždegimams slopinti) arba kiti vaistai, kurie gali padidinti šių hormonų gamybą: tiek kortikosteroidai, tiek Testavan gali sukelti, kad organizmas sulaiko daugiau skysčių.

insulinas cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti (sergant diabetu): jums gali reikėti sumažinti insulino dozę, jei esate gydomas Testavan.

Jei kuri nors iš aukščiau paminėtų situacijų jums tinka (arba jei abejojate), prieš vartodami Testavan pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas

Šis vaistas nėra skirtas nėščioms moterims ar žindančioms moterims.

Jei jūsų partnerė yra nėščia ar taps nėščia, turite laikytis patarimų, pateiktų skyriuje „Kaip išvengti šio vaisto perdavimo kitam asmeniui?“.

Nėščios moterys turi vengti bet kokio odos kontakto su vietomis, kuriose vyrai naudoja šį vaistą. Šis vaistas gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Susilietus, kontaktinę vietą reikia kuo greičiau nuplauti muilu ir vandeniui.

Žindančios moterys turi vengti bet kokio odos kontakto su vietomis, kuriose vyrai naudoja šį vaistą.

Šis vaistas slopina spermą gamybą. Šis procesas yra grįžtamas.

Testavan sudėtyje yra propilenglikolio

Šis vaistas turi propilenglikolio, kuris gali sukelti odos dirginimą.

Testavan sudėtyje yra etanolio

Šis vaistas turi 538,70 mg alkoholio (etanolio) kiekvienoje 1,15 g dozėje, kas atitinka 468,40 mg/g (46,84 w/w). Jis gali sukelti deginimo pojūtį ant sudirgintos odos.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas arba vaistininkas. Jei abejojate dėl teisingo vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Kiek galite vartoti?

Rekomenduojama pradinė šio vaisto dozė yra 23 mg testosterono (vieną kartą paspausti pompa). Dozė turi būti vartojama vieną kartą per dieną, maždaug tuo pačiu metu, geriausia ryte. Kai kurie pacientai gali reikėti didesnės dozės. Didžiausia rekomenduojama dozė yra 69 mg testosterono per dieną (tris kartus paspausti pompa).. Didžiausia rekomenduojama dozė yra 69 mg testosterono per dieną (tris kartus paspausti pompa).

Jūsų gydytojas nustatys tinkamą šio vaisto dozę, kurios jums tiksliai reikia. Tam matuoja jis/ji reguliariai du dalykus:

testosterono lygis kraujyje jūsų kraujo laipsnis, kuriuo vaistas veikia jus. Kreipkitės į savo gydytoją, jei manote, kad vaistas turi per stiprų arba per silpną poveikį.

Šio vaisto vartojimas

Svarbu, kad perskaitytumėte ir laikytumėtės šių nurodymų, kad tinkamai naudotumėte šį vaistą.

Tepkite šį vaistą ant odos naudodami aplikatorių (priemonę vaistui tepti). Vaisto tepimas ant odos vadinamas „transderminiu naudojimu“. Vaistas per odą patenka į organizmą.


Tepkite šią priemonę ant odos naudodami aplikatorių (priemonę vaistui tepti). Tepimas ant odos vadinamas „transderminiu naudojimu“. Vaistas per odą patenka į organizmą. Vaistą tepkite tik ant švarios, sausos ir normaliai sveikos odos ant pečių ar viršutinių rankų.

Niekada netepkite šio vaisto ant:

varpos ir sėklidžių
suskilusios arba pažeistos odos
atviros odos opų, žaizdų ar sudirgintos odos.

Priedai kurių jums reikia turite

Pompos rinkinys su geliu. Žr. A pav.
Dėžutė su servetėlėmis.




figuur A

Pastaba: Daugkartinės pakuotės turi dangtelį viršuje kiekvieno siurblio galvutės

Šis gelio siurblys išleidimas – tik pirmą kartą naudojant

Prieš naudodami naują siurbį, turite jį paruošti naudojimui. Tai vadinama siurblio išleidimu siurblio vadinamas.

Nuimkite aplikatorių (priemonę, skirtą priemonei tepti) nuo siurblio, jei tai vienkartinė pakuotė, arba nuimkite dangtelį nuo siurblio, jei tai daugkartinė pakuotė. Žr. pav. B.



figuur B

Išleiskite siurbį paspausdami pompkop visiškai nuspausti. Laikykite servetėlę po juo, kai tai darote. Kartokite šį žingsnį, kol pasirodys gelis. Žr. pav. C.



figuur C

Nenaudokite gelio, kuris išėjo iš pompos per išleidimą, nes jis gali būti netinkamos dozės.

Naudotus servetėles saugiai išmeskite, kad išvengtumėte produkto perdavimo kitiems, įskaitant vaikus ar naminius gyvūnus.


Jūsų pompa dabar paruošta naudoti.

Vykdykite 1–4 žingsnius kasdieninei dozei

1 žingsnis: Pasiruošimas gelio užtepimui


Pasirinkite švarią, sausą ir normalią sveiką odos vietą ant viršutinės rankos ir peties, kurią galima uždenkti trumpomis rankovėmis marškinėliais gali būti padengta trumpa rankove. Žr. pav. D.

Tepkite gelį tik ant viršutinės rankos ir peties.



figuur D

Nuimkite aplikatorių nuo pompos. Žr. pav. E.



figuur E

Nuimkite aplikatoriaus dangtelį. Žr. figūrą F.



figuur F

2 žingsnis: Jūsų gelis užtepti

Laikykite pompą su purkštuku nukreiptu į aplikatoriaus galvutę. Paspauskite pompos galvutę vieną kartą iki galo. Žr. figūrą G.



figuur G

Naudokite aplikatorių, kad tolygiai paskirstytumėte gelį ant vienos viršutinės rankos ir peties. Įsitikinkite, kad jūsų rankos nesiliestų su geliu. Žr. figūrą H.



figūr H

Naudokite servetėlę, kad nuvalytumėte išsiliejusį gelį. Panaudotas servetėles saugiai išmeskite, kad išvengtumėte produkto perdavimo kitiems, įskaitant vaikus ar augintinius.

Suraskite savo dozę, kurią jums paskyrė gydytojas, žemiau esančioje lentelėje.

Dozė	Kaip gelį užtepti
23 mg (pompą vieną kartą paspausti)	Paspauskite pompą vieną kartą, kaip nurodyta 2 žingsnyje. Padarykite tai vieną kartą.
46 mg (pompą du kartus paspausti)	Paspauskite pompą vieną kartą, kaip nurodyta 2 žingsnyje. Pakartokite, kad užteptumėte antrą pompą ir užtepkite gelį ant kitos viršutinės rankos ir peties.
69 mg (pomp tris kartus paspausti)	Paspauskite pompą vieną kartą, kaip nurodyta 2 žingsnyje. Pakartokite, kad užteptumėte antrą pompos dozę ir užtepkite gelį ant kitos viršutinės rankos ir peties. Pakartokite dar kartą kad užteptumėte trečią pompos dozę ir užtepkite gelį ant viršutinės rankos ir peties, kuriuos naudojote pirmiausia.

3 žingsnis: Jūsų aplikatorių valyti

Po naudojimo nuvalykite aplikatorių servetėle. Žr. pav. I.



figūr I

Naudotą servetėlę saugiai išmeskite, kad išvengtumėte produkto perdavimo kitiems, įskaitant vaikus ar augintinius.

ATMINKITE, kad uždėtumėte dangtelį atgal ant aplikatoriaus ir aplikatorių atgal ant pompos. Žr. pav. J.



figuur J

Laikykite produktą saugiai, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4 žingsnis: Užtepus gelio

Nedelsdami nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu, jei ant jų pateko gelio.

Gelio degumas išlieka, kol jis išdžiūsta. Leiskite geliui išdžiūti prieš rūkydami ar būdami šalia atviros liepsnos.

Leiskite užteptai vietai visiškai išdžiūti prieš apsirengdami.

Dėvėkite drabužius, kurie visada uždengia užteptą vietą, kad išvengtumėte netyčinio produkto perdavimo kitiems.

Palaukite bent 2 valandas prieš maudymąsi, plaukimą ar vonią.

Nuplaukite užteptą vietą muilu ir vandeniu prieš bet kokią situaciją, kurioje yra didelė tikimybė, kad užtepta vieta susilies su kito žmogaus oda.

Ar naudojote per daug šio vaisto?

Jei netyčia užtepėte per daug šio vaisto, nuplaukite užteptą vietą muilu ir vandeniu, kai tik tai prisiminsite.

Naudokite tik tą vaisto kiekį, kurį paskyrė jūsų gydytojas. Jei jaučiatės sudirgę ar nervingi, priaugate svorio arba turite ilgalaikių ar dažnų erekcijų, gali būti, kad naudojate per daug.

Jei naudojote ar suvartojote per daug šio vaisto, nedelsdami susisiekite su savo gydytoju ar vaistininku.

Ar pamiršote naudoti šį vaistą?

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą dozę.

Jei kitą dozę reikia užtepti per 12 valandų, praleiskite pamirštą dozę. Tęskite toliau su kita įprasta doze.

Jei iki kitos dozės liko daugiau nei 12 valandų, pavartokite praleistą dozę. Tęskite kitą dieną toliau su įprasta doze.

Jei nustojate vartoti šį vaistą

Prieš nustodami vartoti šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Tada kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį, nors ne kiekvienas jį patiria.

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

odos dirginimas kur gelis buvo užteptas (įskaitant odos bėrimą, sausumą ir paraudimą)

aukštas riebalų kiekis (trigliceridai) kraujyje

padidėjęs kraujo spaudimas

padidėjęs prostatos specifinis antigenas (PSA). PSA yra baltymas, kurį gamina prostata ir gali būti naudojamas prostatos ligai nustatyti.

padidėjęs raudonųjų kraujo kūnelių procentas kraujyje (hematokritas), kuris nustatomas reguliariais kraujo tyrimais

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)

padidėjęs hemoglobinas (raudonųjų kraujo kūnelių komponentas, kuris perneša deguonį), kuris nustatomas reguliariais kraujo tyrimais

galvos skausmas

Kiti žinomi šalutiniai poveikiai, susiję su testosterono gydymu, yra:

(jaunatviniai) spuogai (akne), odos būklė su riebiomis pleiskanomis ant odos dėl per didelio riebalų gamybos (seborėja), nuplikimas, prakaitavimas, padidėjęs kūno plaukų augimas, niežėjimo pojūtis arba nejautrumas odoje, galvos skausmas, galvos svaigimas, pykinimas, karščio bangos, skysčių susilaikymas (pvz., kulkšnių patinimas), svorio padidėjimas, laikinas kvėpavimo sustojimas miegant (miego apnėja), dusulys, padidėjusio jautrumo reakcijos, pykinimas/negraži savijauta, nuotaikos pokyčiai (pvz., agresija, priešiškumas, nervingumas, nerimas, depresija), nemiga, raumenų skausmas ar spazmai, krūtų padidėjimas, padidėjęs raudonųjų kraujo kūnelių skaičius, sumažėjęs raudonųjų kraujo kūnelių skaičius, kraujo krešuliai, gelta (kepenų problemos, kartais lydimos odos ir akių baltymų pageltimo), neįprasti kepenų funkcijos tyrimų rezultatai.

Pasikeitęs lytinio potraukio jausmas, dažnesnė erekcija, ilgalaikės ir skausmingos erekcijos (priapizmas), sėklidžių (vyriškų lytinių liaukų) sutrikimai, sumažėjęs spermos kiekis, sunkumas šlapinantis, prostatos liaukos pokyčiai, prostatos vėžys (nėra įtikinamų įrodymų, kad testosterono pakeitimas hipogonadaliniai vyrai (vyrai, kuriems trūksta testosterono) sukelia prostatos vėžį; tačiau testosterono terapijos reikėtų vengti vyrams, kuriems jau žinoma arba įtariama, kad jie turi prostatos vėžį).

Ilgalaikis testosterono vartojimas gali sukelti druskų (elektrolitų) ir vandens kiekio pokyčius organizme.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma galimiems šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame pakuotės lapelyje. Taip pat galite tiesiogiai pranešti apie šalutinį poveikį per Nyderlandų šalutinių poveikių centrą Lareb, svetainė www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinį poveikį, galite padėti mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Nenaudokite šio vaisto pasibaigus galiojimo laikui. Jis nurodytas ant pompos etiketės ir išorinės pakuotės po „EXP“. Nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebenaudojate. Jie bus sunaikinti atsakingai ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra testosteronas. Kitos pagalbinės medžiagos šiame vaistiniame preparate yra etanolis 96%, propilenglikolis (E 1520), dietilenglikolmonoetileteris, karbomeras 980, trolaminas, dinatrioedetas ir išgrynintas vanduo.

Viename grame gelio yra 20 mg testosterono. Vieną kartą paspaudus pompą, išsiskiria 1,15 g (1,25 ml) gelio su 23 mg testosterono.

Kaip atrodo ši priemonė ir kiek jos yra pakuotėje?

Testavan yra vienalytis, permatomas arba beveik permatomas gelis.

Šios pakuotės yra prieinamos su arba be dangtelių aplikatoriaus ir higieniniu dangteliu: Vienkartinė pakuotė su 1 dozavimo pompa. Daugkartinė pakuotė su 3 dozavimo pompomis.

Kiekviena pompa turi 85,5 g Testavan gelio ir gali išleisti 56 dozes. Ne visos nurodytos pakuotės dydžiai yra prekyboje.

Leidimo prekiauti turėtojas ir gamintojas

Leidimo prekiauti turėtojas

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Airija Gamintojas

Copea Pharma Europe Limited, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park, Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Airija

Aplikatorius su dangteliu:

The Simple Pharma Company Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot St, Dublinas D02 P593, Airija Numeris leidimo prekiauti vaistu rinkoje RVG 120624 atnešti

Belgija

Testarzon

20 mg/g transderminis gelis/gelis	transderminis 20 mg/g transderminis gelis/gelis
	transderminis/transderminis Gelis
Bulgarija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Danija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Vokietija	Testavan 20 mg/g transderminis Gelis
Estija	Testavan
Suomija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Prancūzija	Testavan 20 mg/g gelis transderminis
Graikija	Testarzon 20 mg/g transderminis gelis
Vengrija	Testarzon 20 mg/g transderminis gelis
Airija	Testarzon 20 mg/g transderminis gelis
Islandija	Testavan 20 mg/g gelis naudojimui ant odos Italija
Testavan	20 mg/g gelis transderminis Kroatija
Testarzon	20 mg/g transderminis transderminis gelis
Latvija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Lichtenšteinas	Testavan 20 mg/g transderminis Gelis
Lietuva	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Liuksemburgas	Testarzon 20 mg/g transderminis gelis/gelis transderminis/transderminis Gelis
Nyderlandai	Testavan 20 mg/g gelis transderminiam naudojimui
Norvegija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Austrija	Testavan 20 mg/g transderminis Gelis
Lenkija	Testavan
Portugalija	Testavan 20 mg/g gelis transderminis
Rumunija	Testavan 20 mg/g gelis transderminis
Slovėnija	Testarzon 23 mg/spaudimas transderminis gelis
Slovakija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Ispanija	Testavan 20 mg/g gelis transderminis
Čekija	Testavan
Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)	Testavan 20 mg/g transderminis gelis
Švedija	Testavan 20 mg/g transderminis gelis

Ši pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2023 m. rugpjūčio mėn.