

Prospect: informații pentru utilizator

Testavan 20 mg/g gel transdermic
testosteron

Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să aveți nevoie de el mai târziu.
- Aveți întrebări? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.
- Nu dați acest medicament altor persoane, deoarece este prescris doar pentru dumneavoastră. Poate fi dăunător pentru alții, chiar dacă au aceleași simptome ca dumneavoastră.
- Aveți efecte secundare menționate la punctul 4? Sau aveți un efect secundar care nu este menționat în acest prospect? Contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Conținutul acestui prospect Ce este

1. Ce este Testavan și pentru ce se utilizează acest medicament?
2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?
3. Cum se utilizează acest medicament?
4. Posibile efecte secundare
5. Cum se păstrează acest medicament?
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Testavan și pentru ce se utilizează acest medicament?

Ce este Testavan?

Acest medicament este un gel clar care conține testosteron, un hormon masculin pe care corpul îl produce în mod natural.

Acest medicament este utilizat pentru a înlocui testosteronul la bărbații adulți care nu produc suficient testosteron natural, ceea ce se numește 'hipogonadism'. Medicamentul ajută la aducerea nivelului de testosteron la un nivel normal.

Ce face testosteronul?

Testosteronul este produs în mod natural în corpul dumneavoastră de către testicule.

Ajută la producerea de spermă și la dezvoltarea și menținerea caracteristicilor masculine, cum ar fi vocea gravă și părul corporal.

Este necesar pentru a putea funcționa sexual normal și a deveni excitat sexual.

De asemenea, ajută la menținerea masei și forței musculare.

Pentru ce se utilizează acest medicament?

Acest medicament este utilizat la bărbați ca înlocuitor de testosteron pentru a trata diverse probleme de sănătate cauzate de un deficit de testosteron (hipogonadism masculin). Acest deficit trebuie demonstrat prin două măsurători separate ale nivelului de testosteron din sânge. De asemenea, trebuie să existe semne și simptome clinice precum:

Impotență (probleme de erecție)

infertilitate
lipsă de dorință sexuală
oboseală
stare depresivă
pierderea masei osoase, cauzată de un nivel scăzut de hormoni
parțial pierderea caracteristicilor sexuale secundare, cum ar fi schimbările în vocea dumneavoastră sau modificări în distribuția grăsimii
pierdere a unei părți din părul facial și corporal.

2. Când nu trebuie să utilizați acest medicament sau trebuie să fiți deosebit de precaut?

Cine poate utiliza acest medicament?

Doar bărbații pot utiliza acest medicament.
Copiii și adolescenții sub 18 ani nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Femeile nu trebuie să utilizeze acest medicament, indiferent de vârstă.
Nu lăsați femeile (în special femeile care sunt însărcinate sau alăptează) sau copiii să intre în contact cu Testavan gel sau cu zonele de piele unde a fost aplicat acest medicament.

Când nu trebuie să utilizați acest medicament?

Sunteți alergic la oricare dintre substanțele din acest medicament. Aceste substanțe le puteți găsi în secțiunea 6.
Dacă aveți cancer de prostată sau există suspiciunea acestuia.
Dacă aveți cancer de sân (acest lucru este rar la bărbați) sau există suspiciunea acestuia.

Când trebuie să fiți deosebit de precaut cu acest medicament?

Tratamentul cu testosteron poate accelera dezvoltarea unui cancer de prostată deja existent. Medicul dumneavoastră va efectua testele necesare înainte de a putea utiliza acest medicament. Vor avea loc și controale ulterioare prin teste de sânge regulate și examinări ale prostatei.

Contactați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest medicament, dacă suferiți sau ați suferit vreodată de una dintre următoarele afecțiuni: .

Puteți avea dificultăți la urinare din cauza unei prostate mărite.
Sufereți de cancer osos: medicul dumneavoastră vă verifică nivelul de calciu.
Aveți hipertensiune arterială sau sunteți tratat pentru hipertensiune arterială, deoarece acest medicament poate duce la o creștere a tensiunii arteriale.
Sufereți de o boală gravă de inimă, ficat sau rinichi, deoarece un tratament cu acest medicament poate duce la probleme grave în forma de retenție de lichide în corpul dumneavoastră. Acest lucru este uneori asociat cu insuficiență cardiacă (acumulare de lichid în inimă).
Sufereți de o boală cardiacă ischemică (boală cardiacă în care alimentarea cu sânge a inimii este afectată).
Tulburări de coagulare a sângelui

- o trombofilie (o anomalie a coagulării sângelui care crește riscul de tromboză (cheaguri de sânge în vasele de sânge).
- o factori care cresc riscul de cheaguri de sânge într-un vas de sânge: cheaguri de sânge anterioare într-un vas de sânge, fumat, obezitate, cancer, statul prelungit, dacă unul dintre membrii apropiați ai familiei dumneavoastră a avut un cheag de sânge la o vârstă tânără (de exemplu, mai tânăr de aproximativ 50 de ani) într-un picior, plămân sau altorgan, sau dacă îmbătrâniți.
- o Cum recunoașteți un cheag de sânge? Printr-o umflare dureroasă la un picior sau o schimbare bruscă a culorii pielii, cum ar fi paloare, roșeață sau albastru, dificultăți de respirație bruscă, tuse bruscă inexplicabilă care poate include tuse cu sânge; sau durere bruscă în piept, senzație severă de amețeală sau vertij, durere abdominală severă, pierdere bruscă a vederii. Avertizați imediat un medic dacă experimentați oricare dintre aceste simptome.

Dumneavoastră suferiți de epilepsie.

Dumneavoastră aveți migrenă.

Aveți dificultăți de respirație în timpul somnului, ceea ce apare mai frecvent dacă aveți probleme cu greutatea sau probleme pulmonare de lungă durată.

Dacă una dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau dacă aveți îndoieli), contactați medicul sau farmacistul înainte de a utiliza acest medicament. Utilizarea acestui medicament poate agrava aceste afecțiuni.

Reveniți la medicul dumneavoastră pentru sfaturi dacă aveți reacții cutanate la locul unde ați aplicat acest medicament. Poate fi necesar să opriți tratamentul cu acest medicament.

Înainte și/sau în timpul tratamentului, medicul dumneavoastră trebuie să efectueze următoarele teste de sânge:

nivelul de testosteron în sânge, hemoleucograma completă (test care detectează anomalii în sânge). În momentul și imediat după aplicarea zilnică a acestui medicament, nu trebuie să aplicați hidratante sau produse de protecție solară pe locul unde ați aplicat gelul.

Cum puteți preveni transferul acestui medicament la o altă persoană?

Acest medicament poate fi transferat la alte persoane prin contact direct piele-pe-piele.

Acest lucru poate duce la un nivel crescut de testosteron în corpul lor, ceea ce poate fi periculos. O astfel de creștere poate apărea după un singur contact, dar se poate acumula și în timp prin contacte scurte.

Acest lucru este deosebit de important pentru femei și copii. În mod normal, aceștia au un nivel scăzut de testosteron în corpul lor.

Femeile însărcinate nu trebuie să intre în contact cu acest medicament. Dacă partenera dumneavoastră este însărcinată, trebuie să fiți precaut și să o protejați de orice contact cu medicamentul și locul de aplicare.

Pentru a preveni transferul gelului de pe pielea dumneavoastră la o altă persoană, trebuie să: aplicați medicamentul cu aplicatorul (instrumentul pentru aplicarea medicamentului) și nu cu degetele.

imediat să vă spălați mâinile cu apă și săpun dacă mâinile dumneavoastră au intrat în contact cu acest medicament.

locul unde ați aplicat gelul, să fie acoperit cu haine imediat ce gelul s-a uscat.

un faceți o baie sau un duș sau purtați haine pentru a acoperi locul de aplicare (cum ar fi un tricou) înainte de a avea contact direct piele-pe-piele cu o altă persoană.

Pentru a crește siguranța partenerului dumneavoastră, trebuie să spălați locul de aplicare cu săpun înainte de actul sexual, de exemplu sub duș, sau, dacă acest lucru nu este posibil, să purtați un tricou care acoperă locul de aplicare în timpul perioadei de contact.

Ce se întâmplă dacă o altă persoană este expusă la acest medicament?

Dacă o altă persoană atinge gelul sau are contact piele-pe-piele cu locul unde ați aplicat gelul, trebuie să spele zona de contact cât mai repede posibil cu săpun și apă. Cu cât gelul rămâne mai mult timp în contact cu pielea înainte de spălare, cu atât este mai mare șansa ca persoana să absoarbă puțin testosteron.

Dacă acest medicament a fost transferat la o altă persoană, trebuie să fiți atent la eventualele schimbări corporale sau comportamentale ale persoanelor din jurul dumneavoastră. Dacă cineva din jurul dumneavoastră prezintă unul dintre următoarele simptome, trebuie să mergeți la medic:

- acnee (coșuri)
- îngroșarea vocii
- creșterea părului facial sau corporal
- schimbări în menstruație
- pubertate precoce pubertate, mărirea organelor genitale sau schimbări în nivelul comportamentului sexual la copii

Utilizați alte medicamente?

Utilizați pe lângă Testavan alte medicamente, ați făcut acest lucru recent sau există posibilitatea să utilizați alte medicamente în viitorul apropiat? Informați medicul sau farmacistul dumneavoastră. Acest lucru este valabil și pentru medicamentele pe care le puteți obține fără prescripție și pentru medicamentele pe bază de plante. Testavan poate influența efectul acestor medicamente și este posibil să fie necesar să vă ajustați dozele.

Informați în special medicul sau farmacistul dacă luați următoarele:

medicamente pentru subțierea sângelui (anticoagulante): Testavan poate amplifica efectul acestor medicamente.

corticosteroizi (hormoni utilizați pentru a suprima inflamațiile) sau alte medicamente care pot crește producția acestor hormoni: atât corticosteroizii, cât și Testavan pot duce la retenția de lichide în organism.

insulină pentru a controla nivelul zahărului din sânge (în caz de diabet): este posibil să fie necesar să reduceți doza de insulină dacă sunteți tratat cu Testavan.

Dacă una dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau dacă aveți îndoieli), contactați medicul sau farmacistul înainte de a Testavan utiliza.

Sarcina, alăptare și fertilitate

Acest medicament nu este destinat utilizării de către femeile însărcinate sau care alăptează.

Dacă partenera dumneavoastră este însărcinată sau devine însărcinată, trebuie să urmați sfaturile din secțiunea „Cum puteți preveni transferul acestui medicament la o altă persoană?”.

Femeile însărcinate trebuie să evite orice contact cu pielea în locurile de aplicare la bărbații care utilizează acest medicament. Acest medicament poate provoca daune copilului

nenăscut. În caz de contact, zona de contact trebuie spălată cât mai repede posibil cu săpun și apă.

Femeile care alăptează trebuie să evite orice contact cu pielea în locurile de aplicare la bărbații care utilizează acest medicament.

Acest medicament suprimă producția de spermă. Acest proces este reversibil.

Testavan conține propilenglicol

Acest medicament conține propilenglicol, care poate provoca iritații ale pielii.

Testavan conține etanol

Acest medicament conține 538,70 mg alcool (etanol) per fiecare doză de 1,15 g, ceea ce este echivalent cu 468,40 mg/g (46,84 w/w). Poate provoca o senzație de arsură pe pielea iritată.

3. Cum se utilizează acest medicament?

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul dumneavoastră. Aveți îndoieli cu privire la utilizarea corectă? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

Cât de mult aveți voie să utilizați?

Doza inițială recomandată a acestui medicament este de 23 mg testosteron (apăsați pompa o dată). Doza trebuie aplicată o dată pe zi, aproximativ la aceeași oră și de preferință dimineața. Unii pacienți pot avea nevoie de o doză mai mare. Doza maximă recomandată este de 69 mg testosteron pe zi (apăsați pompa de trei ori).

Medicul dumneavoastră va stabili doza corectă de acest medicament de care aveți nevoie. Pentru aceasta măsoară el/ea regulat două lucruri:

nivelul de testosteron în sângele dumneavoastră gradul în care medicamentul funcționează la dumneavoastră.

Contactați medicul dumneavoastră dacă credeți că medicamentul are un efect prea puternic sau prea slab. Utilizarea acestui medicament

Este important să citiți și să urmați aceste instrucțiuni pentru o utilizare corectă a acestui medicament.

Utilizarea acestui medicament

Este important să citiți și să urmați aceste instrucțiuni pentru o utilizare corectă a acestui medicament.

Aplicați acest medicament pe piele folosind aplicatorul (instrumentul pentru aplicarea medicamentului). Aplicarea pe piele se numește „utilizare transdermică”. Medicamentul ajunge în corp prin piele.


Aplicați medicamentul doar pe pielea curată, uscată și normal sănătoasă de pe umeri sau brațele superioare.

Nu aplicați niciodată acest medicament pe:

- penis și testicule
- crăpată sau deteriorată piele
- deschisă ulcere cutanate, răni sau piele iritată.

Accesorii de care aveți nevoie Pompă

cu gel. Vezi figura A. Cutie
cu șervețele șervețele.




figuur A

Notă: Multipachetele conțin un capac deasupra fiecărei pompe

Pompa de gel aerisire – doar la prima utilizare

Înainte de a folosi o pompă nouă, trebuie să o pregătiți pentru utilizare. Acest proces se numește aerisirea pompei se numește.

Îndepărtați aplicatorul (instrumentul pentru aplicarea produsului) de pe pompă în cazul unui ambalaj unic sau îndepărtați capacul de pe pompă în cazul unui ambalaj multiplu. Consultați figura B.



figuur B

Aerisirea pompei prin cap de pompă apăsați complet. Țineți un șervețel dedesubt când faceți acest lucru. Repetați acest pas până când apare gelul. Vezi figura C.



figuur C

Nu folosiți gelul care a ieșit din pompă în timpul aerisirii, deoarece este posibil să nu fie doza corectă.

Aruncați șervețelele folosite în siguranță pentru a preveni transferul produsului la alte persoane, inclusiv copii sau animale de companie.


Pompa dumneavoastră este acum gata de utilizare.

Urmați pașii 1 până la 4 pentru dozarea zilnică

Pasul 1: Pregătirea pentru aplicarea gelului


Alegeți o zonă de piele curată, uscată și sănătoasă pe partea superioară a brațului și umărului care poate fi acoperită cu un tricou cu mânecă scurtă. Vezi figura D.

Aplicați gelul doar pe partea superioară a brațului și umărului.



figuur D

Îndepărtați aplicatorul de la pompă. Vezi figura E.



figuur E

Îndepărtați capacul aplicatorului. Vezi figura F.



figuur F

Pasul 2: Dumneavoastră gel aplicați

Țineți pompa cu duza îndreptată spre capul aplicatorului.
Apăsați capul pompei o dată complet. Vezi figura G.



figuur G

Folosiți aplicatorul pentru a distribui gelul uniform pe un braț superior și umăr.
Asigurați-vă că mâinile dumneavoastră nu intră în contact cu gelul. Vezi figura H.



figuur H

Folosiți un șervețel pentru a curăța gelul vărsat. Aruncați șervețelele folosite în siguranță pentru a preveni transferul produsului la alții, inclusiv copii sau animale de companie.

Căutați doza pe care v-a prescris-o medicul dumneavoastră în tabelul de mai jos.

Doza	Cum să aplicați gelul aplicare
23 mg (pompa o dată apăsați)	Apăsați pompa o dată, așa cum este indicat în pasul 2. Faceți acest lucru o dată.
46 mg (pompa de două ori apăsați)	Apăsați pompa o dată, așa cum este indicat în pasul 2. Repetați pentru a aplica o a doua doză de pompă și aplicați gelul pe celălalt braț superior și umăr.
69 mg (pompa de trei ori apăsați)	Apăsați pompa o dată, așa cum este indicat în pasul 2. Repetați pentru a aplica o a doua doză de pompă și aplicați gelul pe celălalt braț superior și umăr. Repetați din nou pentru a aplica o a treia doză de pompă și aplicați gelul pe brațul superior și umărul pe care l-ați folosit prima dată.

Pasul 3: Curățați aplicatorul curățați


Curățați aplicatorul după utilizare cu un șervețel. Vezi figura I.



figuur I

Aruncați șervețelul folosit în siguranță pentru a preveni transferul produsului la alții, inclusiv copii sau animale de companie.

AMINTIȚI-VĂ să puneți capacul înapoi pe aplicator și să puneți aplicatorul înapoi pe pompă. Vezi figura J.



figuur J

Păstrați produsul în siguranță, departe de îndemâna copiilor.

Pasul 4: După aplicarea gelului dumneavoastră

Spălați-vă imediat mâinile cu săpun și apă dacă au gel pe ele.

Gelul este inflamabil până se usucă. Lăsați gelul să se usuce înainte de a fuma sau de a vă apropia de o flacără deschisă.

Lăsați locul de aplicare să se usuce complet înainte de a vă îmbrăca.

Purtați haine care acoperă locul de aplicare în orice moment, pentru a preveni transferul neintenționat al produsului către alte persoane.

Așteptați cel puțin 2 ore înainte de a face duș, a înota sau a face baie.

Spălați locul de aplicare cu săpun și apă înainte de orice situație în care există o mare probabilitate de contact piele-pe-piele între locul de aplicare și o altă persoană.

Ați folosit prea mult din acest medicament?

Dacă ați aplicat accidental prea mult din acest medicament, spălați locul de aplicare cu săpun și apă de îndată ce vă amintiți.

Utilizați doar cantitatea de medicament prescrisă de medicul dumneavoastră. Dacă vă simțiți iritat sau nervos, luați în greutate sau aveți erecții prelungite sau frecvente, este posibil să folosiți prea mult.

Dacă ați utilizat sau ingerat prea mult din acest medicament, contactați imediat medicul sau farmacistul.

Ați uitat să utilizați acest medicament?

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă trebuie să aplicați următoarea doză în decurs de 12 ore, săriți peste doza uitată.

Continuați cu următoarea doză uzuală doză.

Dacă mai sunt mai mult de 12 ore până la următoarea doză, aplicați doza uitată.

Continuați următoarea zi cu doza uzuală ..

Contactați medicul dumneavoastră înainte de a înceta utilizarea acestui medicament.

Aveți alte întrebări despre utilizarea acestui medicament? Contactați medicul sau farmacistul dumneavoastră.

4. Reacții adverse posibile

Ca orice medicament, și acest

medicament poate avea reacții adverse , deși nu toată lumea le experimentează. Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

Frecvent (apar la mai puțin de 1 din 10 utilizatori)

iritatie a pielii unde gelul a fost aplicat (inclusiv erupție cutanată, uscăciune și roșeață)

ridicat conținut de grăsimi (trigliceride) în sânge

crescută tensiune arterială

crescut specific prostatic antigen (PSA). PSA este o proteină produsă de prostată și poate fi utilizată pentru a detecta o afecțiune a prostatei.

crescut procentaj de globule roșii în sânge (hematocrit), care este determinat prin teste de sânge regulate

Uneori (apar la mai puțin de 1 din 100 de utilizatori)

crescută dureri de cap

dureri de cap

(acnee), afecțiune a pielii cu scuame uleioase pe piele din cauza producției excesive de sebum (seboree), chelie, transpirație, creștere excesivă a părului corporal, senzație de furnicăături sau lipsă de senzație pe piele, dureri de cap, amețeli, greață, bufeuri, retenție de lichide (cum ar fi umflarea gleznelor), creștere în greutate, oprirea temporară a respirației în timpul somnului (apnee în somn), dificultăți de respirație, reacții de hipersensibilitate, senzație de greață/indispoziție, schimbări de dispoziție (cum ar fi agresivitate, ostilitate, nervozitate, anxietate, depresie), insomnie, dureri sau crampe musculare, dezvoltarea sânilor, număr crescut de globule roșii, număr scăzut de globule roșii, cheaguri de sânge, icter (probleme hepatice care uneori sunt însoțite de o colorare galbenă a pielii și a albului ochilor), rezultate neobișnuite ale testelor care măsoară cât de bine funcționează ficatul dumneavoastră (teste de funcție hepatică). amețeală, greață, bufeuri, retenție de lichide (cum ar fi umflarea gleznelor), creștere în greutate, oprirea temporară a respirației în timpul somnului (apnee în somn), dificultăți de respirație, reacții de hipersensibilitate, senzație de greață/indispoziție, schimbări de dispoziție (cum ar fi agresivitate, ostilitate, nervozitate, anxietate, depresie), insomnie, dureri sau crampe musculare, dezvoltarea sânilor, număr crescut de globule roșii, număr scăzut de globule roșii, cheaguri de sânge, icter (probleme hepatice care uneori sunt însoțite de o colorare galbenă a

pielii și a albului ochilor), rezultate neobișnuite ale testelor care măsoară cât de bine funcționează ficatul dumneavoastră (teste de funcție hepatică).

Schimbare a dorinței sexuale, erecții mai frecvente, erecții prelungite și dureroase (priapism), afecțiuni ale testiculului (glandă sexuală masculină), cantitate redusă de spermă, dificultăți la urinare, modificări ale glandei prostatei, cancer de prostată (nu există dovezi concludente că înlocuirea testosteronului la hipogonadali bărbați (bărbați cu deficit de testosteron) cauzează cancer de prostată; totuși, terapia cu testosteron trebuie evitată la bărbații despre care se știe sau se suspectează că au cancer de prostată).

Administrarea prelungită de testosteron poate duce la modificări ale nivelului de săruri (electroliti) și apă în organism.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă aveți reacții adverse, contactați medicul sau farmacistul. Acest lucru este valabil și pentru posibilele reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin Centrul Olandez de Raportare a Reacțiilor Adverse Lareb, site-ul web www.lareb.nl. 5. Cum se păstrează acest medicament?

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Pentru acest medicament nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare. Aceasta este menționată pe eticheta pompei și pe ambalajul exterior după „EXP”. Aceasta include o lună și un an. Ultima zi a acelei luni este data de expirare.

Nu aruncați medicamentele pe calea apei sau a deșeurilor menajere. Întrebați farmacistul ce să faceți cu medicamentele pe care nu le mai folosiți. Acestea vor fi distruse într-un mod responsabil și nu vor ajunge în mediu.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce substanțe conține acest medicament?

Substanța activă din acest medicament este testosteronul.

Celelalte excipienți din acest medicament sunt etanol 96%, propilenglicol (E 1520),
Celelalte excipienți din acest medicament sunt etanol 96%, propilenglicol (E 1520),
dietilenglicolmonoetileter, carbomer 980, trolamină, dinatriumedetat și apă purificată.

Un gram de gel conține 20 mg de testosteron. O apăsare a pompei eliberează 1,15 g (1,25 ml) de gel cu 23 mg de testosteron.

Cum arată acest medicament și ce conține ambalajul?

Testavan este un gel uniform, translucid până la aproape translucid.

Următoarele ambalaje sunt disponibile cu sau fără aplicator cu capac și capac de igienă:
Ambalaj unic cu 1 pompă dozatoare.

Ambalaj multiplu cu 3 pompe dozatoare.

Fiecare pompă conține 85,5 g Testavan gel și poate elibera 56 de doze măsurate. Nu toate mărimile de ambalaj menționate sunt comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și producător

Deținătorul autorizației de punere pe piață

The Simple Pharma Company Limited, Parter, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Irlanda

Producător

Copea Pharma Europe Limited, Medici House, Unit 2, Ashbourne Manufacturing Park,
Ashbourne, Co. Meath, A84 KH58, Irlanda

Aplicator cu capac:

The Simple Pharma Company Limited, Parter, 71 Lower Baggot St, Dublin D02 P593, Irlanda

Număr al autorizației de punere pe piață RVG 120624

RVG 120624

Acest medicament este înregistrat în statele membre ale Spațiului Economic European și în Regatul Unit (Irlanda de Nord) sub următoarele denumiri:

Testarzon Bulgaria	20 mg/g gel transdermic/gel transdermic //transdermale Gel Testavan 20 mg/g ttransdermal gel
Danemarca	Testavan 20 mg/g transdermal gel
Germania	Testavan 20 mg/g transdermale Gel
Estonia	Testavan
Finlanda	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Franța	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Grecia	Testarzon 20 mg/g διαδερμική gel
Ungaria	Testarzon 20 mg/g transdermic gel
Irlanda	Testarzon 20 mg/g transdermal gel
Islanda	Testavan 20 mg/g gel pentru utilizare pe piele
Italia	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Croația	Testarzon 20 mg/g transdermal gel
Letonia	Testavan 20 mg/g transdermal geluri
Liechtenstein	Testavan 20 mg/g transdermal Gel
Lituania	Testavan 20 mg/g transdermic gel
Luxemburg	Testarzon 20 mg/g gel transdermal/gel transdermic/transdermale Gel
Olanda	Testavan 20 mg/g gel pentru uz transdermic
Norvegia	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Austria	Testavan 20 mg/g transdermale Gel
Polonia	Testavan
Portugalia	Testavan 20 mg/g gel transdermic
România	Testavan 20 mg/g gel transdermic
Slovenia	Testarzon 23 mg/presiune transdermic gel
Slovacia	Testavan 20 mg/g transdermic gel
Spania	Testavan 20 mg/g gel transdermic

Cehia Testavan
Regatul Unit Testavan 20 mg/g transdermic gel
(Irlanda de Nord)
Suedia Testavan 20 mg/g transdermic gel

Acest prospect a fost aprobat ultima dată în august 2023

Transtoyou