

Packungsbeilage: Information für den Patienten

Testogel® 16,2 mg/g, transdermales Gel Testosteron

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an andere weiter, da es nur Ihnen verschrieben wurde. Es kann anderen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Bekommen Sie eine der Nebenwirkungen, die in Abschnitt 4 aufgeführt sind? Oder bemerken Sie eine Nebenwirkung, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben ist? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

In dieser Packungsbeilage wird Testogel 16,2 mg/g, transdermales Gel häufig als 'dieses Arzneimittel' bezeichnet.

Inhalt dieser Packungsbeilage Beipackzettel

1. Was ist dieses Medikament und wofür wird es verwendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein?
3. Wie verwenden Sie dieses Medikament?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie bewahren Sie dieses Medikament auf?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Testogel 16,2 mg/g und wofür wird es verwendet?

Dieses Medikament enthält Testosteron, ein männliches Hormon, das von Ihrem Körper produziert wird. Hormone werden an verschiedenen Stellen im Körper produziert. Sie sind wichtig für die Funktionsweise Ihres Körpers.

Dieses Medikament wird bei erwachsenen Männern zur Ergänzung von Testosteron verwendet. Es wird zur Behandlung von Gesundheitsproblemen aufgrund eines Testosteronmangels (Hypogonadismus bei Männern) eingesetzt. Dies muss durch zwei separate Messungen des Testosteronspiegels in Ihrem Blut bestätigt werden. Auch müssen es Beschwerden geben wie:

- Impotenz (keine Erektion bei sexueller Erregung)
- Unfruchtbarkeit sein
- wenig Lust auf Sex
- müde sein
- depressive Stimmungen
- Knochenabbau durch zu wenig Hormone
- weniger männliche Merkmale
- abnehmen
- keine Erektion bekommen oder halten können

2. Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein?

Für wen ist dieses Medikament?

- nur Männer dürfen dieses Medikament verwenden
- junge Männer unter 18 Jahren dürfen dieses Medikament nicht verwenden
- dieses Medikament darf nicht von Frauen jeden Alters verwendet werden
- Achtung: Frauen (insbesondere schwangere oder stillende Frauen) oder Kinder dürfen nicht mit diesem Medikament oder den Hautstellen, auf die dieses Medikament aufgetragen wurde, in Kontakt kommen

Wann dürfen Sie dieses Medikament nicht verwenden?

Sie haben Prostatakrebs oder es könnte sein, dass Sie diesen haben

Sie haben Brustkrebs oder es könnte sein, dass Sie diesen haben

Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Medikaments. Diese Stoffe finden Sie in Abschnitt 6 dieser Packungsbeilage.

Wann müssen Sie besonders vorsichtig mit diesem Medikament sein?

Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Medikament verwenden.

Vor einer Behandlung mit diesem Medikament muss klar sein, dass Sie zu wenig Testosteron haben. Beschwerden, die dies zeigen, sind zum Beispiel: weniger männliche Merkmale, weniger Muskelmasse, Schwäche oder Müdigkeit, weniger Lust auf Sex, Schwierigkeiten beim Erhalten oder Halten einer Erektion. Blutuntersuchungen müssen dies nachweisen können.

Ihr Arzt führt die notwendigen Untersuchungen durch, bevor Sie dieses Medikament verwenden dürfen. Ihr Arzt überwacht Sie danach durch regelmäßige Blutuntersuchungen.

Haben Sie eines der unten stehenden Beschwerden? Oder sind Sie sich nicht sicher? Kontaktieren Sie dann Ihren Arzt, bevor Sie dieses Medikament verwenden. Dieses Medikament kann diese Beschwerden verschlimmern machen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Wasserlassen aufgrund einer vergrößerten Prostata. Die Prostata befindet sich bei Männern unter der Blase.

Sie haben Knochenkrebs. Ihr Arzt überprüft, wie viel Kalzium in Ihrem Blut ist.

Sie haben Bluthochdruck oder werden wegen Bluthochdruck behandelt. Dieses Medikament kann verursachen eine höheren Blutdruck ..

haben eine schwere Herz-, Leber- oder Nierenerkrankung. Eine Behandlung mit diesem Medikament kann zu schweren Problemen führen, da Wasser in Ihrem Körper zurückgehalten wird. Manchmal kann dies mit Herzerkrankungen einhergehen, bei denen Ihr Herz das Blut aufgrund von zu viel Flüssigkeit im Herzen nicht richtig pumpen kann. Sie haben eine Herzerkrankung, bei der zu wenig Blut zum Herzen fließt

Sie haben Probleme mit der Blutgerinnung (durch Gerinnung komm

Sie haben Probleme mit der Blutgerinnung (durch Gerinnung kommt es eine Kruste auf einer Wunde)

- o Thrombophilie: ein Problem mit der Blutgerinnung. Dadurch ist das Risiko größer, dass ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß oder einer Vene (Thrombose) festsetzt
- o als Sie ein größeres Risiko für Blutgerinnsel in einer Vene haben, zum Beispiel durch: frühere Blutgerinnsel in einer Vene, Rauchen, Übergewicht, Krebs, viel

Sitzen oder Liegen. Oder wenn jemand in Ihrer Familie in jungen Jahren (zum Beispiel jünger als 50 Jahre) ein Blutgerinnsel im Bein, in der Lunge oder in einem anderen Organ hatte. Oder wenn Sie älter werden.

- o wie erkennen Sie ein Blutgerinnsel? Ihr Bein wird dick und schmerzt. Oder die Hautfarbe ändert sich plötzlich und wird zum Beispiel blass, rot oder blau. Sie haben plötzlich Atembeschwerden. Sie haben plötzlich Husten mit Blut. Oder haben plötzlich Schmerzen in der Brust. Sie sind sehr schwindelig oder haben das Gefühl, dass Sie fast ohnmächtig werden. Sie haben starke Magenschmerzen. Sie sehen plötzlich schlechter. Haben Sie eines dieser Symptome? Nehmen Sie dann sofort Kontakt mit einem Arzt auf.

Sie haben eine Erkrankung Ihres Gehirns (Epilepsie)

Sie haben Anfälle von starken Kopfschmerzen (Migräne)

u hat Schwierigkeiten beim Atmen während des Schlafens. Dies tritt häufiger auf, wenn Sie übergewichtig sind. Oder wenn Sie über einen längeren Zeitraum Lungenprobleme haben.

Durch die Behandlung mit Androgenen kann das Risiko einer vergrößerten Prostata (Ihre Prostata ist größer als normal. Dies ist nicht gefährlich) oder Prostatakrebs zunehmen. Vor und während der Therapie sollte regelmäßig eine Untersuchung der Prostata auf Empfehlung Ihres Arztes erfolgen.

Wenn Sie an Diabetes leiden und Insulin verwenden, um Ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, kann die Testosteronbehandlung die Reaktion auf Insulin und Ihre Reaktion auf Antidiabetika beeinflussen, und es kann sein, dass die Dosis Ihrer Diabetesmedikation angepasst werden muss.

Im Falle schwerer Hautreaktionen sollte die Behandlung überprüft und bei Bedarf abgebrochen werden.

Dieses Medikament sollte nicht von Frauen verwendet werden, da es virilisierende Effekte hat (wie Wachstum von Körper- oder Kopfhaar, Vertiefung der Stimme oder Veränderungen im Menstruationszyklus).

Informationen über zusätzliche Kontrollen

Ihr Arzt sollte vor und während der Behandlung die folgenden Blutuntersuchungen durchführen: Testosteronspiegel im Blut, vollständiges Blutbild.

Während der Behandlung werden Sie regelmäßig kontrolliert (mindestens einmal pro Jahr und zweimal pro Jahr, wenn Sie älter sind oder wenn Ihr Arzt der Meinung ist, dass Sie ein Risiko haben).

Werden Sie über einen längeren Zeitraum mit Medikamenten behandelt, die Testosteron ersetzen? Dann können zu viele rote Blutkörperchen in Ihrem Blut entstehen (Polyzythämie). Ihr Blut muss häufig untersucht werden, um sicherzustellen, dass dies nicht passiert.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Dieses Medikament wird für Kinder nicht empfohlen, da es keine Informationen über die Anwendung bei Jungen bis 18 Jahre gibt.

Kommt eine andere Person versehentlich mit diesem Medikament in Kontakt?

Bei häufigem oder langem körperlichen Kontakt kann eine andere Person mit diesem Medikament in Kontakt kommen. Dies kann Nebenwirkungen verursachen. Bei Frauen kann dies zu mehr Haarwuchs im Gesicht oder am Körper, einer tieferen Stimme oder veränderter Menstruation führen. Bei Kindern kann es zu schnellem Wachstum, größerem Penis oder Vagina und früher Pubertät (wie Schamhaarwachstum) führen.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen werden empfohlen, um sicherzustellen, dass eine andere Person nicht mit diesem Medikament in Kontakt kommt:

- waschen Sie Ihre Hände sehr gut mit Wasser und Seife, nachdem Sie das Gel verwendet haben
- decken Sie die behandelte Haut mit Kleidung ab, nachdem das Gel getrocknet ist. Zum Beispiel mit einem T-Shirt. Warten Sie mindestens 1 Stunde, bevor Sie nach der Anwendung dieses Medikaments duschen oder baden.
- denken Sie, dass Sie in engen Kontakt mit jemandem mit Ihrer bloßen Haut kommen? Waschen Sie dann vorher die behandelte Haut gut mit Wasser und Seife. So entfernen Sie möglicherweise verbleibendes Testosteron. Ist dies nicht möglich? Tragen Sie dann während des Kontakts Kleidung, die die behandelte Haut bedeckt, wie ein Hemd oder ein T-Shirt.

Patienten, die dieses Medikament verwenden und in der Nähe von Kindern sind, müssen besonders vorsichtig sein. Testosteron kann durch Kleidung hindurchgehen. Kommen Sie in direkten Hautkontakt mit Kindern? Befolgen Sie immer die Regeln zur Anwendung dieses Medikaments (siehe Abschnitt 3 dieser Packungsbeilage). Decken Sie die behandelte Haut mit sauberer Kleidung ab, sobald das Gel getrocknet ist. Waschen Sie auch die behandelte Haut mit Seife, nachdem mindestens 1 Stunde vergangen ist, wie empfohlen. Decken Sie dann die Haut erneut mit sauberer Kleidung ab, bevor Sie in körperlichen Kontakt mit Kindern kommen.

Wenn Sie denken, dass eine andere Person (Mann, Frau oder Kind) mit Testosteron in Kontakt gekommen ist, sollte diese Person:

- die Haut, die mit diesem Medikament in Kontakt gekommen ist, sofort mit Seife und Wasser waschen
- einen Arzt aufsuchen, wenn Beschwerden wie Akne, Veränderung des Haarwuchses im Gesicht oder am Körper, Vertiefung der Stimme oder veränderte Menstruation auftreten.
- achten Sie darauf, ob bei Kindern Beschwerden wie frühe Pubertät oder Vergrößerung des Penis oder der Vagina auftreten.

Warten Sie nach dem Auftragen des Gels vorzugsweise mindestens 1 Stunde, bevor Sie duschen oder ein Bad nehmen.

Nehmen Sie noch andere Medikamente ein?

Nehmen Sie neben Testogel 16,2 mg/g noch andere Medikamente ein, haben Sie dies kürzlich getan oder planen Sie dies in naher Zukunft? Informieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker, insbesondere über die folgenden Medikamente:

- orale Antikoagulantien (Blutverdünner, die oral eingenommen werden)
- Nebennierenrindenhormone (Kortikosteroide, dies sind Medikamente, die Entzündungen und allergische Reaktionen lindern)
- Insulin (Medikamente zur Kontrolle Ihres Blutzuckerspiegels). Es kann notwendig sein, die Insulindosis bei der Einnahme dieses Medikaments zu senken.

Wenn einer der oben genannten Punkte auf Sie zutrifft (oder wenn Sie sich nicht sicher sind), wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Medikament einnehmen.

Insbesondere diese Medikamente können dazu führen, dass Ihre Dosis dieses Medikaments angepasst werden muss.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit Dieses Medikament darf nicht von Frauen verwendet werden.

Die Produktion von Spermien kann durch die Einnahme dieses Medikaments reversibel unterdrückt werden.

Wird Ihre Partnerin schwanger? Dann sollten Sie den Rat befolgen, wie Sie sicherstellen können, dass eine andere Person nicht mit dem Testosterongel in Kontakt kommt.

Schwangere Frauen sollten jeden Kontakt mit Bereichen vermeiden, auf die dieses Medikament aufgetragen wurde. Dieses Medikament kann schädlich für das ungeborene Kind sein, da männliche Merkmale entstehen können. Kommt es dennoch versehentlich zu Hautkontakt? Waschen Sie den Kontaktbereich dann so schnell wie möglich gründlich mit Seife und Wasser.

Fahrfähigkeit und Bedienen von Maschinen

Dieses Medikament hat keinen Einfluss auf die Fahrfähigkeit und die Fähigkeit, Maschinen zu bedienen.

Dieses Medikament enthält Alkohol (Ethanol)

Dieses Medikament enthält 0,9 g Alkohol (Ethanol) in jeder Dosis von 1,25 g Gel.

Es kann ein brennendes Gefühl auf geschädigter Haut verursachen.

Dieses Produkt ist entzündlich, bis es trocken ist. Seien Sie daher vorsichtig mit Hitze und Feuer, wenn Sie dieses Medikament verwenden.

3. Wie verwenden Sie dieses Medikament?

Dieses Medikament darf nur von erwachsenen Männern verwendet werden.

Verwenden Sie dieses Medikament immer genau so, wie es Ihnen Ihr Arzt gesagt hat. Haben Sie Zweifel an der richtigen Anwendung? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die erste Verwendung der Pumpe

Bevor Sie eine neue Pumpe zum ersten Mal verwenden, müssen Sie diese wie folgt vorbereiten.

Entfernen Sie die Kappe vom Behälter, sodass der Kolben sichtbar wird.

Drücken Sie den Kolben dreimal.

Das Gel, das beim ersten dreimaligen Drücken freigesetzt wird, darf nicht verwendet werden. Diese Dosis muss sicher entsorgt werden.

Ihre Pumpe ist jetzt einsatzbereit. Sie müssen diese nicht erneut vorbereiten.

Jedes Mal, wenn der Kolben gedrückt wird, werden 1,25 g Gel abgegeben.

Die empfohlene Menge ist, zweimal täglich zur ungefähr gleichen Zeit, vorzugsweise morgens, 2 Pumpstöße aufzutragen. Die Dosis kann von Ihrem Arzt angepasst werden und sollte nicht mehr als 4 Pumpstöße pro Tag betragen.

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie oft Sie den Kolben drücken müssen, um die für Sie richtige Dosis Gel zu erhalten. Die Tabelle unten gibt Ihnen weitere Informationen dazu.

Anzahl der Drücke	Menge Gel (g)	Menge Testosteron auf die Haut aufgetragen (mg)
1	1,25	20,25
2	2,5	40,5
3	3,75	60,75
4	5,0	81,0

Das Gel sollte vorsichtig in einer dünnen Schicht auf ein sauberes, trockenes und gesundes Hautstück auf beiden Schultern und Oberarmen verteilt werden. Reiben Sie das Gel nicht in die Haut ein. Lassen Sie das Gel mindestens 3-5 Minuten trocknen, bevor Sie sich anziehen. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife, nachdem Sie das Gel aufgetragen haben. Tragen Sie das Gel nicht auf die Geschlechtsorgane (Penis und Hoden) auf, da der hohe Alkoholgehalt lokal Reizungen verursachen kann.

Haben Sie die Pumpe wie oben beschrieben gefüllt? Dann ist das Gel gebrauchsfertig.

Wie tragen Sie das Gel auf?

Der Patient muss das Gel selbst auftragen.

1. Drücken Sie den Kolben einmal nach unten, um das Gel in die Handfläche zu geben.
2. Wählen Sie eine saubere, trockene und gesunde Hautstelle auf der Schulter und dem Oberarm (siehe markierte Bereiche auf dem Foto unten).
3. Verteilen Sie das Gel vorsichtig und gleichmäßig mit den Fingern über eine Schulter und den Oberarm. Reiben Sie es nicht in die Haut.
4. Verwenden Sie 2 Pumpstöße? Wiederholen Sie dann Schritt 1, 2 und 3 auf der anderen Schulter und dem Oberarm.
5. Wenn Sie 3 oder mehr Pumpstöße verwenden, tragen Sie maximal 2 Pumpstöße auf die erste Schulter und den Oberarm und maximal 2 Pumpstöße auf die andere Schulter und den Oberarm auf.
6. Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife, nachdem Sie das Gel aufgetragen haben.
7. Lassen Sie das Gel vollständig trocknen, bevor Sie sich anziehen.

Nicht auf die Geschlechtsorgane (Penis und Hoden) auftragen, da der hohe Alkoholgehalt lokale Reizungen verursachen kann.

Patienten müssen wissen, dass andere Personen (Erwachsene oder Kinder) nicht mit dem Körperteil in Kontakt kommen dürfen, auf den das Gel aufgetragen wurde.

Bedecken Sie die Haut, auf die das Gel aufgetragen wurde, mit sauberer Kleidung (wie einem T-Shirt), nachdem das Gel getrocknet ist.

Waschen Sie die Haut, auf die Sie das Gel aufgetragen haben, mit Wasser und Seife, bevor Sie körperlichen Kontakt mit einer anderen Person (Erwachsener oder Kind) haben. Tun Sie dies,

nachdem die vorgeschriebene Zeit von mindestens 1 Stunde vergangen ist. Bedecken Sie danach die Haut erneut mit sauberer Kleidung.

Das Gel muss vom Patienten selbst auf eine saubere, trockene, gesunde Haut beider Schultern oder beider Arme aufgetragen werden.

Haben Sie zu viel von diesem Medikament verwendet?

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Sie können den Rat erhalten, die Applikationsstelle sofort zu waschen, und Ihr Arzt kann Ihnen raten, die Behandlung abzubrechen.

Die folgenden Anzeichen können darauf hinweisen, dass Sie möglicherweise zu viel von dem Produkt verwendet haben, und Sie sollten Ihren Arzt kontaktieren:

- schnell wütend oder gereizt sein
- Nervosität
- Gewichtszunahme
- häufige oder langanhaltende Erektionen

Diese Symptome können bedeuten, dass Ihre Dosis dieses Medikaments zu hoch ist und Ihr Arzt Ihre Dosis anpassen muss (siehe Abschnitt 2: Wann sollten Sie besonders vorsichtig mit diesem Medikament sein?).

Haben Sie vergessen, dieses Medikament zu verwenden?

Verwenden Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Einzeldosis nachzuholen. Tragen Sie die nächste Dosis zum üblichen Zeitpunkt auf.

Wenn Sie die Einnahme dieses Medikaments beenden

Sie dürfen die Behandlung mit diesem Medikament nicht abbrechen, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen gesagt.

Haben Sie noch weitere Fragen zur Anwendung dieses Medikaments? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie jedes Medikament kann auch dieses Medikament Nebenwirkungen haben. Nicht jeder ist davon betroffen.

Dieses Medikament kann die folgenden Nebenwirkungen verursachen:

Häufig (treten bei weniger als 1 von 10 Anwendern auf)

Probleme mit Ihren Emotionen

Emotionale Beschwerden. Zum Beispiel Probleme mit Ihrer Stimmung, Probleme mit Emotionen (Stimmungsstörungen), Wut, Aggression, Ungeduld, Schlafstörungen, seltsame Träume oder gesteigertes sexuelles Verlangen).

Schwindel sein

ein kribbelndes, prickelndes oder taubes Gefühl (Parästhesie)

Ihr Gedächtnis funktioniert schlechter (Amnesie)

sehr empfindlich sein, wenn etwas oder jemand Sie berührt (Hyperästhesie)

Kopfschmerzen

hoher Blutdruck (Hypertonie)

Durchfall

Haarausfall (Alopezie)

Hautausschlag mit rosa Beulen und starkem Juckreiz (Urtikaria)

Schwellung der Brüste bei Männern. Oder von 1 Brust (Gynäkomastie).

Beschwerden an der Applikationsstelle

Veränderungen in den Ergebnissen von Blutuntersuchungen. Wie zu viele rote

Blutkörperchen im Blut (Polyzythämie) oder Fette im Blut (Lipide).

mehr Hämatokrit. Hämatokrit ist der Wert, der zeigt, wie viele rote Blutkörperchen in Ihrem Blut sind.

mehr Hämoglobin. Dies ist ein Protein in den roten Blutkörperchen. Dieses Protein transportiert Sauerstoff durch den Körper.

mehr rote Blutzellen

Manchmal (treten bei weniger als 1 von 100 Anwendern auf)

schwere hoher Blutdruck

Hitzewallungen

Venenentzündung (Phlebitis)

Schmerzen im Mund

dickeregeschwollener Bauch

Pickel (Akne)

Sie haben mehr Haare als normal (Hirsutismus). Nur Frauen können dies haben.

Hautausschlag

trocken Haut

Ekzem mit fettiger und schuppiger Haut (Seborrhoe)

Wunden an der Haut

juckender Ausschlag auf Ihrer Haut (Kontaktekzem)

Veränderungen in Ihrer Haarfarbe

empfindlich reagieren bei dem Auftragen

Juckreiz an der Auftragsstelle

Problem mit der Brustwarze

Probleme mit der Prostata. Die Prostata befindet sich bei Männern unter der Blase und fügt den Samenzellen Flüssigkeit hinzu.

Schmerzen im Nebenhoden. Der Nebenhoden liegt im Hodensack an den Hoden an.

häufiger eine Erektion bekommen

Flüssigkeit in der Haut, bei der Sie Dellen sehen, wenn Sie darauf drücken (Pitting-Ödem)

erhöhter PSA-Wert. Dies ist eine Substanz im Blut, die zeigt, ob es Probleme mit der Prostata gibt.

Selten (treten bei weniger als 1 von 1.000 Anwendern auf)

- der Penis bleibt sehr lange steif und das tut weh (Priapismus)
- Leberkrebs

Sehr selten (treten bei weniger als 1 von 10.000 Anwendern auf)

- Gelbsucht. Dabei werden Ihre Haut und das Augenweiß gelb.
- Verstopfung in den Harnwegen

Nicht bekannt (kann anhand der verfügbaren Daten nicht bestimmt werden)

- Prostatakrebs
- Sie sind sehr müde und haben wenig Energie (Asthenie)
- nervös sein
- Depression
- wütend und aggressiv sein
- Ihre Atmung stoppt kurz während des Schlafens (Schlafapnoe)
- Verstopfung in den Harnwegen
- Muskelkrämpfe
- mehr oder weniger Lust auf Sex haben
- Verkleinerung der Hoden. Dies liegt daran, dass eine Behandlung mit hohen Dosen Testosteron die Spermienproduktion normalerweise vorübergehend stoppt oder verringert.
- Sie fühlen sich krank oder unwohl (Malaise)
- Flüssigkeit zurückhalten (Ödem)
- allergische Reaktionen
- schwerer werden
- Veränderungen der Salze im Körper. Ihr Körper kann dann Natrium, Chlorid, Kalium, Kalzium, anorganisches Phosphat und Wasser zurückhalten. Dies geschieht bei einer hohen Dosis und/oder langer Behandlung.
- Hautirritationen und trockene Haut bei häufigem Gebrauch dieses Medikaments (da es Alkohol enthält)
- häufiger Flüssigkeit zurückhalten und Ödem

Dieses Medikament enthält Alkohol. Bei häufigem Gebrauch kann es zu Hautirritationen und trockener Haut führen.

Das Melden von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch über das Niederländische Nebenwirkungszentrum Lareb melden. Website: www.lareb.nl. Durch das Melden von Nebenwirkungen helfen Sie uns, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medikaments zu erhalten.

5. Wie bewahren Sie dieses Medikament auf?

Für dieses Medikament gibt es keine besonderen Lagerungsbedingungen.

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verwenden Sie dieses Medikament nicht mehr nach dem Verfallsdatum. Dieses finden Sie auf dem Etikett nach EXP. Dort steht ein Monat und ein Jahr. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum.

Spülen Sie Medikamente nicht in der Spüle oder der Toilette hinunter und werfen Sie sie nicht in den Müll. Fragen Sie Ihren Apotheker, was Sie mit Medikamenten tun sollen, die Sie nicht mehr verwenden. Wenn Sie Medikamente auf die richtige Weise entsorgen, werden sie ordnungsgemäß vernichtet und gelangen nicht in die Umwelt.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Welche Stoffe sind in diesem Medikament enthalten?

Der Wirkstoff in diesem Medikament ist Testosteron.

Die anderen Stoffe in diesem Medikament sind Carbomer 980, Isopropylmyristat, 96% Ethanol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie sieht dieses Medikament aus und was ist in einer Packung enthalten?

Testogel 16,2 mg/g ist ein farbloses Gel, das in einer Mehrdosen-Gelpumpe mit Dosierpumpe geliefert wird, die 88 g Gel enthält und mindestens 60 Dosen abgibt.

Dieses Medikament ist in Schachteln mit einer, zwei, drei oder sechs Packungen erhältlich.

Es kann vorkommen, dass nicht alle Packungsgrößen auf den Markt gebracht werden.

Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen und Hersteller

Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen

Besins Healthcare Netherlands BV

Servaasbolwerk 14

3512 NK Utrecht

Niederlande

Hersteller

Laboratoires Besins International

13, rue Périer

92120 Montrouge

Frankreich

von

Besins Manufacturing Belgium

Groot-Bijgaardenstraat 128

1620 - Drogenbos

Belgien

Eingetragen im Register unter:

RVG 126594

Dieses Medikament ist in den EWR-Mitgliedstaaten unter den folgenden Namen registriert:

Dänemark: Testogel

Zypern: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Griechenland: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Finnland: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Island: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Malta: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Norwegen: Testogel 16.2 mg/g transdermales Gel

Schweden: Testogel

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im Oktober 2024 genehmigt

Transtoyou