

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Testogel® 16,2 mg/g, transderminis gelis
Testosteronas

Atidžiai perskaitykite visą pakuotės lapelį prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama svarbi informacija.

- Išsaugokite šį pakuotės lapelį. Gali prireikti jį perskaityti dar kartą.
- Jei turite klausimų, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.
- Neduokite šio vaisto kitiems, nes jis skirtas tik jums. Jis gali pakenkti kitiems, net jei jų simptomai tokie patys kaip jūsų.
- Ar pasireiškė šalutinis poveikis, nurodytas 4 skyriuje? Arba pasireiškė šalutinis poveikis, kuris nėra nurodytas šiame pakuotės lapelyje? Tada kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Šiame pakuotės lapelyje Testogel 16,2 mg/g, transderminis gelis dažnai vadinamas „šiuo vaistu“.

Turinys šio pakuotės lapelio

1. Kas yra šis vaistas ir kam jis vartojamas?
2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?
3. Kaip vartoti šį vaistą?
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti šį vaistą?
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Testogel 16,2 mg/g ir kam jis vartojamas?

Šis vaistas turi testosterono, vyriško hormono, kurį gamina jūsų kūnas. Hormonai gaminami įvairiose kūno vietose. Jie yra svarbūs jūsų kūno veiklai.

Šis vaistas vartojamas suaugusiems vyrams testosterono papildymui. Jis vartojamas sveikatos problemoms gydyti, kurias sukelia per mažas testosterono kiekis (hipogonadizmas vyrams). Tai turi būti patvirtinta dviem atskirais testosterono matavimais jūsų kraujyje. Taip pat turi būti simptomai kaip ::

- nevaisingumas
- nevaisingas būti
- mažai noras seksas
- pavargęs būti
- depresinės nuotaikos
- kaulų nykimas dėl per mažai hormonai
- mažiau vyriški bruožai
- numesti svorio
- negalėjimas gauti ar išlaikyti erekcijos

2. Kada negalima vartoti šio vaisto arba reikia būti ypač atsargiems?

Kam skirtas šis vaistas?

- tik vyrai gali vartoti šį vaistą

- jauni vyrai iki 18 metų negali vartoti šio vaisto
- šio vaisto negali vartoti moterys bet kokio amžiaus
- atkreipkite dėmesį: moterys (ypač nėščios ar maitinančios krūtimi) arba vaikai neturėtų liestis su šiuo vaistu ar su odos vietomis, kuriose šis vaistas buvo užteptas

Kada negalima vartoti šio vaisto?

Jūs sergate prostatos vėžiu arba gali būti, kad sergate

Jūs sergate krūties vėžiu arba gali būti, kad sergate

Jūs esate alergiškas bet kuriai šio vaisto medžiagai. Šias medžiagas galite rasti šio pakuotės lapelio 6 skyriuje.

Kada turėtumėte būti ypač atsargūs vartodami šį vaistą?

Prieš vartodami šį vaistą, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Prieš pradėdant gydymą šiuo vaistu, turi būti aišku, kad jums trūksta testosterono. Simptomai, kurie tai rodo, yra, pavyzdžiui: mažiau vyriškų bruožų, mažesnė raumenų masė, silpnumas ar nuovargis, mažesnis lytinis potraukis, sunkumai pasiekti ar išlaikyti erekciją. Kraujo tyrimas turi tai patvirtinti.

Jūsų gydytojas atliks tyrimus, kurie būtini prieš pradėdant vartoti šį vaistą. Jūsų gydytojas jus stebės reguliariai atlikdamas kraujo tyrimus.

Ar turite vieną iš žemiau išvardytų simptomų? Ar nesate tikri? Tada susisiekite su savo gydytoju prieš vartodami šį vaistą. Šis vaistas gali šiuos simptomus pabloginti padaryti.

jūs turi sunkumų šlapinantis dėl per didelės prostatos liaukos. Prostata yra vyrams po šlapimo pūsle.

jūs sergate kaulų vėžiu. Jūsų gydytojas tikrina, kiek kalcio yra jūsų kraujyje.

jūs turite aukštą kraujospūdį arba esate gydomas dėl aukšto kraujospūdžio. Šis vaistas gali sukelti aukštesnį kraujospūdį . jūs.

jūs turite širdies ligą, kai į širdį teka per mažai kraujo jūs turite kraujo krešėjimo problemų (dėl krešėjimo kom

jūs sergate širdies liga, kai į širdį teka per mažai kraujo

jūs turite kraujo krešėjimo problemų (dėl krešėjimo komt yra šašas ant žaizdelės)

- o trombofilija: problema su kraujo krešėjimu. Dėl to yra didesnė rizika, kad kraujo krešulys užstrigs kraujagyslėje ar venoje (trombozė)
- o jei turite didesnę riziką kraujo krešuliams venoje dėl, pavyzdžiui: ankstesnių kraujo krešulių venoje, rūkymo, antsvorio, vėžio, daug sėdėjimo ar gulėjimo. Arba jei kas nors jūsų šeimoje jauname amžiuje (pavyzdžiui, jaunesnis nei 50 metų) turėjo kraujo krešulį kojoje, plaučiuose ar kitame organe. Arba jei jūs senstate ..
- o atpažinti kraujo krešulį? Jūsų koja patinsta ir skauda. Arba odos spalva staiga pasikeičia ir tampa, pavyzdžiui, blyški, raudona ar mėlyna. Jums staiga sunku kvėpuoti. Jums staiga atsiranda kosulys su krauju. Arba staiga jaučiate skausmą krūtinėje. Jūs esate labai apsvaigęs arba jaučiate, kad beveik alpstate. Jums labai skauda pilvą. Staiga matote blogiau. Ar turite vieną iš šių simptomų? ar atpažįstate kraujo krešulį? Jūsų koja patinsta ir skauda. Arba odos spalva staiga pasikeičia ir tampa, pavyzdžiui, blyški, raudona ar mėlyna. Jums staiga sunku kvėpuoti. Jus staiga kankina kosulys su krauju. Arba staiga jaučiate skausmą krūtinėje. Jūs esate labai apsvaigęs arba jaučiate, kad beveik nualpsite. Jums

stipriai skauda skrandį. Staiga matote blogiau. Ar jaučiate vieną iš šių simptomų?
nedelsiant susisieki su gydytoju . jūs turite smegenų ligą (epilepsija)
jūs sergate smegenų liga (epilepsija)
jūs patiriate stiprius galvos skausmo priepuolius (migrena)
jūs sunkiai kvėpuojate miegant. Tai dažniau pasitaiko, jei turite antsvorio. Arba jei ilgą laiką turite plaučių problemų.

Gydymas androgenais gali padidinti padidėjusios prostatos liaukos (jūsų prostata yra didesnė nei įprasta. Tai nėra pavojinga) arba prostatos vėžio riziką. Prieš terapiją ir jos metu reikia reguliariai tikrinti prostatos liauką, kaip rekomenduoja jūsų gydytojas.

Jei sergate diabetu ir naudojate insuliną cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti, testosterono gydymas gali paveikti reakciją į insuliną ir jūsų reakciją į antidiabetinius vaistus, todėl gali tekti koreguoti vaistų nuo diabeto dozę.

Esant sunkioms odos reakcijoms, gydymas turėtų būti peržiūrėtas ir, jei reikia, nutrauktas.

Šio vaisto negali vartoti moterys, nes jis turi virilizuojantį poveikį (pvz., kūno ar galvos plaukų augimas, balso sustorėjimas ar menstruacinio ciklo pokyčiai).

Informacija apie papildomus patikrinimus

Jūsų gydytojas turi atlikti šiuos kraujo tyrimus prieš ir gydymo metu: testosterono kiekis kraujyje, pilnas kraujo tyrimas.

Gydymo metu jūs būsite reguliariai tikrinami (bent kartą per metus ir du kartus per metus, jei esate vyresni arba jei jūsų gydytojas mano, kad jums kyla rizika).

Ar ilgą laiką vartojate vaistus, kurie pakeičia testosteroną? Tada jūsų kraujyje gali atsirasti per daug raudonųjų kraujo kūnelių (policitemija). Jūsų kraujas turi būti dažnai tiriamas, kad būtų užtikrinta, jog tai neįvyksta.

Vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų

Šis vaistas nerekomenduojamas vaikams, nes nėra informacijos apie jo vartojimą berniukams iki 18 metų.

Ar kitas asmuo netyčia susidūrė su šiuo vaistu?

Dažnai ar ilgai fiziškai kontaktuojant, kitas asmuo gali susidurti su šiuo vaistu. Tai gali sukelti šalutinius poveikius. Moterims tai gali sukelti daugiau plaukų augimą ant veido ar kūno, balso sustorėjimą ar menstruacijų pokyčius. Vaikams tai gali sukelti greitą augimą, didesnį varpą ar makštį ir ankstyvą brendimą (pvz., gaktos plaukų atsiradimą).

Rekomenduojamos šios atsargumo priemonės, kad kitas asmuo nesusidurtų su šiuo vaistu:

gerai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu po to, kai panaudojote gelį
uždenkite gydytą odą drabužiais, kai gelis išdžiūsta. Pavyzdžiui, su marškinėliais.
Palaukite bent 1 valandą prieš maudymąsi ar vonią po šio vaisto naudojimo.
ar manote, kad artimai kontaktuosite su kuo nors nuoga oda? Prieš tai gerai nuplaukite gydytą odą vandeniu ir muilu. Taip pašalinsite galimai likusį testosteroną. Jei tai neįmanoma, kontakto metu dėvėkite drabužius, kurie uždenkia gydytą odą, pavyzdžiui, marškinius ar marškinėlius.

Pacientai, vartojantys šį vaistą ir esantys arti vaikų, turi būti ypač atsargūs. Testosteronas gali prasiskverbti per drabužius. Ar turite tiesioginį odos kontaktą su vaikais? Visada laikykitės taisyklių dėl šio vaisto vartojimo (žr. šio lapelio 3 skyrių). Uždenkite gydytą odą švariais drabužiais, kai gelis išdžiūsta. Taip pat nuplaukite gydytą odą muilu po bent 1 valandos, kaip patariama. Tada vėl uždenkite odą švariais drabužiais prieš fizinį kontaktą su vaikais.

Jei manote, kad kitas asmuo (vyras, moteris ar vaikas) susilietė su testosteronu, šis asmuo turėtų:

- nedelsiant nuplauti odą, kuri susilietė su šiuo vaistu, muilu ir vandeniu
- kreiptis į gydytoją, jei atsiranda tokių simptomų kaip spuogai, veido ar kūno plaukų augimo pokyčiai, balso žemėjimas ar bakitokios menstruacijos.
- stebėti, ar vaikams neatsiranda tokių simptomų kaip ankstyva branda ar varpos ar makšties padidėjimas.

Po gelio užtepimo geriausia palaukti bent 1 valandą prieš maudymąsi ar vonios ėmimą.

Ar vartojate kitus vaistus?

Ar vartojate kitus vaistus be Testogel 16,2 mg/g, ar neseniai vartojote, ar ketinate vartoti?

Pasakykite tai savo gydytojui ar vaistininkui, ypač šiuos vaistus:

- geriamieji antikoagulantai (kraujo skiedikliai, vartojami per burną)
- antinksčių žievės hormonai (kortikosteroidai, tai vaistai, mažinantys uždegimus ir alergines reakcijas)
- insulinas (vaistai, skirti kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje). Gali prireikti sumažinti insulino dozę vartojant šį vaistą.

Jei kuris nors iš aukščiau paminėtų punktų jums tinka (arba jei nesate tikri), prieš vartodami šį vaistą kreipkitės į savo gydytoją ar vaistininką.

Ypač šie vaistai gali lemti, kad jūsų šio vaisto dozė turėtų būti koreguojama.

Nėštumas, žindymas ir vaisingumas Šio vaisto negalima vartoti moterims.

Šio vaisto vartojimas gali laikinai slopinti spermų gamybą.

Ar jūsų partnerė pastoję? Tuomet turite laikytis patarimų, kaip užtikrinti, kad kitas asmuo nesusilietų su testosterono geliu.

Nėščios moterys turi vengti bet kokio kontakto su vietomis, kuriose buvo užteptas šis vaistas. Šis vaistas gali būti kenksmingas negimusiam kūdikiui, nes gali atsirasti vyriškų požymių. Jei vis dėlto netyčia įvyko odos kontaktas, kuo greičiau kruopščiai nuplaukite kontaktinę vietą muilu ir vandeniu.

Vairavimo gebėjimai ir mašinų naudojimas

Šis vaistas neturi įtakos vairavimo gebėjimams ir gebėjimui valdyti mašinas.

Šis vaistas turi alkoholio (etanolio)

Šis vaistas turi 0,9 g alkoholio (etanolio) kiekvienoje 1,25 g gelio dozėje.

Jis gali sukelti deginimo pojūtį ant pažeistos odos.

Šis produktas yra degus, kol neišdžiūsta. Todėl būkite atsargūs su karščiu ir ugnimi, kai naudojate šį vaistą.

3. Kaip vartoti šį vaistą?

Šis vaistas skirtas tik suaugusiems vyrams.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai taip, kaip nurodė jūsų gydytojas. Abejojate dėl tinkamo vartojimo? Susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

Pirmasis pompos naudojimas

Prieš pirmą kartą naudodami naują pompą, turite ją paruošti taip.

Nuimkite dangtelį nuo rezervuaro, kad stūmoklis būtų matomas.

Paspauskite stūmoklį tris kartus.

Gelio, kuris išsiskiria pirmą kartą tris kartus paspaudus, negalima naudoti. Ši dozė turi būti saugiai išmesta.

Jūsų pompa dabar paruošta naudoti. Jums nereikia jos dar kartą paruošti.

Kiekvieną kartą, kai stūmoklis paspaudžiamas, išleidžiama 1,25 g gelio.

Rekomenduojama dozė yra 2 paspaudimai kartą per dieną, maždaug tuo pačiu metu, geriausia ryte. Dozę gali koreguoti jūsų gydytojas, bet ji neturi viršyti 4 paspaudimų per dieną.

Jūsų gydytojas nurodys, kaip dažnai turite paspausti stūmoklį, kad gautumėte jums tinkamą gelio dozę. Toliau pateikta lentelė suteikia daugiau informacijos apie tai.

Paspaudimų skaičius	Gelio kiekis (g)	Testosterono kiekis užteptas ant odos (mg)
1	1,25	20,25
2	2,5	40,5
3	3,75	60,75
4	5,0	81,0

Gelį reikia atsargiai paskirstyti plonu sluoksniu ant švarios, sausos ir sveikos odos abiejų pečių ir viršutinių rankų srityje. Netepkite gelio į odą. Leiskite geliui išdžiūti bent 3-5 minutes prieš apsirengiant. Po gelio užtepimo nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.

Netepti gelio ant lytinių organų (varpos ir sėklidžių), nes didelis alkoholio kiekis gali sukelti vietinį dirginimą.

Ar užpildėte pompą, kaip nurodyta aukščiau? Tada gelis paruoštas naudoti.

Kaip tepti gelį?

Pacientas turi pats tepti gelį.

1. Paspauskite stūmoklį vieną kartą, kad gelis patektų į delną.
2. Pasirinkite švarią, sausą ir sveiką odos zoną ant peties ir viršutinės rankos (žr. pažymėtas sritis nuotraukoje žemiau).
3. Atsargiai ir tolygiai paskirstykite gelį pirštais ant vieno peties ir viršutinės rankos. Netepkite jo į odą ..
4. Jei naudojate 3 ar daugiau pompų, tepkite ne daugiau kaip 2 pompas ant pirmo peties ir viršutinės rankos ir ne daugiau kaip 2 pompas ant kito peties ir viršutinės rankos.

5. Po gelio užtepimo nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu.
6. Leiskite geliui visiškai išdžiūti prieš apsirengiant.
7. Netepti ant lytinių organų (varpos ir sėklidžių), nes didelis alkoholio kiekis gali sukelti vietinį dirginimą.

Pacientai turi žinoti, kad kiti asmenys (suaugusieji ar vaikai) neturi liestis su kūno dalimi, kur buvo užteptas gelis.

Uždenkite odą, kur buvo užteptas gelis, švariais drabužiais (pvz., marškinėliais), kai gelis išdžius.

Uždenkite odą, ant kurios buvo užteptas gelis, švariais drabužiais (pvz., marškinėliais), kai gelis išdžius.

Nuplaukite odą, ant kurios užtepėte gelio, vandeniu ir muilu prieš turėdami fizinį kontaktą su kitu asmeniu (suaugusiuoju ar vaiku). Padarykite tai po to, kai praėjo nurodytas laikas, ne mažiau kaip 1 valanda. Po to vėl uždenkite odą švariais drabužiais.

Gelij turi užtepti pats pacientas ant švarios, sausos, sveikos abiejų pečių ar abiejų rankų odos.

Ar vartojote per daug šio vaisto?

Kreipkitės į savo gydytoją ar vaistininką patarimo.

Jums gali būti patarta nedelsiant nuplauti vartojimo vietą, o gydytojas gali patarti nutraukti gydymą.

Šie požymiai gali rodyti, kad galbūt vartojate per daug produkto ir turėtumėte susisiekti su savo gydytoju:

- greitai piktas arba sudirgęs būti
- nervingumas
- svorio padidėjimas
- dažnos arba ilgalaikės erekcijos

Šie simptomai gali reikšti, kad jūsų šio vaisto dozė yra per didelė ir jūsų gydytojas turi koreguoti jūsų dozę (žr. 2 skyrių: Kada reikia būti ypač atsargiems vartojant šį vaistą?).

Ar pamiršote vartoti šį vaistą?

Nevartokite dvigubos dozės, kad kompensuotumėte praleistą individualią dozę. Vartokite kitą dozę įprastu laiku.

Jei nustosite vartoti šį vaistą

Jūs neturėtumėte nutraukti gydymo šiuo vaistu, nebent jūsų gydytojas jums tai pasakė.

Ar turite kitų klausimų apie šio vaisto vartojimą? Tada susisiekite su savo gydytoju arba vaistininku.

4. Galimas šalutinis poveikis

Kaip ir bet kuris vaistas, šis vaistas gali turėti šalutinį poveikį. Ne visi jį patiria.

Šis vaistas gali sukelti šiuos šalutinius poveikius:

Dažnai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 vartotojų)

problemų su jūsų emocijomis
emocinės problemos. Pavyzdžiui, nuotaikos problemos, emocijų problemos (nuotaikos sutrikimai), pyktis, agresija, nekantrumas, blogas miegas, keisti sapnai arba padidėjęs lytinis potraukis).
galvos svaigimas būti
dilgčiojimo, badymo ar nejautos pojūtis (parestezija)
jūsų atmintis veikia prasčiau (amnezija)
labai jautrus, kai kažkas ar kažkas jus liečia (hiperestezija)
galvos skausmas
aukštas kraujospūdis (hipertenzija)
viduriavimas
plaukų slinkimas (alopecija)
odos bėrimas su rausvais gumbeliais ir stipriu niežuliu (dilgėlinė)
patinimas krūtų padidėjimas vyrams. Arba vienos krūties (ginekomastija).
skundai taikymo vietoje
pokyčiai kraujo tyrimų rezultatuose. Pavyzdžiui, per daug raudonųjų kraujo kūnelių kraujyje (policitemija) arba riebalų kraujyje (lipidai).
daugiau hematokrito. Hematokritas yra skaičius, rodantis, kiek raudonųjų kraujo kūnelių yra jūsų kraujyje.
daugiau hemoglobino. Tai yra baltymas raudonuosiuose kraujo kūneliuose. Šis baltymas perneša deguonį per kūną.
daugiau raudonųjų kraujo kūnelių

Kartais (pasireiškia mažiau nei 1 iš 100 vartotojų)
stiprus aukštas kraujospūdis
karščio bangos
venos uždegimas (flebitas)
skausmas burnoje burna
storesnispatinėš pilvas
spuogai (aknė)
jūs turite daugiau plaukų nei įprastai (hirsutizmas). Tik moterys gali tai turėti.
odos bėrimas
sausą oda
egzema su riebi oda ir pleiskanomis (seborėja)
žaiždelės prie odos oda
niežtintis bėrimas ant odos (kontaktinis dermatitas)
pokyčiai plaukų spalvoje jautrus
reaguoti prie užtepimo užtepimo niežulys užtepimo vietoje
problema
su oda spenelis
prostato problemos. Prostata yra vyrams po šlapimo pūsle ir prideda skysčio prie spermos ląstelių.
skausmas sėklidės prielipe. Sėklidės prielipas yra šalia sėklidės kapšelyje.
dažniau pasireiškia erekcija
skystis odoje, kur matosi duobutės, kai paspaudžiate (pitting edema)
padidėjęs PSA. Tai yra medžiaga kraujyje, rodanti, ar yra problemų su prostata.

Retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 1 000 vartotojų)
- varpa ilgai išliekastandi ir tai sukelia skausmą (priapizmas)
- kepenų vėžys

Labai retai (pasireiškia mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų)

- gelta. Jūsų oda ir akių baltymai tampa geltoni.
- vidurių užkietėjimas šlapimo takų

Nežinoma (negali būti nustatyta pagal turimus duomenis)

- prostatos vėžys
- jaučiatės labai pavargęs ir neturite energijos (astenija)
- nervingas yra
- depresija
- piktas ir agresyvus yra
- jūsų kvėpavimas trumpam sustoja miegant (miego apnėja)
- vidurių užkietėjimas į šlapimo takus
- raumenų spazmai
- didesnis ar mažesnis noras turėti lytinių santykių
- sėklidžių sumažėjimas. Taip yra todėl, kad gydymas didelėmis testosterono dozėmis paprastai laikinai sustabdo arba sumažina spermą gamybą.
- jaučiatės blogai arba jaučiatės prastai (negalavimas)
- skysčių sulaikymas (edema)
- alerginė reakcija
- sunkesnis tapti
- pokyčiai druskų kiekyje organizme. Jūsų kūnas gali sulaikyti natrij, chloridą, kalį, kalcį, neorganinį fosfatą ir vandenį. Tai atsitinka vartojant didelę dozę ir/arba ilgai gydantis.
- odos dirginimas ir sausa oda dažnai vartojant šį vaistą (nes jame yra alkoholio)
- dažniau skystis sulaikyti ir edema

Šis vaistas turi alkoholio. Dažnai vartojant gali sukelti odos dirginimą ir sausą odą.

Šalutinių poveikių pranešimas

Jei pasireiškia šalutinis poveikis, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką. Tai taip pat taikoma šalutiniams poveikiams, kurie nėra paminėti šiame lapelyje. Jūs taip pat galite pranešti apie šalutinius poveikius per Olandijos Šalutinių Poveikių Centrą Lareb. Svetainė: www.lareb.nl. Pranešdami apie šalutinius poveikius, padedate mums gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti šį vaistą?

Šiam vaistui nėra specialių laikymo sąlygų.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Nenaudokite šio vaisto po galiojimo pabaigos datos. Ją rasite ant etiketės po EXP. Ten nurodytas mėnuo ir metai. Paskutinė to mėnesio diena yra galiojimo pabaigos data.

Neleiskite vaistų į kanalizaciją ar tualetą ir nemeskite jų į šiukšliadėžę. Paklauskite savo vaistininko, ką daryti su vaistais, kurių nebevartojate. Teisingai pašalinus vaistus, jie bus tinkamai sunaikinti ir nepateks į aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Kokios medžiagos yra šiame vaistiniame preparate?

Veiklioji medžiaga šiame vaistiniame preparate yra testosteronas.

Kitos medžiagos šiame vaistiniame preparate yra karbomeras 980, izopropilmiristatas, 96% etanolis, natrio hidroksidas, išgrynintas vanduo.

Kaip atrodo šis vaistinis preparatas ir kas yra pakuotėje?

Testogel 16,2 mg/g yra bespalvis gelis, tiekiamas daugiadoziniame gelio siurblyje su dozavimo pompa, kuriame yra 88 g gelio ir kuris išduoda mažiausiai 60 dozių.

Šis vaistinis preparatas tiekiamas dėžutėse su viena, dviem, trimis arba šešiomis pakuotėmis.

Gali būti, kad ne visos pakuočių dydžiai yra pateikiami rinkai.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Rinkodaros teisės turėtojas

Besins Healthcare Netherlands BV

Servaasbolwerk 14

3512 NK Utrecht

Nyderlandai

Gamintojai

Laboratoires Besins International

13, rue Périer

92120 Montrouge

Prancūzija

of

Besins Manufacturing Belgium

Groot-Bijgaardenstraat 128

1620 - Drogenbos

Belgija

Įregistruota registre:

RVG 126594

Šis vaistas yra registruotas EEE valstybėse narėse šiais pavadinimais:

Danija: Testogel

Kipras: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Graikija: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Suomija: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Islandija: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Malta: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Norvegija: Testogel 16.2 mg/g transderminis gelis

Švedija: Testogel

Ši pakuotės lapelė paskutinį kartą patvirtinta 2024 m. spalio mėn.

Transtoyou