

Ulotka: informacje dla pacjenta

Testogel® 16,2 mg/g, żel transdermalny
Testosteron

Przeczytaj uważnie całą ulotkę przed użyciem tego leku, ponieważ zawiera ważne informacje dla Ciebie.

- Zachowaj tę ulotkę. Może być potrzebna ponownie.
- Masz pytania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie przekazuj tego leku innym, ponieważ jest on przepisany wyłącznie Tobie. Może być szkodliwy dla innych, nawet jeśli mają takie same objawy jak Ty.
- Czy wystąpił u Ciebie któryś z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4? A może wystąpiło działanie niepożądane niewymienione w tej ulotce? Skontaktuj się wtedy z Twoim lekarzem lub farmaceutą.

W tej ulotce Testogel 16,2 mg/g, żel transdermalny jest często nazywany 'tym lekiem'.

Spis treści tej ulotki

1. Co to jest ten lek i do czego jest stosowany?
2. Kiedy nie wolno stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?
3. Jak stosować ten lek?
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać ten lek?
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Testogel 16,2 mg/g i do czego jest stosowany?

Ten lek zawiera testosteron, męski hormon wytwarzany przez organizm. Hormony są wytwarzane w różnych miejscach w organizmie. Są ważne dla funkcjonowania organizmu.

Ten lek jest stosowany u dorosłych mężczyzn w celu uzupełnienia testosteronu. Jest stosowany w leczeniu problemów zdrowotnych spowodowanych niedoborem testosteronu (hipogonadyzm u mężczyzn). Musi to być potwierdzone przez dwa oddzielne pomiary testosteronu we krwi. Również muszą być objawy takie jak ::

- niepłodność
- bezpłodny są
- mało ochota na seks
- zmęczony są
- depresyjne nastroje
- utrata masy kostnej przez za mało hormony
- mniej męskie cechy
- schudnąć
- niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu (erekcji)

2. Kiedy nie wolno stosować tego leku lub należy zachować szczególną ostrożność?

Dla kogo jest ten lek?

- tylko mężczyźni mogą stosować ten lek
- młodzi mężczyźni do 18 roku życia nie mogą stosować tego leku

- ten lek nie może być stosowany przez kobiety w każdym wieku
- uwaga: kobiety (zwłaszcza kobiety w ciąży lub karmiące piersią) lub dzieci nie powinny mieć kontaktu z tym lekiem ani z miejscami na skórze, gdzie ten lek został nałożony

Kiedy nie wolno stosować tego leku?

Masz raka prostaty lub istnieje możliwość, że go masz

Masz raka piersi lub istnieje możliwość, że go masz

Jesteś uczulony na którykolwiek ze składników tego leku. Składniki te można znaleźć w punkcie 6 tej ulotki.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem musi być jasne, że masz niedobór testosteronu. Objawy, które mogą to wskazywać, to na przykład: mniej męskich cech, mniejsza masa mięśniowa, osłabienie lub zmęczenie, mniejsza ochota na seks, trudności z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji. Badania krwi powinny to potwierdzić.

Twój lekarz przeprowadzi badania niezbędne przed rozpoczęciem stosowania tego leku. Następnie lekarz będzie Cię monitorować, regularnie wykonując badania krwi.

Czy masz któryś z poniższych objawów? A może nie jesteś pewien? Skontaktuj się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Ten lek może te objawy pogorszyć robić.

masz trudności z oddawaniem moczu z powodu powiększonego gruczołu krokowego.

Prostata znajduje się u mężczyzn pod pęcherzem.

masz raka kości. Twój lekarz kontroluje poziom wapnia we krwi.

masz wysokie ciśnienie krwi lub jesteś leczony na nadciśnienie. Ten lek może powodować wzrost ciśnienia krwi ..

poważną chorobę serca, wątroby lub nerek. Leczenie tym lekiem może powodować poważne problemy, zatrzymując wodę w organizmie. Czasami może to współwystępować z chorobami serca, w których serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi z powodu nadmiaru płynów w sercu. masz chorobę serca, w której do serca dopływa zbyt mało krwi

masz problemy z krzepnięciem krwi (z powodu krzepnięcia kom

masz problemy z krzepnięciem krwi (przez krzepnięcie komt er een korstje op een wondje)

- o trombofilia: problem z krzepnięciem krwi. Z tego powodu istnieje większe ryzyko, że skrzep krwi utknie w naczyniu krwionośnym lub żyły (zakrzepica)
- o als je masz większe ryzyko zakrzepów w żyły z powodu na przykład: wcześniejszych zakrzepów w żyły, palenia, nadwagi, raka, długiego siedzenia lub leżenia. Lub jeśli ktoś w twojej rodzinie w młodym wieku (na przykład młodszym niż 50 lat) miał zakrzep w nodze, płucu lub innym organie. Of als je stajesz się starszy ..
- o rozpoznajesz zakrzep? Twoja noga staje się gruba i boli. Lub kolor skóry nagle się zmienia i staje się na przykład blady, czerwony lub niebieski. Nagle masz trudności z oddychaniem. Nagle masz kaszel z krwią. Lub nagle odczuwasz ból w klatce piersiowej. Jesteś bardzo zawrotny lub masz uczucie, że zaraz zemdlejesz. Masz silny ból brzucha. Nagle widzisz gorzej. Czy masz któryś z tych objawów? czy rozpoznajesz skrzep krwi? Twoja noga staje się opuchnięta i

bolesna. Albo kolor skóry nagle się zmienia i staje się na przykład błydy, czerwony lub niebieski. Nagle masz trudności z oddychaniem. Nagle masz kaszel z krwią. Albo nagle odczuwasz ból w klatce piersiowej. Jesteś bardzo zawrotny lub masz wrażenie, że zaraz zemdlejesz. Masz silny ból brzucha. Nagle widzisz gorzej. Czy masz któryś z tych objawów? natychmiast z lekarzem . masz chorobę mózgu (padaczka)

masz chorobę mózgu (padaczka)

masz napady silnego bólu głowy (migrena)

u ma trudności z oddychaniem podczas snu. Dzieje się to częściej, jeśli masz nadwagę.

Lub jeśli przez długi czas masz problemy z płucami.

Leczenie androgenami może zwiększać ryzyko powiększenia gruczołu krokowego (prostata jest większa niż normalnie. To nie jest niebezpieczne) lub raka prostaty. Przed i w trakcie terapii należy regularnie przeprowadzać badania gruczołu krokowego, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jeśli cierpisz na cukrzycę i używasz insuliny do kontrolowania poziomu cukru we krwi, leczenie testosteronem może wpływać na reakcję na insulinę i reakcję na leki przeciwcukrzycowe, i może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych.

W przypadku ciężkich reakcji skórnych, leczenie powinno zostać zrewidowane i przerwane, jeśli to konieczne.

Ten lek nie powinien być stosowany przez kobiety, ponieważ ma działanie wirylizujące (takie jak wzrost włosów na ciele lub głowie, pogłębienie głosu lub zmiany w cyklu menstruacyjnym).

Informacje o dodatkowych kontrolach

Twój lekarz powinien przed i w trakcie leczenia przeprowadzać następujące badania krwi: poziom testosteronu we krwi, pełna morfologia krwi.

Podczas leczenia będziesz regularnie kontrolowany (co najmniej raz w roku i dwa razy w roku, jeśli jesteś starszy lub jeśli lekarz uważa, że jesteś w grupie ryzyka).

Czy jesteś leczony przez długi czas lekami zastępującymi testosteron? Wtedy może dojść do nadmiaru czerwonych krwinek we krwi (policytomia). Twoja krew powinna być często badana, aby upewnić się, że to się nie dzieje.

Dzieci i młodzież do 18 lat

Ten lek nie jest zalecany dla dzieci, ponieważ nie ma informacji o stosowaniu u chłopców do 18 roku życia.

Czy inna osoba przypadkowo zetknęła się z tym lekiem?

Przy częstym lub długotrwałym kontakcie fizycznym inna osoba może zetknąć się z tym lekiem. Może to powodować działania niepożądane. U kobiet może to powodować większy wzrost włosów na twarzy lub ciele, obniżenie głosu lub zmiany w menstruacji. U dzieci może to powodować szybki wzrost, powiększenie penisa lub pochwy i wczesne dojrzewanie (takie jak pojawienie się owłosienia łonowego).

Zaleca się następujące środki ostrożności, aby upewnić się, że inna osoba nie zetknie się z tym lekiem:

umyj ręce bardzo dokładnie wodą i mydłem po użyciu żelu
zakryj leczone skórę ubraniem po wyschnięciu żelu. Na przykład koszulką. Odczekaj co najmniej 1 godzinę przed prysznicem lub kąpielą po użyciu tego leku.
czy zamierzasz mieć bliski kontakt z kimś z odsoniętą skórą? W takim przypadku umyj wcześniej leczone skórę dokładnie wodą i mydłem. W ten sposób usuniesz ewentualne pozostałości testosteronu. Czy to nie jest możliwe? Noś wtedy podczas kontaktu ubranie, które zakrywa leczone skórę, takie jak koszula lub T-shirt.

Pacjenci stosujący ten lek i przebywający blisko dzieci muszą być szczególnie ostrożni. Testosteron może przenikać przez ubranie. Czy masz bezpośredni kontakt skórny z dziećmi? Zawsze przestrzegaj zasad dotyczących stosowania tego leku (patrz punkt 3 tej ulotki). Zakryj leczone skórę czystym ubraniem, gdy żel wyschnie. Umyj także leczone skórę mydłem po upływie co najmniej 1 godziny, zgodnie z zaleceniami. Następnie ponownie zakryj skórę czystym ubraniem przed kontaktem fizycznym z dziećmi.

Jeśli uważasz, że inna osoba (mężczyzna, kobieta lub dziecko) miała kontakt z testosteronem, ta osoba powinna:

- natychmiast umyć skórę, która miała kontakt z tym lekiem, mydłem i wodą
- skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy takie jak trądzik, zmiana wzrostu włosów na twarzy lub ciele, obniżenie głosu lub inne zmiany w cyklu miesięcznym.
- zwrócić uwagę, czy u dzieci pojawiają się objawy takie jak wczesne dojrzewanie lub powiększenie penisa lub pochwy.

Po nałożeniu żelu najlepiej odczekać co najmniej 1 godzinę przed kąpielą lub prysznicem.

Czy używasz innych leków?

Czy używasz innych leków oprócz Testogel 16,2 mg/g, czy używałeś ich ostatnio lub zamierzasz je wkrótce stosować? Powiedz o tym swojemu lekarzowi lub farmaceucie, zwłaszcza o następujących lekach:

doustne antykoagulanty (leki przeciwzakrzepowe przyjmowane doustnie)
hormony kory nadnerczy (kortykosteroidy, leki łagodzące stany zapalne i reakcje alergiczne)
insulina (leki do kontrolowania poziomu cukru we krwi). Może być konieczne zmniejszenie dawki insuliny podczas stosowania tego leku.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy Ciebie (lub nie jesteś pewien), skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem tego leku.

Zwłaszcza te leki mogą wymagać dostosowania dawki tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i płodność Ten lek nie powinien być stosowany przez kobiety.

Produkcja plemników może być odwracalnie zahamowana przez stosowanie tego leku.

Czy Twoja partnerka jest w ciąży? W takim przypadku należy postępować zgodnie z zaleceniami, jak unikać kontaktu innych osób z żelem testosteronowym.

Kobiety w ciąży powinny unikać wszelkiego kontaktu z obszarami, na które nałożono ten lek. Ten lek może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka, ponieważ mogą się pojawić męskie cechy. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu ze skórą, należy jak najszybciej dokładnie umyć obszar kontaktu mydłem i wodą.

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn

Ten lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.

Ten lek zawiera alkohol (etanol)

Ten lek zawiera 0,9 g alkoholu (etanolu) w każdej dawce 1,25 g żelu.

Może powodować uczucie pieczenia na uszkodzonej skórze.

Ten produkt jest łatwopalny, dopóki nie wyschnie. Dlatego zachowaj ostrożność w pobliżu ciepła i ognia podczas używania tego leku.

3. Jak stosować ten lek?

Ten lek może być stosowany wyłącznie przez dorosłych mężczyzn.

Zawsze stosuj ten lek dokładnie tak, jak zalecił ci lekarz. Masz wątpliwości co do prawidłowego stosowania? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pierwsze użycie pompki

Przed pierwszym użyciem nowej pompki należy ją przygotować w następujący sposób.

Usuń nakrętkę z pojemnika, aby tłok stał się widoczny.

Naciśnij tłok trzykrotnie.

Żel, który wydostanie się przy pierwszym trzykrotnym naciśnięciu, nie powinien być używany. Ta dawka musi zostać bezpiecznie wyrzucona.

Twoja pompka jest teraz gotowa do użycia. Nie musisz jej ponownie przygotowywać. Za każdym razem, gdy tłok jest wciśnięty, dostarczane jest 1,25 g żelu.

Zalecana ilość to 2 naciśnięcia pompki raz dziennie o mniej więcej tej samej porze, najlepiej rano. Dawkę może dostosować lekarz, ale nie powinna przekraczać 4 naciśnięć pompki dziennie.

Lekarz poinformuje Cię, jak często należy naciskać tłok, aby uzyskać odpowiednią dla Ciebie dawkę żelu. Poniższa tabela zawiera więcej informacji na ten temat.

Liczba naciśnięć	Ilość żelu (g)	Ilość testosteronu nałożona na skórę (mg)
1	1,25	20,25
2	2,5	40,5
3	3,75	60,75
4	5,0	81,0

Żel należy ostrożnie rozprowadzić cienką warstwą na czystej, suchej i zdrowej skórze obu ramion i górnej części ramion. Nie wcierać żelu w skórę. Pozwól żelowi wyschnąć przez co najmniej 3-5 minut przed ubraniem się. Umyj ręce wodą i mydłem po nałożeniu żelu.

Nie nakładaj żelu na narządy płciowe (penis i jądra), ponieważ wysokie stężenie alkoholu może powodować miejscowe podrażnienia.

Czy napełniłeś pompę zgodnie z powyższymi instrukcjami? W takim razie żel jest gotowy do użycia.

Jak nakładać żel?

Pacjent powinien samodzielnie nałożyć żel.

1. Naciśnij tłok raz, aby nałożyć żel na dłoń.
2. Wybierz czystą, suchą i zdrową strefę skóry na ramieniu i górnej części ramienia (zobacz zaznaczone obszary na zdjęciu poniżej).
3. Rozprowadź żel palcami delikatnie i równomiernie na ramieniu i górnej części ramienia. Wcieraj go nie w skórę.
4. Używasz 2 pompek? Powtórz kroki 1, 2 i 3 na drugim ramieniu i górnej części ramienia.
5. Jeśli używasz 3 lub więcej pompek, nałóż maksymalnie 2 pompki na pierwsze ramię i górną część ramienia oraz maksymalnie 2 pompki na drugie ramię i górną część ramienia.
6. Umyj ręce wodą i mydłem po nałożeniu żelu.
7. Pozwól żelowi całkowicie wyschnąć przed ubraniem się.

Nie nakładaj na narządy płciowe (penis i jądra), ponieważ wysokie stężenie alkoholu może powodować miejscowe podrażnienia.

Pacjenci powinni wiedzieć, że inne osoby (dorosły lub dziecko) nie powinny mieć kontaktu z częścią ciała, na którą nałożono żel.

Zakryj skórę, na którą nałożono żel, czystym ubraniem (np. T-shirtem) po wyschnięciu żelu. Umyj skórę, na którą nałożono żel, wodą i mydłem przed kontaktem fizycznym z inną osobą (dorosłym lub dzieckiem). Zrób to po upływie przepisowego czasu co najmniej 1 godziny. Następnie ponownie przykryj skórę czystą odzieżą.

Żel powinien być nakładany przez pacjenta na czystą, suchą, zdrową skórę obu ramion lub obu rąk.

Czy użyłeś zbyt dużo tego leku?

Zapytaj swojego lekarza lub farmaceutę o radę.

Możesz otrzymać zalecenie, aby natychmiast umyć miejsce aplikacji, a lekarz może doradzić przerwanie leczenia.

Następujące objawy mogą wskazywać, że używasz zbyt dużo produktu i powinieneś skontaktować się z lekarzem:

- szybko zły lub poirytowany być
- nerwowość
- przyrost masy ciała
- częste lub długotrwałe erekcje

Te objawy mogą oznaczać, że dawka tego leku jest zbyt wysoka i lekarz powinien dostosować dawkę (patrz punkt 2: Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?).

Czy zapomniałeś użyć tego leku?

Nie stosuj podwójnej dawki, aby uzupełnić pominiętą dawkę. Nałóż następną dawkę o zwykłej porze.

Jeśli przestaniesz stosować ten lek
Nie należy przerywać leczenia tym lekiem, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Masz inne pytania dotyczące stosowania tego leku? Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane. Nie u każdego one wystąpią.
Ten lek może powodować następujące działania niepożądane:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 użytkowników)

- problemy z twoimi emocjami
- emocjonalne dolegliwości. Na przykład problemy z nastrojem, problemy z emocjami (zaburzenia nastroju), złość, agresja, niecierpliwość, problemy ze snem, dziwne sny lub zwiększone libido).
- zawroty głowy być
- uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezje)
- pogorszenie pamięci (amnezja)
- nadwrażliwość na dotyk (hiperestezja)
- ból głowy
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie)
- biegunka
- wypadanie włosów (łysienie)
- wysypka na skórze z różowymi guzkami i silnym swędzeniem (pokrzywka)
- obrzęk piersi u mężczyzn. Lub jednej piersi (ginekomastia).
- dolegliwości w miejscu aplikacji
- zmiany w wynikach badań krwi. Na przykład zbyt wiele czerwonych krwinek we krwi (polycytemia) lub tłuszczów we krwi (lipidy).
- więcej hematokrytu. Hematokryt to liczba pokazująca, ile czerwonych krwinek znajduje się we krwi.
- więcej hemoglobiny. To białko w czerwonych krwinkach. To białko transportuje tlen przez ciało.
- więcej czerwone krwinki

Czasami (występują u mniej niż 1 na 100 użytkowników)

- ciężkie wysokie ciśnienie krwi
- uderzenia gorąca
- zapalenie żyły (zapalenie żył)
- ból w ustach
- grubszy puchnięty brzuch
- pryszczki (trądzik)
- masz więcej włosów niż normalnie (hirsutyzm). Tylko kobiety mogą to mieć.
- wysypka
- sucha skóra
- wyprysk z tłustą i łuszczącą się skórą (łojotok)
- rany na skórze
- swędząca wysypka na skórze (kontaktowe zapalenie skóry)
- zmiany w twoim kolorze włosów

wrażliwy reagować przy nakładaniu nakładanie
swędzenie w miejscu nakładania
problem ze brodawka sutkowa
problemy z prostatą. Prostate znajduje się u mężczyzn pod pęcherzem moczowym i
dodaje płyn do plemników.
ból w najądrzu. Najądrze leży przy jądrze w mosznie.
częstsze wzwody (erekcje)
płyn w skórze, gdzie widać dołeczki po naciśnięciu (obrzęk ciastowaty)
podwyższone PSA. Jest to substancja we krwi, która pokazuje, czy są problemy z
prostatą.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1.000 użytkowników)

- penis pozostaje bardzo długo sztywny i to boli (priapizm)
- rak wątroby

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10.000 użytkowników)

- żółtaczka. Skóra i białka oczu stają się żółte.
- zaparcie w drogach moczowych

Nieznane (nie można określić na podstawie dostępnych danych)

- rak prostaty
- jesteś bardzo zmęczony i masz mało energii (astenia)
- nerwowo są
- depresja
- zły i agresywny są
- twoje oddychanie zatrzymuje się na krótko podczas snu (bezdech senny)
- zaparcie w drogach moczowych
- skurcze mięśni
- mieć więcej lub mniej ochoty na seks
- zmniejszenie się jąder. Dzieje się tak, ponieważ leczenie wysokimi dawkami testosteronu zazwyczaj tymczasowo zatrzymuje lub zmniejsza produkcję nasienia.
- czujesz się chory lub źle się czujesz (złe samopoczucie)
- płyn zatrzymywanie (obrzęk)
- alergiczne reakcje
- cięższy stać się
- zmiany w soli w organizmie. Twoje ciało może wtedy zatrzymywać sód, chlorek, potas, wapń, nieorganiczny fosforan i wodę. Dzieje się to przy wysokiej dawce i/lub długotrwałym leczeniu.
- podrażnienie skóry i sucha skóra przy częstym stosowaniu tego leku (ponieważ zawiera alkohol)
- częściej płyn zatrzymywać i obrzęk

Ten lek zawiera alkohol. Przy częstym stosowaniu może powodować podrażnienie skóry i suchą skórę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią działania niepożądane, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dotyczy to również działań niepożądanych, które nie są wymienione w tej ulotce. Możesz również

zgłaszać działania niepożądane za pośrednictwem Holenderskiego Centrum Działań Niepożądanych Lareb Strona internetowa: www.lareb.nl. Zgłaszając działania niepożądane, pomagasz nam uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

5. Jak przechowywać ten lek?

Dla tego leku nie ma specjalnych warunków przechowywania.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Termin ważności znajduje się na etykiecie po EXP. Podana jest tam miesiąc i rok. Ostatni dzień tego miesiąca jest terminem ważności.

Nie wylewaj leków do zlewu ani toalety i nie wyrzucaj ich do kosza. Zapytaj farmaceutę, co zrobić z lekami, których już nie używasz. Prawidłowe usuwanie leków zapewnia ich właściwe zniszczenie i zapobiega przedostawaniu się do środowiska.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Jakie substancje znajdują się w tym leku?

Substancją czynną w tym leku jest testosteron.

Inne substancje w tym leku to karbomer 980, izopropylomirystynian, 96% etanol, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda ten lek i co zawiera opakowanie?

Testogel 16,2 mg/g to bezbarwny żel dostarczany w pompce żelowej z wieloma dawkami, wyposażonej w pompkę dozującą, zawierający 88 g żelu i dostarczający minimum 60 dawek.

Ten lek jest dostępny w pudełkach z jednym, dwoma, trzema lub sześcioma opakowaniami.

Może się zdarzyć, że nie wszystkie wielkości opakowań są wprowadzane na rynek.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i producent

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Besins Healthcare Netherlands BV

Servaasbolwerk 14

3512 NK Utrecht

Holandia

Producenci

Laboratoires Besins International

13, rue Périer

92120 Montrouge

Francja

of

Besins Manufacturing Belgium
Groot-Bijgaardenstraat 128
1620 - Drogenbos
Belgia

Zarejestrowany pod numerem:
RVG 126594

Ten lek jest zarejestrowany w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Dania: Testogel

Cypr: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Grecja: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Finlandia: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Islandia: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Malta: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Norwegia: Testogel 16.2 mg/g żel transdermalny

Szwecja: Testogel

Ta ulotka została zatwierdzona w październiku 2024