

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tetracycline HCl CF 250 mg, kõvakapslid

tetratsükliinvesinikkloriid

Lugege hoolikalt kogu infoleht enne selle ravimi kasutamist, sest see sisaldab teile olulist teavet.

- Hoidke see infoleht alles. Võib-olla vajate seda hiljem uuesti.
- Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust oma arsti või apteekriga.
- Ärge andke seda ravimit teistele, sest see on määratud ainult teile. See võib olla teistele kahjulik, isegi kui neil on samad sümptomid kui teil.
- Kas teil tekib mõni kõrvaltoime, mis on loetletud jaotises 4? Või tekib teil kõrvaltoime, mida selles infolehes ei ole mainitud? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Selle infolehe sisu

1. Mis on Tetracycline HCl CF 250 mg ja milleks seda ravimit kasutatakse?
2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?
3. Kuidas seda ravimit kasutada?
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas seda ravimit säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on Tetracycline HCl CF 250 mg ja milleks seda ravimit kasutatakse?

Tetratsükliin kuulub antibakteriaalsete ravimite rühma, mis pidurdavad teatud bakteritüüpide kasvu.

Tetratsükliin HCl CF 250 mg kasutatakse põletike korral, mida põhjustavad tetratsükliini suhtes tundlikud bakterid, nagu:

hingamisteede põletik
kuseteede põletik
nahapõletik
kurgu-, nina- ja kõrvapõletik
silmapõletik
soolepõletik
suguelundite põletik

2. Millal ei tohi te seda ravimit kasutada või peate olema eriti ettevaatlik?

Millal ei tohi te seda ravimit kasutada?

Te olete allergiline mõne selle ravimi koostisosa suhtes. Neid aineid leiate selle infolehe jaotisest 6.

Te olete rase.

Te toidate last rinnaga.

Teil on kombineeritud raske neeru- ja maksafunktsiooni langus.

Teil on rasked maksafunktsiooni häired.
Teil on rasked neerufunktsiooni häired.
Alla 8-aastastel lastel, kuna hammaste värvimuutuse oht on suur.

Millal peate olema selle ravimiga eriti ettevaatlik?
Võtke ühendust oma arsti või apteekriga enne selle ravimi kasutamist.

Raske kõhulahtisuse ja palaviku korral ravi ajal. Tuleb arvestada jämesoole limaskestast põletiku või peensoole stafülokoki infektsiooniga. Ravi tuleb kohe lõpetada.
Verehüübimishäirete korral. Tetratsükliin võib mõjutada vere hüübimist ja seetõttu tuleb seda ravimit kasutada ettevaatlikult.
Kerge kuni mõõduka neerufunktsiooni häire korral tohib ravimit kasutada ainult arsti järelevalve all.
Koos kasutamisel teiste maksale kahjulike ainetega.
Maksafunktsiooni häire korral (kasutada ainult arsti järelevalve all).
Otsese päikesevalguse või ultravioletvalguse käes viibides tuleb olla ettevaatlik ja ravi esimeste nahalööbe tunnuste ilmnemisel kohe lõpetada.
Nagu teiste antibiootikumide puhul, võivad tekkida infektsioonid, mida põhjustavad mitte tundlikud mikroorganismid.

Kas te kasutate veel teisi ravimeid?
Kas te kasutate lisaks Tetracycline HCl CF 250 mg-le veel teisi ravimeid, olete seda hiljuti teinud või kavatsete seda peagi teha? Rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Tetratsükliini toimet nõrgendavad samaaegne manustamine maohapet neutraliseerivate ravimitega, piimatoodetega või rauapreparaatidega. Seetõttu tuleks nende ainete samaaegset manustamist vältida.
Aktiivsüsi ja ioonivahetajad vähendavad tetratsükliini imendumist verre.
Tetratsükliin tugevdab antikoagulantide toimet; antikoagulantide annuse kohandamine võib olla vajalik.
Tetratsükliin võib vähendada bakteritsiidsete ainete, nagu penitsilliinide, toimet, seetõttu ei tohi neid aineid samaaegselt kasutada.

Millele peate tähelepanu pöörama söögi ja joogiga?
Kapsleid ei tohi võtta koos piimatoodetega. Kapslid tuleb alla neelata tervelt, istuvas või seisvas asendis, 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki koos klaasi veega. Seedetrakti kaebuste korral on soovitatav kapsleid võtta söögi ajal. Vaadake "3. Kuidas seda ravimit kasutada?", jaotises "Manustamisviis".

Rasedus ja imetamine
Kas olete rase, arvate end olevat rase, soovite rasestuda või toidate last rinnaga? Võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Inimeste vaatlused on näidanud, et tetratsükliinid on lootele kahjulikud, kuna need aeglustavad luude moodustumist; seetõttu muutuvad luud hapramaks ja hammaste arengut mõjutatakse ebasoodsalt, samuti võib emal tekkida maksakahjustus. Mitte kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Tetratsükliin eritub rinnapiima.
Ärge kasutage imetamise ajal.

Sõiduvõime ja masinate kasutamine

Praeguseks ei ole teada andmeid tetratsükliini mõju kohta sõiduvõimele ja reaktsioonivõimele. Kui esineb peeringlust, ähmast nägemist või kahelinägemist, on soovitatav hoiduda sõidukite ja masinate juhtimisest.

Tetratsükliin HCl CF 250 mg sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) kapsli kohta, mis tähendab, et see on sisuliselt 'naatriumivaba'.

3. Kuidas seda ravimit kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile öelnud. Kas teil on kahtlusi õige kasutamise osas? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Soovitatav annus on: 250 mg iga kuue tunni järel, maksimaalselt 2 g päevas.

Komplitseerimata gonorröa korral: 500 mg iga kuue tunni järel, 5 päeva jooksul.

Kuseteede infektsioonide korral, mida põhjustavad muud bakterid kui gonokokid: 500 mg iga kuue tunni järel 7 päeva jooksul.

Kasutamine lastel alates 8. eluaastast

Soovitatav annus on: 20 - 40 mg/kg kehakaalu kohta päevas 4 annusena.

Haiguse sümptomid kaovad tavaliselt mõne päeva jooksul, kuid kuur tuleb täielikult lõpetada. Streptokokkide infektsiooni tuleb ravida vähemalt 10 päeva. Annuste kasutamine, mis on suuremad kui 500 mg, ei ole mõttekas.

Eakad

Eakatel tuleb kasutada väiksemat annust.

Neerude või maksa talitlushäire korral

Neerude või maksa talitlushäirete korral tuleb kasutada väiksemat annust.

Manustamisviis

Et vältida kapslite kleepumist söögitorusse, mis võib põhjustada ärritust või isegi söögitoru kahjustusi, tuleb kapslid tervelt, 1 tund enne või 2 tundi pärast sööki, koos klaasi veega istuvas või seisvas asendis sisse võtta.

Pärast kapslite võtmist ei tohi kohe pikali heita. Seedetrakti kaebuste korral on soovitatav kapsleid võtta söögi ajal.

Kapsleid ei tohi võtta koos piimatoodetega. Võtmine ühtlaselt päeva peale jaotada.

Kui märkate või arvate, et tetratsükliin toimib liiga tugevalt või liiga nõrgalt, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kas olete seda ravimit liiga palju kasutanud?

Kui olete võtnud liiga palju Tetracycline HCl CF 250 mg, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Üleannustamise kõige silmatorkavamad sümptomid on: oksendamine, palavikuhood, kollatõbi, verevalumid, must väljaheide, vere hüübimisaja pikenemine. Kui kahtlustate või märkate üleannustamist, peate võimalikult kiiresti arsti hoiatama. Näidake talle pakendit või patsiendi infolehte. Ta saab teid siis õigesti edasi ravida.

Kas olete unustanud seda ravimit kasutada?

Kui olete unustanud oma kapslit võtta ja aeg pole liiga kaua möödas, peate kapsli siiski võtma. Kui aeg on juba mitu tundi möödas, on parem oodata järgmise ajani, mil peate kapsli võtma, ja seejärel jätkata kuuri vastavalt ettekirjutusele.

Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha.

Kas teil on veel küsimusi selle ravimi kasutamise kohta? Võtke siis ühendust oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu iga ravim, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid. Mitte kõigil ei pruugi neid esineda. Allpool nimetatud kõrvaltoimete sagedus ei ole teada (ei saa olemasolevate andmete põhjal kindlaks määrata).

Vere- ja lümfisüsteemi häired:

Trombotsütopeenia, millega kaasnevad verevalumid ja veritsustendents, neutropeenia, millega kaasneb suurenenud tundlikkus infektsioonide suhtes.

Immuunsüsteemi häired:

On teatatud allergilistest reaktsioonidest, mille võimalikud sümptomid on äkiline vedeliku kogunemine nahas ja limaskestades, hingamisraskused ja/või sügelus ja nahalööve ning verevalumid.

Närvisüsteemi häired:

Peavalu, iiveldus, kõrvade kohin, pearinglus ja ähmane või kahekordne nägemine koljusisese rõhu tõusu tõttu on üksikjuhtudel täheldatud vanematel lastel ja täiskasvanutel.

Südamehaigused:

Südamepauna põletik (perikardiit).

Seedetrakti haigused:

Seedetrakti kaebused (nt isutus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus); keelepõletik; suu limaskesta põletik; sügelus päraku piirkonnas; teatud neelamishäire (düsfaagia); peensoole ja jämesoole limaskesta põletik (enterokoliit); teatud jämesoole põletik (pseudomembranoosne koliit); põletikud (inflamatoorsed kahjustused) päraku ja/või suguelundite ümbruses; ja must keel.

Söögitoru põletik ja söögitoru haavandid on teatatud pärast tetratsükliini suukaudset manustamist, kui ravimit võetakse lamades ja/või ebapiisava vedelikuga.

Maksahaigused ja sapiteede häired:

Maksakahjustused, mõnikord koos kõhunäärmepõletikuga, millega kaasneb tugev valu ülakõhus, mis kiirgub selga, iiveldus ja oksendamine (pankreatiit) pikaajalisel kasutamisel või maksa- või neerufunktsiooni häirete korral.

Naha- ja nahaaluskoe haigused:

Nahalööve; naha ülitundlikkus päikesevalguse ja UV-kiirguse suhtes; nahalööve tugeva sügeluse ja punnide tekkega (urtikaaria), teatud nahapõletik koos ketenduse ja/või juuste väljalangemisega (eksfoliatiivne dermatiit), nahakahjustus, mis tekib ülitundlikkusest teatud ravimi suhtes ja mida iseloomustab teravalt piiritletud, paksenenud, punane laik, mõnikord villidega (fikseeritud ravimi lööve).

Lihaskoe ja sidekoe haigused ning luude kõrvalekalded:

Kasvav luu ja hammaste areng on ebasoodsalt mõjutatud (luud muutuvad hapramaks ja hambad värvuvad).

Neeru- ja kuseteede haigused:

Uurea taseme tõus veres ja lämmastikuühendite tõus veres neerufunktsiooni häiretega patsientidel, mille võimalikeks sümptomiteks on üldine nõrkus, loidus, halb enesetunne ja iiveldus.

Üldised häired ja manustamiskoha häired:

Pikaajalise ravi korral võib tekkida B-vitamiini puudus.

5. Kõrvaltoimete teatamine

Kui teil tekivad kõrvaltoimed, võtke ühendust oma arsti või apteekriga. See kehtib ka võimalike kõrvaltoimete kohta, mida selles infolehes ei ole mainitud. Kõrvaltoimetest saate teatada ka otse Hollandi kõrvaltoimete keskusele Lareb, veebisait www.lareb.nl. Kõrvaltoimetest teatades aitate meil saada rohkem teavet selle ravimi ohutuse kohta.

Kuidas seda ravimit säilitada?

Säilitada originaalpakendis, temperatuuril alla 25 °C.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. See on pakendil märgitud pärast "Mitte kasutada pärast:" või "EXP". Seal on märgitud kuu ja aasta. Selle kuu viimane päev on kõlblikkusaja lõpp.

Ärge visake ravimeid kraanikaussi või tualetti ega prügikasti. Küsige oma apteekrilt, mida teha ravimitega, mida te enam ei kasuta. Kui te hävitate ravimeid õigesti, hävitatakse need õigel viisil ja need ei satu keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Millised ained on selles ravimis?

Selle ravimi toimeaine on tetratsükliinvesinikkloriid. Iga kapsel sisaldab 250 mg tetratsükliinvesinikkloriidi.

Selle ravimi muud ained on naatriumkarboksümetüültaärlis, magneesiumstearaat (E572), želatiin (E441), kinoliinkollane (E104), erütrosiin (E127), titaandioksiid (E171).

Kuidas Tetracycline HCl CF 250 mg välja näeb ja mis on pakendis? Kapslid on kollased ja täidetud kollase pulbriga.

Tetracycline HCl CF 250 mg on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 või rohkem 10 kapsliga blisterpakendit ja konteinerites, mis sisaldavad 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 või 2500 kapslit.

Kõiki pakendi suurusi ei pruugita turustada.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Holland

Tootja:

Centrafarm Services B.V.

Van de Reijtstraat 31-E

4814 NE Breda

Holland

Tiofarma B.V.

Hermanus Boerhaavestraat 1

3261 ME Oud-Beijerland

Holland

Registrisse kantud all

RVG 53163, Tetratsükliin HCl CF 250 mg, kõvakapslid

Seda pakendi infolehte on viimati kinnitatud novembris 2025.