

Notice : information pour l'utilisateur

Tétracycline HCl CF 250 mg, capsules dures

tétracycline hydrochloride

Lisez attentivement toute la notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Avez-vous des questions ? Contactez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, car il vous a été prescrit uniquement. Cela pourrait être nocif pour d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous.
- Ressentez-vous un des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4 ? Ou ressentez-vous un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Tétracycline HCl CF 250 mg et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?
2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?
3. Comment utiliser ce médicament ?
4. Effets indésirables possibles
5. Comment conserver ce médicament ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Tétracycline HCl CF 250 mg et dans quel cas ce médicament est-il utilisé ?

La tétracycline appartient au groupe des médicaments antibactériens qui inhibent la croissance de certains types de bactéries.

Tétracycline HCl CF 250 mg est utilisé pour les inflammations causées par des bactéries sensibles à la tétracycline telles que :

- inflammation des voies respiratoires
- inflammation des voies urinaires
- inflammation de la peau
- inflammation de la gorge, du nez et des oreilles
- inflammation des yeux
- inflammation des intestins
- inflammation des organes génitaux

2. Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ou devez-vous être particulièrement prudent ?

Quand ne devez-vous pas utiliser ce médicament ?

Vous êtes allergique à l'une des substances contenues dans ce médicament. Vous trouverez ces substances à la rubrique 6 de cette notice.
Vous êtes enceinte.
Vous allaitez.
Vous souffrez d'une insuffisance rénale et hépatique combinée sévère.
Vous avez des troubles sévères de la fonction hépatique.
Vous avez des troubles sévères de la fonction rénale.
Chez les enfants de moins de 8 ans, car le risque de décoloration des dents est élevé.

Quand devez-vous être particulièrement prudent avec ce médicament ?
Contactez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

En cas de diarrhée sévère avec fièvre pendant le traitement. Il faut alors envisager une inflammation de la muqueuse du côlon ou une infection à staphylocoques de l'intestin grêle. Le traitement doit être immédiatement interrompu.
En cas de troubles de la coagulation sanguine. La tétracycline peut affecter la coagulation sanguine et doit donc être utilisée avec prudence.
En cas de fonction rénale légèrement à modérément réduite, le médicament ne doit être utilisé que sous la supervision d'un médecin.
En cas d'utilisation avec d'autres substances nocives pour le foie.
En cas de fonction hépatique réduite (à utiliser uniquement sous la supervision d'un médecin).
En cas d'exposition à la lumière directe du soleil ou aux rayons ultraviolets, il faut être prêt à arrêter immédiatement le traitement dès les premiers signes d'éruption cutanée. Comme avec d'autres antibiotiques, des infections par des micro-organismes non sensibles peuvent survenir.

Prenez-vous d'autres médicaments?

Prenez-vous d'autres médicaments en plus de Tétracycline HCl CF 250 mg, l'avez-vous fait récemment ou allez-vous le faire bientôt? Informez-en votre médecin ou votre pharmacien.

L'effet de la tétracycline est affaibli par la prise simultanée de médicaments antiacides, de produits laitiers ou de préparations de fer. La prise simultanée de ces substances doit donc être évitée.

Le charbon actif et les échangeurs d'ions réduisent l'absorption de la tétracycline dans le sang.

L'effet des anticoagulants est renforcé par la tétracycline; un ajustement de la posologie des anticoagulants peut être nécessaire.

La tétracycline peut contrecarrer l'effet des agents bactéricides tels que les pénicillines, c'est pourquoi ces agents ne doivent pas être utilisés simultanément.

À quoi devez-vous faire attention avec la nourriture et les boissons?

Les capsules ne doivent pas être prises avec des produits laitiers. Avalez les capsules entières, en position assise ou debout, 1 heure avant ou 2 heures après le repas avec un verre d'eau. En cas de troubles gastro-intestinaux, il est conseillé de prendre les capsules pendant le repas. Voir «3. Comment utiliser ce médicament?», sous «Mode d'administration».

Grossesse et allaitement

Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, souhaitez-vous le devenir ou allaitez-vous?
Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Grossesse

Des observations chez l'homme ont montré que les tétracyclines sont nocives pour le fœtus, car elles retardent la formation des os; cela rend les os plus fragiles et affecte défavorablement le développement dentaire, de plus, des lésions hépatiques peuvent survenir chez la mère. Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Allaitement

La tétracycline passe dans le lait maternel.

Ne pas utiliser pendant l'allaitement.

Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Il n'existe pas de données connues à ce jour concernant l'influence de la tétracycline sur l'aptitude à conduire et la réactivité. En cas de survenue de vertiges, de vision floue ou de vision double, il est déconseillé de conduire des véhicules et d'utiliser des machines.

Tétracycline HCl CF 250 mg contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par capsule, c'est-à-dire qu'il est essentiellement 'sans sodium'.

3. Comment utiliser ce médicament ?

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a indiqué. Vous avez des doutes sur l'utilisation correcte ? Contactez votre médecin ou pharmacien.

Adultes

La posologie recommandée est : 250 mg toutes les six heures, maximum 2 g par jour.

Pour la gonorrhée non compliquée : 500 mg toutes les six heures, pendant 5 jours.

Pour les infections urinaires causées par d'autres bactéries que les gonocoques : 500 mg toutes les six heures pendant 7 jours.

Utilisation chez les enfants à partir de 8 ans

La posologie recommandée est : 20 - 40 mg/kg de poids corporel par jour en 4 doses.

Les symptômes de la maladie disparaissent généralement en quelques jours, néanmoins, terminez le traitement complet.

Une infection à streptocoques doit être traitée pendant au moins 10 jours. L'utilisation de doses supérieures à 500 mg n'est pas utile.

Personnes âgées

Chez les personnes âgées, une posologie plus faible doit être utilisée.

En cas de fonction rénale ou hépatique réduite

En cas de fonction rénale ou hépatique réduite, une posologie plus faible doit être utilisée.

Mode d'administration

Pour éviter que les capsules ne restent coincées dans l'œsophage, ce qui peut entraîner une irritation ou même des lésions œsophagiennes, les capsules doivent être prises entières, 1 heure avant ou 2 heures après le repas, avec un verre d'eau en position assise ou debout. Ne vous allongez pas immédiatement après avoir pris les capsules. En cas de troubles gastro-intestinaux, il est conseillé de prendre les capsules pendant le repas. Les capsules ne doivent pas être prises avec des produits laitiers. Répartir la prise uniformément sur la journée.

Si vous remarquez ou pensez que la tétracycline est trop forte ou, au contraire, trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Avez-vous utilisé trop de ce médicament ?

Si vous avez pris trop de Tetracycline HCl CF 250 mg, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les symptômes les plus marquants d'un surdosage sont : vomissements, accès de fièvre, jaunisse, ecchymoses, selles noires, temps de coagulation sanguine prolongé. Si vous soupçonnez ou constatez un surdosage, vous devez avertir un médecin dès que possible. Montrez-lui l'emballage ou la notice du patient. Il pourra alors vous traiter correctement.

Avez-vous oublié d'utiliser ce médicament ?

Si vous avez oublié de prendre votre capsule et que le moment n'est pas trop passé, vous devez prendre la capsule. Si le moment est déjà passé de quelques heures, il est préférable d'attendre le prochain moment où vous devez prendre une capsule et de continuer ensuite le traitement selon la prescription.

Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

Avez-vous d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament ? Contactez alors votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables possibles

Comme tout médicament, celui-ci peut avoir des effets indésirables. Tout le monde n'y est pas sujet. La fréquence des effets indésirables mentionnés ci-dessous n'est pas connue (ne peut être déterminée avec les données disponibles).

Affections hématologiques et du système lymphatique :

Un manque de plaquettes sanguines accompagné de bleus et de tendance aux saignements (thrombocytopenie), un manque de globules blancs accompagné d'une sensibilité accrue aux infections (neutropénie).

Affections du système immunitaire :

Des réactions allergiques ont été signalées avec comme symptômes possibles un gonflement soudain de la peau et des muqueuses, des difficultés respiratoires et/ou des démangeaisons et des éruptions cutanées, et des ecchymoses.

Affections du système nerveux :

Maux de tête, nausées, acouphènes, vertiges et vision floue ou double en raison d'une augmentation de la pression intracrânienne ont été observés dans de rares cas chez les enfants plus âgés et les adultes.

Affections cardiaques :
Inflammation du péricarde (péricardite).

Affections gastro-intestinales :
Troubles gastro-intestinaux (y compris perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhée) ;
inflammation de la langue ; inflammation de la muqueuse buccale ; démangeaisons anales ; un
certain trouble de la déglutition (dysphagie) ; inflammation de la muqueuse de l'intestin grêle
et du côlon (entérocolite) ; une certaine inflammation du côlon (colite pseudomembraneuse) ;
inflammations (lésions inflammatoires) autour de l'anus et/ou des organes génitaux ; et
langue noire.

Inflammation de l'œsophage et ulcères œsophagiens ont été signalés après administration
orale de tétracycline, lorsque le médicament est pris en position couchée et/ou avec une
quantité insuffisante de liquide.

Affections hépatiques et biliaires :
Lésions hépatiques, parfois accompagnées d'une pancréatite avec douleur intense dans le
haut de l'abdomen irradiant vers le dos, nausées et vomissements (pancréatite) en cas
d'utilisation prolongée ou de fonction hépatique ou rénale réduite.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané :
Éruption cutanée ; hypersensibilité de la peau à la lumière du soleil et aux UV ; éruption
cutanée avec démangeaisons intenses et formation de papules (urticaire), une certaine
dermatite avec desquamation et/ou perte de cheveux (dermatite exfoliative), lésion cutanée
due à une hypersensibilité à un certain médicament et caractérisée par une zone rouge,
épaissie, bien délimitée, parfois avec formation de bulles (éruption fixe médicamenteuse).

Affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif et anomalies osseuses :
Le développement des os en croissance et des dents est affecté négativement (les os
deviennent plus fragiles et les dents se décolorent).

Affections rénales et urinaires :
Augmentation du taux d'urée dans le sang et des composés azotés dans le sang chez les
patients avec une fonction rénale réduite, avec comme symptômes possibles, entre autres,
une faiblesse générale du corps, léthargie, malaise et nausées.

Affections générales et troubles au site d'administration :
Un déficit en vitamine B peut survenir lors d'un traitement prolongé.

5. La déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Cela
s'applique également aux effets indésirables possibles qui ne sont pas mentionnés dans cette
notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via le Centre
Néerlandais de Pharmacovigilance Lareb, site web www.lareb.nl. En signalant les effets
indésirables, vous nous aidez à obtenir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Comment conserver ce médicament ?

Conserver dans l'emballage d'origine, à une température inférieure à 25 °C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez plus ce médicament après la date de péremption. Elle est indiquée sur l'emballage après

« À utiliser avant : » ou « EXP ». Un mois et une année y sont indiqués. Le dernier jour de ce mois est la date de péremption.

Ne jetez pas les médicaments dans l'évier ou les toilettes et ne les mettez pas à la poubelle. Demandez à votre pharmacien ce que vous devez faire des médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous éliminez les médicaments correctement, ils seront détruits de manière appropriée et ne pollueront pas l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Quelles substances contient ce médicament ?

La substance active de ce médicament est le chlorhydrate de tétracycline. Chaque capsule contient 250 mg de chlorhydrate de tétracycline.

Les autres substances de ce médicament sont l'amidon carboxyméthyl sodique, le stéarate de magnésium (E572), la gélatine (E441), le jaune de quinoléine (E104), l'érythrosine (E127), le dioxyde de titane (E171).

À quoi ressemble Tetracycline HCl CF 250 mg et que contient un emballage ? Les capsules sont jaunes et remplies d'une poudre jaune.

Tetracycline HCl CF 250 mg est disponible en emballages contenant 1 ou plusieurs plaquettes de 10 capsules et en flacons de 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 ou 2500 capsules.

Toutes les tailles d'emballage ne sont pas commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation :

Centrafarm B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Pays-Bas

Fabricant :

Centrafarm Services B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Pays-Bas

Tiofarma B.V.
Hermanus Boerhaavestraat 1
3261 ME Oud-Beijerland

Pays-Bas

Enregistré sous

RVG 53163, Tétracycline HCl CF 250 mg, capsules dures

Cette notice a été approuvée pour la dernière fois en novembre 2025.

Transtoyou