

Bipacksedel: information för användaren

Tetracyklin HCl CF 250 mg, hårda kapslar

tetracyklinhydroklorid

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda detta läkemedel, eftersom den innehåller viktig information för dig.

- Spara denna bipacksedel. Du kanske behöver läsa den igen.
- Har du fler frågor? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.
- Ge inte detta läkemedel till andra, eftersom det är förskrivet endast till dig. Det kan vara skadligt för andra, även om de har samma symtom som du.
- Får du biverkningar som nämns i avsnitt 4? Eller får du en biverkning som inte nämns i denna bipacksedel? Kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

Innehåll i denna bipacksedel

1. Vad är Tetracyklin HCl CF 250 mg och vad används detta läkemedel för?
2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig?
3. Hur använder du detta läkemedel?
4. Möjliga biverkningar
5. Hur förvarar du detta läkemedel?
6. Förpackningens innehåll och övrig information

1. Vad är Tetracyklin HCl CF 250 mg och vad används detta läkemedel för?

Tetracyklin tillhör gruppen antibakteriella läkemedel som hämmar tillväxten av vissa typer av bakterier.

Tetracyklin HCl CF 250 mg används vid inflammationer orsakade av bakterier som är känsliga för tetracyklin såsom:

- inflammation i luftvägarna
- inflammation i urinvägarna
- hudinfektion
- hals-, näs- och öroninflammation
- ögoninflammation
- inflammation i tarmarna
- inflammation i könsorganen

2. När ska du inte använda detta läkemedel eller vara extra försiktig med det?

När ska du inte använda detta läkemedel?

- Du är allergisk mot någon av ingredienserna i detta läkemedel. Dessa ingredienser finns i avsnitt 6 i denna bipacksedel.
- Du är gravid.
- Du ammar.
- Du har en kombinerad kraftigt nedsatt njur- och leverfunktion.

Du har allvarliga leverfunktionsstörningar.
Du har allvarliga njurfunktionsstörningar.
Hos barn under 8 år, eftersom risken för missfärgning av tänderna är stor.

När ska du vara extra försiktig med detta läkemedel?
Kontakta din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

Vid svår diarré med feber under behandlingen. Man bör då överväga inflammation i tjocktarmens slemhinna eller stafylokockinfektion i tunntarmen. Behandlingen bör omedelbart avbrytas.
Vid blödningsrubbningsar. Tetracyklin kan påverka blodkoagulationen och därför bör detta läkemedel användas med försiktighet.
Vid lätt till måttligt nedsatt njurfunktion får läkemedlet endast användas under läkares övervakning.
Vid användning tillsammans med andra levertoxiska ämnen.
Vid nedsatt leverfunktion (använd endast under läkares övervakning).
Vid exponering för direkt solljus eller ultraviolett ljus bör man vara beredd att omedelbart avbryta behandlingen vid första tecken på hudutslag.
Liksom med andra antibiotika kan infektioner av icke-känsliga mikroorganismer uppstå.

Använder du andra läkemedel?
Använder du förutom Tetracyklin HCl CF 250 mg andra läkemedel, har du nyligen gjort det eller planerar du att göra det snart? Informera då din läkare eller apotekare.

Effekten av tetracyklin försvagas av samtidig intag av antacida, mjölkprodukter eller järnpreparat. Samtidigt intag med dessa medel bör därför undvikas.
Aktivt kol och jonbytare minskar upptaget av tetracyklin i blodet.
Effekten av antikoagulantia förstärks av tetracyklin; justering av doseringen av antikoagulantia kan vara nödvändig.
Tetracyklin kan motverka effekten av bakteriedödande medel såsom penicilliner, därför bör dessa medel inte användas samtidigt.

Vad bör du tänka på med mat och dryck?
Kapslarna får inte tas med mjölkprodukter. Ta kapslarna hela, i sittande eller stående ställning, 1 timme före eller 2 timmar efter måltid med ett glas vatten. Vid mag-tarmbesvär rekommenderas att ta kapslarna under måltid. Se "3. Hur använder du detta läkemedel?", under "Administreringsätt".

Graviditet och amning

Är du gravid, tror du att du är gravid, planerar du att bli gravid eller ammar du? Kontakta då din läkare eller apotekare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Observationer hos människor har visat att tetracykliner är skadliga för fostret, eftersom de fördröjer benbildningen; detta gör benen skörare och påverkar tandutvecklingen negativt, dessutom kan leverskada hos modern uppstå. Använd inte under graviditet.

Amning

Tetracyklin går över i bröstmjölken.
Använd inte under amningsperioden.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns hittills inga kända uppgifter om tetracyklins påverkan på körförmåga och reaktionsförmåga. Vid förekomst av yrsel, dimsyn eller dubbelseende avråds från att köra fordon och använda maskiner.

Tetracyklin HCl CF 250 mg innehåller natrium

Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, vilket innebär att den i huvudsak är 'natriumfri'.

3. Hur använder du denna medicin?

Använd alltid denna medicin exakt som din läkare eller apotekare har sagt till dig. Är du osäker på rätt användning? Kontakta då din läkare eller apotekare.

Vuxna

Den rekommenderade doseringen är: 250 mg var sjätte timme, högst 2 g per dag.

Vid okomplicerad gonorré: 500 mg var sjätte timme, under 5 dagar.

Vid urinvägsinfektion orsakad av andra bakterier än gonokocker: 500 mg var sjätte timme under 7 dagar.

Användning hos barn från 8 år

Den rekommenderade doseringen är: 20 - 40 mg/kg kroppsvikt per dag i 4 doser.

Symtomen försvinner vanligtvis inom några dagar, trots detta ska hela kuren fullföljas.

En infektion med streptokocker bör behandlas i minst 10 dagar. Användning av doser större än 500 mg är inte meningsfullt.

Äldre

Hos äldre bör en lägre dosering användas.

Vid nedsatt njur- eller leverfunktion

Vid nedsatt njur- eller leverfunktion bör en lägre dos användas.

Administreringssätt

För att förhindra att kapslar fastnar i matstrupen, vilket kan leda till irritation eller till och med skador på matstrupen, bör kapslarna tas hela, 1 timme före eller 2 timmar efter måltid, med ett glas vatten i sittande eller stående ställning.

Ligg inte ner omedelbart efter att ha tagit kapslarna. Vid mag-tarmsbesvär rekommenderas att ta kapslarna under måltid.

Kapslarna får inte tas med mjölkprodukter. Fördela intaget jämnt över dagen.

Om du märker eller tror att tetracyklin verkar för starkt, eller för svagt, kontakta din läkare eller apotekare.

Har du använt för mycket av denna medicin?

Om du har tagit för mycket Tetracyklin HCl CF 250 mg, kontakta omedelbart din läkare eller apotekare.

De mest framträdande symptomen på överdosering är: kräkningar, feberanfall, gulsot, blåmärken, svart avföring, förlängd blodkoagulationstid. Om du misstänker eller märker en överdosering, bör du så snart som möjligt varna en läkare. Visa honom förpackningen eller patientinformationen. Han kan då behandla dig på rätt sätt.

Har du glömt att använda denna medicin?

Om du har glömt att ta din kapsel och det inte har gått alltför lång tid, bör du ta kapseln ändå. Om det redan har gått några timmar, är det bättre att vänta till nästa tidpunkt då du ska ta en kapsel och sedan fortsätta behandlingen enligt föreskrift.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Har du fler frågor om användningen av denna medicin? Kontakta då din läkare eller apotekare.

4. Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel ha biverkningar. Alla drabbas inte av dem. För de biverkningar som nämns nedan är frekvensen inte känd (kan inte fastställas med tillgängliga data).

Blod- och lymfsystemrubbningar:

Brist på blodplättar åtföljt av blåmärken och blödningsbenägenhet (trombocytopeni), brist på vita blodkroppar åtföljt av ökad känslighet för infektioner (neutropeni).

Immunsystemrubbningar:

Allergiska reaktioner har rapporterats med möjliga symtom som plötslig vätskeansamling i hud och slemhinnor, andningssvårigheter och/eller klåda och hudutslag, samt blåmärken.

Nervsystemrubbningar:

Huvudvärk, illamående, tinnitus, yrsel och dimsyn eller dubbelseende på grund av ökat tryck i skallen har i enstaka fall observerats hos äldre barn och vuxna.

Hjärtsjukdomar:

Inflammation i hjärtsäcken (perikardit).

Mag-tarmsjukdomar:

Mag-tarmbesvär (bl.a. aptitlöshet, illamående, kräkningar, diarré); inflammation i tungan; inflammation i munslemhinnan; klåda vid anus; en viss sväljsvårighet (dysfagi); inflammation i slemhinnan i tunntarmen och tjocktarmen (enterokolit); en viss inflammation i tjocktarmen (pseudomembranös kolit); inflammationer (inflammatoriska lesioner) runt anus och/eller könsorganen; och svart tunga.

Inflammation i matstrupen och matstrupe sår har rapporterats efter oral administrering av tetracyklin, när läkemedlet tas liggande och/eller med otillräcklig vätska.

Lever- och gallvägssjukdomar:

Leverskador, ibland med pankreatit åtföljd av svår smärta i övre buken som strålar ut mot ryggen, illamående och kräkningar (pankreatit) vid långvarig användning eller vid nedsatt lever- eller njurfunktion.

Hud- och subkutana sjukdomar:

Hudutslag; överkänslighet i huden för solljus och UV-ljus; hudutslag med intensiv klåda och bildning av knölar (urtikaria), en viss hudinflammation med fjällning och/eller håravfall (exfoliativ dermatit), hudförändring som uppstår på grund av överkänslighet för ett visst läkemedel och kännetecknas av en skarpt avgränsad, förtjockad, röd fläck, ibland med blåsbildning (fixed-drug eruption).

Skelettmuskel- och bindvävssjukdomar och benavvikelser:
Växande ben och tandutveckling påverkas negativt (ben blir skörare och tänder missfärgas).

Njure- och urinvägssjukdomar:
Ökning av urea i blodet och kväveföreningar i blodet hos patienter med nedsatt njurfunktion med möjliga symtom som allmän kroppssvaghet, slöhet, illamående och allmän sjukdomskänsla.

Allmänna sjukdomar och störningar vid administreringsstället:
Vid långvarig behandling kan brist på vitamin B uppstå.

5. Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det svenska Läkemedelsverket, webbplats www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar hjälper du oss att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

Hur förvarar du denna medicin?

Förvara i originalförpackningen, under 25 °C.

Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte denna medicin efter utgångsdatumet. Det finns på förpackningen efter "Används före:" eller "EXP". Det står en månad och ett år. Den sista dagen i den månaden är utgångsdatumet.

Spola inte ner mediciner i avloppet eller toaletten och kasta dem inte i soporna. Fråga din apotekare vad du ska göra med mediciner du inte längre använder. Om du kasserar mediciner på rätt sätt förstörs de korrekt och hamnar inte i miljön.

6. Förpackningens innehåll och övrig information

Vilka ämnen finns i denna medicin?

Den aktiva substansen i denna medicin är tetracyclinhydroklorid. Varje kapsel innehåller 250 mg tetracyclinhydroklorid.

De andra ämnena i denna medicin är natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat (E572), gelatin (E441), kinolingult (E104), erytrosin (E127), titandioxid (E171).

Hur ser Tetracyklin HCl CF 250 mg ut och vad finns i en förpackning? Kapslarna är gula och fyllda med ett gult pulver.

Tetracyklin HCl CF 250 mg finns tillgänglig i förpackningar med 1 eller fler blisterförpackningar med 10 kapslar och i behållare med 30, 50, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 2500 kapslar.

Alla förpackningsstorlekar marknadsförs inte.

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare

Tillståndsinnehavare:

Centrafarm B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Nederländerna

Tillverkare:

Centrafarm Services B.V.
Van de Reijtstraat 31-E
4814 NE Breda
Nederländerna

Tiofarma B.V.
Hermanus Boerhaavestraat 1
3261 ME Oud-Beijerland
Nederländerna

Registrerad under
RVG 53163, Tetracyklin HCl CF 250 mg, hårda kapslar

Denna bipacksedel godkändes senast i november 2025.