

Packungsbeilage: Information für den Anwender

Ventolin Diskus 200 Mikrogramm/Dosis - Inhalationspulver, vordosiert

Salbutamol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie sie später nochmals lesen.
- Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Geben Sie dieses Arzneimittel nicht an andere weiter, da es nur Ihnen verschrieben wurde. Es kann anderen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Bekommen Sie eine der Nebenwirkungen, die in Abschnitt 4 aufgeführt sind? Oder bemerken Sie eine Nebenwirkung, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben ist? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage:

1. Was ist Ventolin Diskus 200 und wofür wird es angewendet?
2. Wann dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht anwenden oder müssen Sie besonders vorsichtig sein?
3. Wie ist dieses Arzneimittel anzuwenden?
4. Mögliche Nebenwirkungen
5. Wie ist dieses Arzneimittel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Ventolin Diskus und wofür wird es angewendet?

Ventolin Diskus 200 enthält den Wirkstoff Salbutamol. Salbutamol gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als kurzwirksame Bronchodilatoren bezeichnet werden (Wirkung dauert etwa 4-6 Stunden). Kurzwirksame Bronchodilatoren entspannen die Muskeln in den Wänden der kleinen Atemwege in der Lunge innerhalb weniger Minuten. Ventolin Diskus 200:

hilft, die Atemwege in der Lunge offen zu halten, wodurch das Ein- und Ausatmen erleichtert wird

lindert das Engegefühl in der Brust und reduziert Keuchen und Husten, die mit Asthma verbunden sind

Ventolin Diskus 200 wird verwendet, um Atemprobleme bei Menschen mit Asthma und ähnlichen Erkrankungen zu behandeln. Die Wirkung umfasst auch die Linderung und Vorbeugung von Asthmasymptomen durch Anstrengung (Belastungsasthma) und andere Faktoren, die Asthma fördern. Andere Faktoren umfassen Hausstaub, Pollen, Katzen, Hunde und Zigarettenrauch.

2. Wann dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht anwenden oder müssen besonders vorsichtig sein?

Wann dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht anwenden?

Sie sind allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels. Diese Stoffe finden Sie in Abschnitt 6.

→ Wenn Sie denken, dass dies auf Sie zutrifft, verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.

Wann müssen Sie besonders vorsichtig mit diesem Arzneimittel sein?

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. Bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden, muss Ihr Arzt Folgendes wissen:

ob Sie einen hohen Blutdruck haben

ob Sie eine überaktive Schilddrüse haben

ob Sie eine Vorgeschichte mit Herzproblemen haben, wie unregelmäßiger oder schneller Herzschlag oder Angina (Brustschmerzen)

ob Sie niedrige Kaliumwerte im Blut haben

ob Sie Xanthinderivate (wie Theophyllin) oder Steroide zur Behandlung von Asthma verwenden

ob Sie Entwässerungstabletten (Diuretika) verwenden. Diese werden manchmal zur Behandlung von hohem Blutdruck oder anderen Herzkrankheiten verwendet

→ Ihr Arzt wird Ihre Kaliumwerte messen, wenn Sie Xanthinderivate, Steroide oder Entwässerungstabletten verwenden.

→ Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie denken, dass einer dieser Punkte auf Sie zutrifft.

Ventolin Diskus sollte bei Bedarf anstelle von regelmäßig verwendet werden.

Wenn Ihr Asthma aktiv ist (Sie haben häufig Beschwerden oder Verschlimmerungen, wie Atemnot, die das Sprechen, Essen oder Schlafen erschwert, Husten, Keuchen, ein Druckgefühl in der Brust oder Ihre körperliche Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt), informieren Sie sofort Ihren Arzt. Möglicherweise wird Ihr Arzt Ihnen raten, mit einem Asthmakontrollmedikament zu beginnen oder die Anwendung zu erhöhen, wie z.B. ein inhalatives Kortikosteroid.

Ein zunehmender Gebrauch eines Bronchodilatators wie Salbutamol kann ein Zeichen für eine Verschlechterung Ihres Asthmas sein. Informieren Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt, wenn Ihr Medikament nicht mehr so gut zu wirken scheint wie üblich (zum Beispiel, wenn Sie mehr Inhalationen benötigen, um Ihre Atemprobleme zu lindern, oder wenn die Anwendung Ihres Inhalators weniger als 3 Stunden Linderung verschafft), da dies darauf hinweisen kann, dass sich Ihre Atemwegsbeschwerden verschlimmern und Sie möglicherweise ein anderes Medikament benötigen.

Wenn Sie Ventolin Diskus mehr als zweimal pro Woche zur Behandlung Ihrer Asthmabeschwerden verwenden, ohne die Vorbeugung von Belastungsasthma mitzuzählen, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Asthma nicht gut unter Kontrolle ist. Dies kann das Risiko schwerer Asthmaanfälle (Verschlimmerung des Asthmas) erhöhen, die schwerwiegende Folgen haben und lebensbedrohlich oder sogar tödlich sein können. Nehmen Sie so schnell

wie möglich Kontakt mit Ihrem Arzt auf, damit die Behandlung Ihres Asthmas erneut überprüft werden kann.

Verwenden Sie täglich ein Medikament gegen Entzündungen Ihrer Lungen, wie ein 'inhalatives Kortikosteroid'? Dann ist es wichtig, dass Sie dieses Medikament regelmäßig weiter verwenden, auch wenn Sie sich besser fühlen.

Berichte über Karies (Zahnverfall) wurden bei der Anwendung von Salbutamol gemeldet. Es wird empfohlen, insbesondere bei Kindern auf eine gute Mundhygiene und regelmäßige Zahnkontrollen zu achten.

Verwenden Sie noch andere Medikamente?

Verwenden Sie neben Ventolin Diskus 200 noch andere Medikamente, oder haben Sie dies kürzlich getan oder besteht die Möglichkeit, dass Sie in naher Zukunft andere Medikamente verwenden werden? Informieren Sie dann Ihren Arzt oder Apotheker.

Einige Medikamente können die Wirkung von Ventolin Diskus 200 beeinflussen oder es wahrscheinlicher machen, dass Sie Nebenwirkungen bekommen. Dazu gehören:

Betablocker (wie Propranolol, eine Gruppe von Medikamenten, die zur Behandlung von Bluthochdruck oder einer Herzerkrankung verwendet werden

→ Ihr Arzt oder Apotheker wird entscheiden, ob Sie Ventolin Diskus 200 mit diesen Medikamenten verwenden können.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fruchtbarkeit

Sind Sie schwanger, glauben Sie schwanger zu sein, möchten Sie schwanger werden oder stillen Sie? Nehmen Sie dann Kontakt mit Ihrem Arzt oder Apotheker auf, bevor Sie dieses Medikament verwenden. Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie Ventolin Diskus 200 während der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden können.

Fahrfähigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es ist unwahrscheinlich, dass Ventolin Diskus 200 die Fahrfähigkeit und das Bedienen von Maschinen beeinflusst.

Ventolin Diskus 200 enthält Laktose

Ventolin Diskus 200 enthält bis zu 40 Milligramm Laktose pro Dosis. Wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt auf, bevor Sie dieses Medikament verwenden.

Der Hilfsstoff Laktose enthält kleine Mengen an Milcheiweißen, die eine allergische Reaktion hervorrufen könnten.

3. Wie verwenden Sie dieses Arzneimittel?

Verwenden Sie dieses Arzneimittel immer genau so, wie es Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker gesagt hat. Sind Sie unsicher über die richtige Anwendung? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die empfohlene Dosierung ist:

Erwachsene und Jugendliche (12 Jahre und älter):

zur Linderung von Asthma - die übliche Anfangsdosis ist 1 Inhalation (200 Mikrogramm) einmal täglich bei Bedarf. Maximale Tagesdosis: 800 Mikrogramm (4 Inhalationen), bei Bedarf
zur Vorbeugung von Belastungsasthma - 1 Inhalation (200 Mikrogramm) 10 bis 15 Minuten vor der Belastung

Kinder (4 bis 11 Jahre):

zur Linderung von Asthma - die übliche Anfangsdosis ist 1 Inhalation (200 Mikrogramm) einmal täglich bei Bedarf
zur Vorbeugung von Belastungsasthma - 1 Inhalation (200 Mikrogramm) 10 bis 15 Minuten vor der Belastung
bei Bedarf – die übliche Anfangsdosis ist 1 Inhalation (200 Mikrogramm) viermal täglich

Die maximale Tagesdosis ist 1 Inhalation (200 Mikrogramm), viermal täglich. Verwenden Sie nicht mehr Inhalationen auf einmal oder verwenden Sie Ihren Diskus nicht häufiger. Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Ihr Arzneimittel nicht mehr so gut zu wirken scheint wie üblich, da dies darauf hindeuten könnte, dass sich Ihre Atemwegsbeschwerden verschlimmern und Sie möglicherweise ein anderes Arzneimittel benötigen.

Wenn Sie einen anderen Inhalator verwenden, kann Ihr Arzt die Dosierung anpassen. Tun Sie dies immer in Absprache mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Ventolin für Asthma verwenden, wird Ihr Arzt regelmäßig Ihre Symptome überprüfen wollen.

Anweisungen für eine korrekte Anwendung

Ihr Arzt, Ihre Krankenschwester oder Ihr Apotheker muss Ihnen Anweisungen zur korrekten Anwendung Ihres Diskus geben. Sie müssen regelmäßig überprüfen, wie Sie den Diskus verwenden. Wenn Sie den Diskus nicht wie vorgeschrieben verwenden, kann dies bedeuten, dass er nicht oder nicht ausreichend für die Erkrankung hilft, für die der Diskus verschrieben wurde. Ventolin Diskus enthält Blister mit dem Arzneimittel in Pulverform. Das Arzneimittel muss in Ihre Lungen inhaliert werden.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

Dieser Abschnitt enthält die folgende Information:

Beschreibung Ihres Diskus
Die Verwendung Ihres Diskus
Die Reinigung Ihres Diskus

Beschreibung Ihres Diskus

Wenn Sie den Diskus aus der Verpackung nehmen, befindet er sich in einer geschlossenen Position

Der Diskus enthält 60 Dosen Ihres Medikaments in Pulverform. Jede Dosis ist separat geschützt.

Oben am Diskus befindet sich ein Dosiszähler, der Ihnen zeigt, wie viele Dosen noch übrig sind. Dieser zählt bis 0 zurück. Die Zahlen 5 bis 0 erscheinen in ROT, um Sie zu warnen, dass nur noch wenige Dosen übrig sind. Sobald der Zähler auf 0 steht, ist Ihr Diskus leer.

Wenn Sie eine Dosis verwenden möchten, folgen Sie den 4 einfachen Schritten, die unten abgebildet sind:

1. Öffnen Sie Ihren Diskus
2. Schieben Sie den Hebel so weit wie möglich nach hinten
3. Inhalieren
4. Schließen Sie Ihren Diskus

Die Verwendung Ihres Diskus

1. Öffnen Sie Ihren Diskus - Um Ihren Diskus zu öffnen, halten Sie die Außenhülle des Diskus in einer Hand und legen den Daumen der anderen Hand auf den Daumengriff. Drücken Sie Ihren Daumen so weit wie möglich von sich weg. Sie werden ein Klicken hören. Dadurch wird ein kleines Loch im Mundstück geöffnet.
2. Vorbereiten der Dosis - Schieben Sie den Hebel so weit wie möglich nach hinten. Halten Sie den Diskus mit dem Mundstück zu Ihnen gerichtet. Sie können ihn sowohl in Ihrer rechten als auch in Ihrer linken Hand halten. Schieben Sie den Hebel so weit wie möglich nach hinten. Sie hören ein Klicken. Dies platziert eine Dosis Ihres Medikaments im Mundstück. Jedes Mal, wenn der Hebel nach hinten geschoben wird, wird ein Blister im Inneren des Diskus geöffnet und das Pulver ist bereit, inhaliert zu werden. Spielen Sie nicht mit dem Hebel, da sonst die Blister geöffnet werden und Medikament verloren geht.
3. Inhalieren - Halten Sie den Diskus von Ihrem Mund entfernt und atmen Sie so weit wie möglich aus. Atmen Sie nicht in Ihren Diskus ein. Setzen Sie das Mundstück an Ihre Lippen und atmen Sie gleichmäßig und tief durch den Diskus ein und nicht durch Ihre Nase. Nehmen Sie den Diskus von Ihren Lippen. Halten Sie den Atem für etwa 10 Sekunden oder so lange an, wie Sie es ohne große Mühe können. Atmen Sie langsam aus.
4. Schließen Sie Ihren Diskus - Um den Diskus zu schließen, schieben Sie den Daumengriff wieder so weit wie möglich zu sich zurück. Sie werden ein Klicken hören. Der Hebel geht in die Ausgangsposition zurück und ist wieder einsatzbereit. Der Diskus kann nun wieder von Ihnen verwendet werden.

Die Reinigung Ihres Diskus

Reinigen Sie das Mundstück des Diskus mit einem trockenen Tuch.

Haben Sie zu viel von diesem Mittel verwendet?

Wenn Sie zu viel von diesem Mittel verwendet haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker für Rat. Nehmen Sie, wenn möglich, die Ventolin Diskus 200 Verpackung mit.

Haben Sie vergessen, dieses Mittel zu verwenden?

Wenn Sie vergessen haben, Ihr Arzneimittel zu inhalieren, nehmen Sie die nächste Dosis gemäß dem Schema ein. Nehmen Sie keine doppelte Dosis, um eine vergessene Dosis auszugleichen.

Wenn Sie ein pfeifendes und keuchendes Atmen oder andere Symptome eines Asthmaanfalls bekommen, kann es notwendig sein, die nächste Dosis früher einzunehmen.

Wenn Sie die Anwendung dieses Mittels beenden

Verwenden Sie dieses Mittel so lange, wie Ihr Arzt es verschrieben hat. Sie dürfen die Anwendung nur auf Anweisung Ihres Arztes beenden.

Haben Sie noch weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels? Wenden Sie sich dann an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn sich Ihre Atmung direkt nach der Anwendung des Arzneimittels verschlechtert (bekannt als paradoxer Bronchospasmus), beenden Sie sofort die Anwendung und kontaktieren Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt. Wenn verfügbar, versuchen Sie so schnell wie möglich ein anderes kurzwirksames Asthmamittel.

Wie jedes Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, auch wenn nicht jeder davon betroffen ist.

Umstände, bei denen Sie vorsichtig sein müssen

Allergische Reaktionen: Diese kommen sehr selten bei Patienten vor, die Ventolin Diskus 200 verwenden.

Symptome sind:

Hautausschlag (Nesselsucht) und Rötung

Schwellung, manchmal des Gesichts oder des Mundes (Angioödem)

Pfeifendes, keuchendes Atmen, Husten oder Atemprobleme

Sich plötzlich schwach oder schwindelig fühlen. Dies kann zu Ohnmacht oder Bewusstseinsverlust (Kollaps) führen

→ Kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome bekommen.

Beenden Sie die Anwendung dieses Mittels.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Anwendung von Ventolin Diskus 200 gemeldet.

Häufig: treten bei weniger als 1 von 10 Patienten auf:

- Zittern (Tremor)
- Kopfschmerzen
- beschleunigter Herzschlag (Tachykardie)

Manchmal: treten bei weniger als 1 von 100 Patienten auf:

- unregelmäßiger Herzschlag (Palpitationen)
- Muskelkrämpfe
- Reizung von Mund und Rachen

Selten: treten bei weniger als 1 von 1.000 Patienten auf:

- Kaliumdefizit im Blut (Hypokaliämie)
- erhöhte Durchblutung der Gliedmaßen (Arme, Beine) durch Erweiterung der Blutgefäße (periphere Vasodilatation)

Sehr selten: treten bei weniger als 1 von 10.000 Patienten auf:

- Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen; siehe oben)
- Hyperaktivität, wie Unruhe und Reizbarkeit
- Herzrhythmusstörungen

Unbekannt: auf Grundlage der verfügbaren Daten kann die Häufigkeit nicht bestimmt werden

- Sauerstoffmangel des Herzmuskels (Myokardischämie)

Obwohl nicht genau bekannt ist, wie oft es vorkommt, können einige Menschen gelegentlich Schmerzen in der Brustgegend verspüren. Diese Schmerzen können durch Herzprobleme verursacht werden. Informieren Sie Ihren Arzt (oder, wenn Sie schwanger sind, Ihre Hebamme), wenn bei Ihnen solche Symptome auftreten, während Sie Salbutamol verwenden. Setzen Sie Salbutamol nicht eigenständig ab, tun Sie dies nur, wenn Ihr Arzt es Ihnen sagt.

- Zahnverfall (Karies)

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für mögliche Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Niederländische Nebenwirkungszentrum Lareb melden, Website: www.lareb.nl. Durch das Melden von Nebenwirkungen können Sie uns helfen, mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu erhalten.

5. Wie bewahren Sie dieses Arzneimittel auf?

Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei unter 30 °C im Originalbehältnis aufbewahren (zum Schutz vor Licht und Frost).

Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem Verfallsdatum. Dieses ist auf der Schachtel und auf dem Diskus nach dem Text: „EXP“ zu finden. Es gibt einen Monat und ein Jahr an. Der letzte Tag dieses Monats ist das Verfallsdatum.

Spülen Sie Arzneimittel nicht in die Spüle oder die Toilette und werfen Sie sie nicht in den Müll. Fragen Sie Ihren Apotheker, was Sie mit Arzneimitteln tun sollen, die Sie nicht mehr verwenden. Sie werden dann auf verantwortungsvolle Weise entsorgt und gelangen nicht in die Umwelt.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Welche Stoffe sind in diesem Arzneimittel enthalten?

- Der Wirkstoff in diesem Arzneimittel ist Salbutamol
- Der andere Stoff in diesem Arzneimittel ist Laktose (enthält Milcheiweiß)

Wie sieht Ventolin Diskus 200 aus und wie viel ist in einer Packung enthalten?

Ventolin Diskus 200 enthält einen Folienstreifen. Die Folie schützt das Pulver zur Inhalation vor atmosphärischen Einflüssen
jede Dosierung ist vorportioniert
der Diskus ist in einem Karton verpackt und der Diskus enthält 60 Inhalationen mit jeweils 200 Mikrogramm Salbutamol (als Salbutamolhemisulfat)
der Diskus hat einen Dosiszähler

Inhaber der Zulassung und Hersteller

Inhaber der Zulassung
GlaxoSmithKline BV
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP Amersfoort
033 2081100

Hersteller
Glaxo Wellcome Production
Industriezone Nr. 2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Frankreich

Marken sind Eigentum der GSK-Gruppe oder an diese lizenziert.

Ventolin Diskus 200 ist in den Niederlanden unter der Nummer RVG 19496 registriert

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im März 2024 genehmigt.

Weitere Informationen über dieses Arzneimittel sind auf der Website des College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verfügbar: www.cbg-meb.nl.