

Prospecto VERMOX

Lea todo el prospecto detenidamente, porque contiene información importante para usted. Este medicamento se puede obtener sin receta. Sin embargo, para lograr el mejor resultado posible del tratamiento, VERMOX debe usarse según las indicaciones.

Conserve el prospecto. Puede que desee leerlo nuevamente más tarde.

Consulte a su farmacéutico si necesita más información o consejo.

Si sus síntomas empeoran o no hay mejoría después de algunos días, debe consultar a un médico sin falta.

Este prospecto incluye:

1. ¿Qué es VERMOX y para qué se utiliza?
2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar VERMOX?
3. ¿Cómo se debe tomar VERMOX?
4. ¿Qué efectos secundarios son posibles?
5. ¿Cómo se debe conservar VERMOX?
6. Más información

Denominación del medicamento

VERMOX 100 mg comprimidos

VERMOX 20 mg/ml suspensión para administración oral

El principio activo es Mebendazol.

Los comprimidos de VERMOX contienen 100 mg de Mebendazol (R 17 635) por comprimido.

Otros componentes: celulosa microcristalina, talco, almidón de maíz,

Carboximetilalmidón sódico, sacarina sódica, estearato de magnesio, aceite de semilla de algodón hidrogenado, aceite de cáscara de naranja, dióxido de silicio, laurilsulfato de sodio, amarillo anaranjado S (E 110).

VERMOX Suspensión para administración oral contiene 20 mg de Mebendazol (R 17 635) por ml de suspensión.

Otros componentes: celulosa microcristalina, metilcelulosa,

carboximetilcelulosa sódica, sacarosa, laurilsulfato de sodio, metilparahidroxibenzoato, propilparahidroxibenzoato, aroma de plátano, ácido cítrico, agua purificada.

Titular de la autorización

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Bélgica

Fabricante

Tabletas

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italia

Suspensión para administración oral

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Bélgica

Número de autorización
VERMOX Tabletas: 1028 IS 162 F 3
VERMOX Suspensión para administración oral: 2 S 260 F 11

1. ¿Qué es VERMOX y para qué se utiliza?

Tabletas para administración oral:

Las tabletas están disponibles en un envase blíster con 6 tabletas.

Suspensión para administración oral:

La suspensión para administración oral está disponible en un frasco con 30 ml de solución bebible (con tapa dosificadora de plástico para 5 ml).

VERMOX es un medicamento contra infecciones por gusanos

VERMOX está indicado para el tratamiento de infecciones por uno o más tipos de gusanos:

- Oxiuro (*Enterobius vermicularis*);
- Lombriz intestinal (*Ascaris lumbricoides*);
- Tricocéfalo (*Trichuris trichuria*);
- Anquilostoma (gusano de mina) (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Tenia (*Taenia* spp.);
- Estrongiloides (*Strongyloides stercoralis*).

2. ¿Qué debe tener en cuenta antes de tomar VERMOX?

No debe tomar VERMOX,

- si es hipersensible (alérgico) al mebendazol o a alguno de los demás componentes de VERMOX. Esta hipersensibilidad puede manifestarse con erupción cutánea, picazón, dificultad para respirar y/o hinchazón de la cara. En tal caso, suspenda el tratamiento y consulte a su médico.

Se requiere especial precaución al tomar VERMOX,

- cuando se administra a niños menores de 2 años. VERMOX solo debe administrarse a niños pequeños menores de 2 años si la infección por lombrices afecta claramente el estado nutricional y el desarrollo físico del niño. En cualquier caso, consulte primero a su médico.
- si está tomando otros medicamentos. Lea también la sección "Toma de VERMOX junto con otros medicamentos".

Toma de VERMOX junto con alimentos y bebidas

No aplicable

Embarazo

Especialmente en los primeros tres meses de embarazo, es necesario sopesar los beneficios de VERMOX frente a los posibles riesgos.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Lactancia

Durante la lactancia, debe tener cuidado al tomar VERMOX.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas

VERMOX no afecta la capacidad de conducir vehículos o manejar máquinas.

Información importante sobre ciertos otros componentes de VERMOX

No aplicable

Toma de VERMOX junto con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos o si los ha tomado recientemente, incluso si se trata de medicamentos sin receta.

- Si está tomando simultáneamente cimetidina (un medicamento contra la acidez estomacal), debe informar a su médico. Él tomará las medidas adecuadas y realizará los ajustes de dosis necesarios.
- Debe evitarse la toma simultánea de VERMOX y metronidazol (un medicamento contra infecciones bacterianas y protozoarias).

3. ¿Cómo se debe tomar VERMOX?

Siga estas instrucciones exactamente, a menos que su médico le haya indicado lo contrario.
Consulte a su médico o farmacéutico si no está completamente seguro.

La cantidad de VERMOX que debe tomar depende del tipo de gusano con el que esté infectado. Si tiene dudas, consulte a su médico.

1. Oxiuros (*Enterobius vermicularis*):

1 sola tableta o 5 ml (= 1 tapa dosificadora) de solución oral.

Todos los miembros de la familia deben ser tratados al mismo tiempo y este tratamiento debe repetirse después de 2 a 4 semanas (todos los miembros de la familia toman nuevamente 1 tableta o 5 ml de solución oral). Esto es necesario para un tratamiento eficaz: la primera dosis mata todos los gusanos, pero no sus huevos, que pueden causar una nueva infección.

La dosificación es la misma para niños y adultos.

2. Lombrices, tricocéfalos, anquilostomas e infecciones mixtas: 1 tableta o 5 ml (= 1 tapa dosificadora) de solución oral por la mañana y por la noche durante tres días consecutivos.

La dosificación es la misma para niños y adultos.

3. Tenias y estrongiloides:

* Adultos:

2 a 3 tabletas o 10 a 15 ml (= 2 a 3 tapas dosificadoras) de solución oral por la mañana y por la noche durante tres días consecutivos.

* Niños mayores de 2 años:

1 tableta o 5 ml (= 1 tapa dosificadora) de solución oral por la mañana y por la noche durante tres días consecutivos.

Niños menores de 2 años: ver sección "Se requiere especial precaución al tomar VERMOX".

Cuando realice un tratamiento con VERMOX, no debe seguir una dieta especial ni tomar laxantes.

Tome la(s) tableta(s) con un poco de agua. Agite la suspensión antes de usar. La botella se abre de la siguiente manera: presione la tapa de plástico hacia abajo y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj (ver ilustración).

Si olvidó tomar VERMOX

No aplicable

Si ha interrumpido la toma de VERMOX

No aplicable

Si ha tomado una cantidad mayor de VERMOX de la que debería Si ha tomado demasiado VERMOX, por favor contacte inmediatamente a su médico, farmacéutico o al centro de intoxicaciones (070/245.245). Tomar una cantidad excesiva de VERMOX no conlleva grandes peligros. En el peor de los casos, pueden ocurrir calambres intestinales, vómitos y diarrea o dolores de cabeza y mareos. La ingesta prolongada de grandes cantidades puede causar una alteración de la función hepática.

Si presenta alguno de estos síntomas, debe informar a su médico. La administración de carbón activado puede ser útil.

4. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

Como todos los medicamentos, VERMOX puede tener efectos secundarios.

VERMOX es bien tolerado y al tomar las cantidades prescritas, apenas se esperan efectos secundarios. Sin embargo, los siguientes efectos secundarios pueden ocurrir ocasionalmente:

- Dolores de estómago breves y diarrea pueden ocurrir ocasionalmente, especialmente si tiene una infección severa de gusanos. En este caso, puede continuar tomando VERMOX según las instrucciones.
- La hipersensibilidad a VERMOX es muy rara. Esto puede manifestarse, por ejemplo, a través de erupciones cutáneas, picazón, dificultad para respirar y una cara hinchada. Si presenta alguno de estos síntomas, interrumpa la toma de VERMOX y contacte a su médico.
- En casos muy raros, se ha informado de una enfermedad grave de la piel con erupciones, ampollas en la piel y úlceras en la boca, los ojos, así como en el área genital y anal junto con fiebre. Si nota estos síntomas, contacte inmediatamente a su médico.
- Muy raramente pueden ocurrir convulsiones en bebés. VERMOX solo debe administrarse a niños menores de 1 año si su médico lo ha prescrito.
- Muy raramente, con la ingesta prolongada de VERMOX en dosis que superan significativamente las dosis recomendadas (es decir, mucho más altas de las normalmente prescritas), pueden ocurrir problemas relacionados con la sangre, el hígado y los riñones.

Informe a su médico o farmacéutico si nota efectos secundarios que no están listados en este prospecto y que considera graves.

5. Cómo almacenar VERMOX

VERMOX se almacena a temperatura ambiente (15-30°C) y protegido de la luz. Mantener VERMOX fuera del alcance de los niños.

Fecha de caducidad

La abreviatura "exp." en el envase significa que el medicamento caduca el último día del mes indicado después de la abreviatura (mes y año).

6. Más información

Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Dispensación

Las tabletas y la suspensión oral de VERMOX están disponibles sin receta.

Este prospecto fue revisado por última vez en octubre de 2004

Fecha de aprobación de este prospecto: julio de 2006

Transtoyou