

## Pakendi infoleht VERMOX

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi, sest see sisaldab teile olulist teavet. See ravim on saadaval ilma retseptita. Parima ravitulemuse saavutamiseks tuleb VERMOX-i siiski kasutada vastavalt juhistele.

Hoidke pakendi infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.

Küsige oma apteekrilt, kui vajate lisateavet või nõu.

Kui teie sümptomid süvenevad või mõne päeva pärast ei parane, peate kindlasti arsti poole pöörduma.

See pakendi infoleht sisaldab:

1. Mis on VERMOX ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peate teadma enne VERMOX-i võtmist?
3. Kuidas VERMOX-i võtta?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas VERMOX-i säilitada?
6. Lisateave

Ravimi nimetus

VERMOX 100 mg tabletid

VERMOX 20 mg/ml suukaudne suspensioon

Toimeaine on mebendasool.

VERMOX tabletid sisaldavad 100 mg mebendasooli (R 17 635) ühe tableti kohta.

Muud koostisosad: mikrokristalne tselluloos, talk, maisitärklis, Karboksümetüültärklis-naatrium, naatriumsahhariin, magneesiumstearaat, hüdrogeenitud puuvillaseemneõli, apelsinikooreõli, ränidioksiid, naatriumlaaurüülsulfaat, Gelborange S (E 110). VERMOX suukaudne suspensioon sisaldab 20 mg mebendasooli (R 17 635) ühe ml suspensiooni kohta.

Muud koostisosad: mikrokristalne tselluloos, metüülselluloos, naatriumkarboksümetüülselluloos, sahharoos, naatriumlaaurüülsulfaat, metüülparahüdroksübensoaat, propüülparahüdroksübensoaat, banaanimaitseaine, sidrunhape, puhastatud vesi.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgia

Tootja

Tabletid

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Itaalia

Suukaudne suspensioon

Janssen Pharmaceutica N.V.  
Turnhoutseweg 30  
B-2340 Beerse  
Belgia

Müügiloa number  
VERMOX tabletid: 1028 IS 162 F 3  
VERMOX suukaudne suspensioon: 2 S 260 F 11

1. Mis on VERMOX ja milleks seda kasutatakse?

Tabletid suukaudseks manustamiseks:

Tabletid on saadaval 6 tabletiga blisterpakendis.

Suukaudne suspensioon:

Suukaudne suspensioon on saadaval 30 ml joogilahusega pudelis (koos 5 ml plastmõõtekorgiga).

VERMOX on ravim usnakkuste vastu

VERMOX on näidustatud ühe või mitme ussiliigi nakkuste raviks:

- Naaskelsaba (*Enterobius vermicularis*);
- Solk (*Ascaris lumbricoides*);
- Piitsuss (*Trichuris trichuria*);
- Kidauss (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Paeluss (*Taenia* spp.);
- Kääbusniiduss (*Strongyloides stercoralis*).

2. Mida peate teadma enne VERMOX-i võtmist?

VERMOX-i ei tohi võtta,

- kui olete ülitundlik (allergiline) mebendasooli või mõne muu VERMOX-i koostisosa suhtes. See ülitundlikkus võib avalduda nahalööbe, sügeluse, hingeldamise ja/või näo turse kaudu. Sellisel juhul lõpetage ravi ja pöörduge arsti poole.

Eriiline ettevaatus on vajalik VERMOX-i võtmisel,

- kui seda manustatakse alla 2-aastastele lastele. VERMOX-i tohib väikelastele alla 2 aasta manustada ainult siis, kui usnakkus mõjutab selgelt lapse toitumisseisundit ja füüsilist arengut. Igal juhul küsige esmalt nõu oma arstilt.
- kui te võtate veel teisi ravimeid. Palun lugege ka jaotist "VERMOX-i võtmine koos teiste ravimitega".

VERMOX-i võtmine koos toidu ja jookidega

Ei kohaldata

Rasedus

Eriti raseduse esimese kolme kuu jooksul on vajalik kaaluda VERMOX-i kasulikkust võimalike riskide suhtes.

Enne kõigi ravimite võtmist küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Imetamine

Imetamise ajal peate olema VERMOX-i võtmisega ettevaatlik.

Enne kõigi ravimite võtmist küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Autojuhtimine ja masinate käsitsemine

VERMOX ei mõjuta võimet juhtida sõidukit või käsitseda masinaid.

Olulised andmed teatud teiste VERMOX-i koostisosade kohta

Ei kohaldata

VERMOX-i võtmine koos teiste ravimitega

Palun teavitage oma arsti või apteekrit, kui te võtate teisi ravimeid

või olete hiljuti võtnud, isegi kui need on käsimüügiravimid.

- Kui te võtate samaaegselt tsimetidiini (ravim maohappe vastu), peate sellest oma arsti teavitama. Ta võtab asjakohased meetmed ja teeb vajalikud annuse kohandused.
- VERMOX-i ja metronidasooli (ravim bakteriaalsete ja algloomade infektsioonide vastu) samaaegset võtmist tuleb vältida.

3. Kuidas VERMOX-i võtta?

Järgige neid juhiseid täpselt, välja arvatud juhul, kui arst on teile määranud teisiti. Kui te pole kindel, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Kui palju VERMOX-i peate võtma, sõltub ussitüübist, millega olete nakatunud. Kui teil on kahtlusi, küsige nõu oma arstilt.

1. Naaskelsabad (*Enterobius vermicularis*):

1 tablett või 5 ml (= 1 doseerimiskork) suukaudset lahust.

Kõiki pereliikmeid tuleb samaaegselt ravida ja seda ravi tuleb 2 kuni 4 nädala pärast korrata (kõik pereliikmed võtavad uuesti 1 tableti või 5 ml suukaudset lahust). See on tõhusa ravi jaoks vajalik: esimene annus tapab kõik ussid, kuid mitte nende mune, mis võivad põhjustada uut nakatumist.

Annustamine kehtib nii lastele kui ka täiskasvanutele.

2. Ümarussid, piitsussid, konksussid ja segainfektsioonid: 1 tablett või 5 ml (= 1 doseerimiskork) suukaudset lahust hommikul ja õhtul kolmel järjestikusel päeval.

Annustamine kehtib nii lastele kui ka täiskasvanutele.

3. Paelussid ja kääbusussid:

\* Täiskasvanud:

2 kuni 3 tabletti või 10 kuni 15 ml (= 2 kuni 3 doseerimiskorki) suukaudset lahust hommikul ja õhtul kolmel järjestikusel päeval.

\* Üle 2-aastased lapsed:

1 tablett või 5 ml (= 1 doseerimiskork) suukaudset lahust hommikul ja õhtul kolmel järjestikusel päeval.

Alla 2-aastased lapsed: vaadake jaotist "Eriline ettevaatus VERMOX-i võtmisel on vajalik".

Kui teete VERMOX-iga ravi, ei tohi te järgida spetsiaalset dieeti ega võtta lahtisteid.

Võtke tablett(id) koos vähese veega. Loksutage suspensiooni enne kasutamist. Pudel avatakse järgmiselt: vajutage plastkorki alla ja keerake samal ajal vastupäeva (vt joonist).

Kui olete unustanud VERMOX-i võtta

Ei kohaldata

Kui olete lõpetanud VERMOX-i võtmise

Ei kohaldata

Kui olete võtnud suurema koguse VERMOX-i, kui peaksite Kui olete võtnud liiga palju VERMOX-i, võtke viivitamatult ühendust oma arsti, apteekri või mürgistuskeskusega (070/245.245). Suure koguse VERMOX-i võtmine ei ole väga ohtlik. Halvimal juhul võivad tekkida soolekrambid, oksendamine ja kõhulahtisus või peavalu ja pearinglus. Pikaajaline suurte koguste võtmine võib põhjustada maksafunktsiooni häireid.

Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, peate sellest oma arsti teavitama. Aktiivsöö manustamine võib olla kasulik.

#### 4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid, võib ka VERMOX põhjustada kõrvaltoimeid.

VERMOX on hästi talutav ja ettenähtud koguste võtmisel on kõrvaltoimed harvad. Järgnevad kõrvaltoimed võivad siiski aeg-ajalt esineda:

- Lühiajalised kõhuvalud ja kõhulahtisus võivad aeg-ajalt esineda, eriti kui teil on raske ussnakkus. Sel juhul võite jätkata VERMOX-i võtmist vastavalt juhistele.
- Ülitundlikkus VERMOX-i suhtes on väga harv. See võib avalduda näiteks nahalööbe, sügeluse, hingeldamise ja näo turse kaudu. Kui teil esineb mõni neist sümptomitest, lõpetage VERMOX-i võtmine ja võtke ühendust oma arstiga.
- Väga harvadel juhtudel on teatatud tõsisest nahahaigusest, mille korral esineb nahalööve, villid nahal ja haavandid suus, silmades ning suguelundite ja päraku piirkonnas koos palavikuga. Kui märkate neid sümptomeid, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.
- Väga harva võivad imikutel esineda krambid. VERMOX-i tohib alla 1-aastastele lastele anda ainult siis, kui arst on selle määranud.
- Väga harva võivad pikaajalise VERMOX-i võtmise korral annustes, mis on oluliselt üle soovitatud (st palju kõrgemad kui tavaliselt määratud), tekkida probleemid vere, maksa ja neerudega.

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui märkate kõrvaltoimeid, mida selles pakendi infolehes ei ole loetletud ja mida peate tõsisesteks.

#### 5. Kuidas VERMOX-i säilitada

VERMOX-i säilitatakse toatemperatuuril (15–30°C) ja kaitstuna valguse eest. Hoidke VERMOX lastele kättesaamatus kohas.

#### Aegumiskuupäev

Lühend "exp." pakendil tähendab, et ravim aegub kuu viimasel päeval, mis on lühendi järel märgitud (kuu ja aasta).

#### 6. Lisainformatsioon

Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.

#### Väljastamine

VERMOX tabletid ja suukaudne suspensioon on saadaval ilma retseptita.

Seda pakendi infolehte uuendati viimati oktoobris 2004

Selle pakendi infolehe kinnitamise kuupäev: juuli 2006