

Pakkausseloste VERMOX

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää tärkeitä tietoja sinulle.

Tämä lääke on saatavilla ilman reseptiä. Parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi VERMOX on kuitenkin käytettävä ohjeiden mukaisesti.

Säilytä pakkausseloste. Saatat haluta lukea sen myöhemmin uudelleen.

Kysy apteekista, jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja.

Jos oireesi pahenevat tai jos muutaman päivän kuluttua ei ole tapahtunut paranemista, sinun on ehdottomasti mentävä lääkäriin.

Tämä pakkausseloste sisältää:

1. Mikä on VERMOX ja mihin sitä käytetään?
2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat VERMOXia?
3. Miten VERMOX otetaan?
4. Mitkä ovat mahdolliset haittavaikutukset?
5. Miten VERMOXia säilytetään?
6. Lisätietoja

Lääkkeen nimi

VERMOX 100 mg tabletit

VERMOX 20 mg/ml oraalisuspensio

Vaikuttava aine on mebendatsoli.

VERMOX-tabletit sisältävät 100 mg mebendatsolia (R 17 635) per tabletti.

Muut aineet: mikrokiteinen selluloosa, talkki, maissitärkkelys,

Karboksimetyylitärkkelys-natrium, natriumsakkariini, magnesiumstearaatti, hydrattu

puuvillansiemenöljy, appelsiininkuoriöljy, piidioksidi, natriumlauryylisulfaatti, keltainen oranssi S (E 110).

VERMOX-oraalisuspensio sisältää 20 mg mebendatsolia (R 17 635) per ml suspensiota.

Muut aineosat: mikrokiteinen selluloosa, metyyliiselluloosa,

natriumkarboksimetyyliiselluloosa, sakkaroosi, natriumlauryylisulfaatti, metyyli-para-

hydroksibentsoaatti, propyyli-para-hydroksibentsoaatti, banaaniaromi, sitruunahappo,

puhdistettu vesi.

Myyntiluvan haltija

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgia

Valmistaja

Tabletit

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italia

Oraalinen suspensio

Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgia

Myyntilupanumero
VERMOX-tabletit: 1028 IS 162 F 3
VERMOX-suspensio suun kautta otettavaksi: 2 S 260 F 11

1. Mitä VERMOX on ja mihin sitä käytetään?

Tabletit suun kautta otettavaksi:

Tabletit ovat saatavilla läpipainopakauksessa, jossa on 6 tablettia.

Suspensio suun kautta otettavaksi:

Suun kautta otettava suspensio on saatavilla 30 ml:n juomaliuospullossa (muovinen annostelukorkki 5 ml:lle).

VERMOX on lääke matoinfektioita vastaan

VERMOX on tarkoitettu yhden tai useamman matolajin aiheuttamien infektioiden hoitoon:

- Kihomato (*Enterobius vermicularis*);
- Suolinkainen (*Ascaris lumbricoides*);
- Piiskamato (*Trichuris trichuria*);
- Koukku- tai kaivantomato (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Heisimato (*Taenia* spp.);
- Kääpiömato (Strongyloides stercoralis).

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin otat VERMOXia?

VERMOXia ei saa ottaa,

- jos olet yliherkkä (allerginen) mebendatsolille tai jollekin muulle VERMOXin aineosalle. Tämä yliherkkyys voi ilmetä ihottumana, kutinana, hengenahdistuksena ja/tai kasvojen turvotuksena. Lopeta hoito ja ota yhteys lääkäriin tällaisessa tapauksessa.

Erytystä varovaisuutta on noudatettava, kun otat VERMOXia,

- kun sitä annetaan alle 2-vuotiaille lapsille. VERMOXia saa antaa alle 2-vuotiaille lapsille vain, jos matoinfektio vaikuttaa selvästi lapsen ravitsemustilaan ja fyysiseen kehitykseen. Kysy aina ensin neuvoa lääkäriltäsi.
- jos käytät muita lääkkeitä. Lue myös kohta "VERMOXin käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa".

VERMOXin käyttö yhdessä ruoan ja juoman kanssa

Ei sovellettavissa

Raskaus

Erytisesti raskauden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on tarpeen punnita VERMOXin hyödyt mahdollisia riskejä vastaan.

Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Imetys

Imetyksen aikana sinun on oltava varovainen VERMOXin käytössä.

Kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

VERMOX ei vaikuta kykyyn ajaa ajoneuvoa tai käyttää koneita.

Tärkeää tietoa VERMOXin tietyistä muista aineosista

Ei sovellettavissa

VERMOXin käyttö yhdessä muiden lääkkeiden kanssa

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos käytät muita lääkkeitä

tai olet äskettäin käyttänyt niitä, vaikka ne olisivat reseptivapaita lääkkeitä.

- Jos käytät samanaikaisesti simetidiiniä (lääke mahahappoa vastaan), sinun on ilmoitettava siitä lääkärillesi. Hän ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin ja tekee tarvittavat annosmuutokset.
- VERMOXin ja metronidatsolin (lääke bakteeri- ja alkueläininfektioita vastaan) samanaikaista käyttöä on vältettävä.

3. Kuinka VERMOXia käytetään?

Noudata näitä ohjeita tarkasti, ellei lääkärisi ole määrännyt toisin. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon VERMOXia sinun tulee ottaa, riippuu siitä, minkä tyyppinen mato on aiheuttanut infektion. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.

1. Kihomadot (*Enterobius vermicularis*):

1 tabletti tai 5 ml (= 1 annoskorkki) oraaliuosta.

Kaikkien perheenjäsenten on hoidettava samanaikaisesti, ja hoito on toistettava 2–4 viikon kuluttua (kaikki perheenjäsenet ottavat uudelleen 1 tabletin tai 5 ml oraaliuosta). Tämä on välttämätöntä tehokkaan hoidon kannalta: ensimmäinen annos tappaa kaikki madot, mutta ei niiden munia, jotka voivat aiheuttaa uuden infektion.

Annostus koskee sekä lapsia että aikuisia.

2. Suolinkaiset, piiskamadot, koukkumadot ja sekainfektiot: 1 tabletti tai 5 ml (= 1 annoskorkki) oraaliuosta aamulla ja illalla kolmen peräkkäisen päivän ajan.

Annostus koskee sekä lapsia että aikuisia.

3. Heisimadot ja kääpiömadot:

* Aikuiset:

2–3 tablettia tai 10–15 ml (= 2–3 annoskorkkia) oraaliuosta aamulla ja illalla kolmen peräkkäisen päivän ajan.

* Yli 2-vuotiaat lapset:

1 tabletti tai 5 ml (= 1 annoskorkki) oraaliuosta aamulla ja illalla kolmen peräkkäisen päivän ajan.

Alle 2-vuotiaat lapset: katso kohta "Erityistä varovaisuutta tarvitaan VERMOXin käytössä".

Kun käytät VERMOXia, sinun ei tarvitse noudattaa erityistä ruokavaliota tai ottaa laksatiiveja.

Ota tabletti(t) pienen vesimäärän kanssa. Ravista suspensiota ennen käyttöä. Pullo avataan seuraavasti: paina muovista kierrekorkkia alaspäin ja kierrä vastapäivään (katso kuva).

Jos unohdat ottaa VERMOXia

Ei sovellettavissa

Jos olet lopettanut VERMOX-lääkityksen
Ei sovellettavissa

Jos olet ottanut suuremman annoksen VERMOXia kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liikaa VERMOXia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, apteekkiin tai myrkytystietokeskukseen (070/245.245). Suuren määrän VERMOXin ottaminen ei aiheuta suuria vaaroja. Pahimmassa tapauksessa voi esiintyä suolikouristuksia, oksentelua ja ripulia tai päänsärkyä ja huimausta. Pitkäaikainen suurten määrien käyttö voi johtaa maksan toimintahäiriöön.

Jos jokin näistä oireista ilmenee, sinun on ilmoitettava siitä lääkärillesi. Aktiivihiihden antaminen voi olla hyödyllistä.

4. Mitkä ovat mahdolliset haittavaikutukset?

Kuten kaikki lääkkeet, myös VERMOX voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

VERMOX on hyvin siedetty, ja suositeltujen annosten käytössä haittavaikutuksia ei juuri odoteta. Seuraavat haittavaikutukset voivat kuitenkin esiintyä satunnaisesti:

- Lyhytaikaisia vatsakipuja ja ripulia voi esiintyä satunnaisesti, erityisesti jos sinulla on vakava matoinfektio. Tässä tapauksessa voit jatkaa VERMOXin ottamista ohjeiden mukaisesti.
- Yliherkkyys VERMOXille on hyvin harvinaista. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ihottumana, kutinana, hengenahdistuksena ja kasvojen turvotuksena. Jos jokin näistä oireista ilmenee, lopeta VERMOXin käyttö ja ota yhteyttä lääkäriisi.
- Hyvin harvinaisissa tapauksissa on raportoitu vakavasta ihosairaudesta, johon liittyy ihottumaa, rakkuloita iholla ja haavaumia suussa, silmissä sekä sukuelinten ja peräaukon alueella yhdessä kuumeen kanssa. Jos huomaat nämä oireet, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi.
- Hyvin harvoin voi esiintyä kouristuksia imeväisillä. VERMOXia saa antaa alle 1-vuotiaille lapsille vain, jos lääkäri on määrännyt sen.
- Hyvin harvoin pitkäaikainen VERMOXin käyttö annoksilla, jotka ovat selvästi suositeltuja suurempia (eli paljon korkeampia kuin normaalisti määrättyt), voi aiheuttaa ongelmia veren, maksan ja munuaisten suhteen.

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkarillesi, jos huomaat haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa ja joita pidät vakavina.

5. Miten VERMOXia säilytetään

VERMOX säilytetään huoneenlämmössä (15-30°C) ja suojattuna valolta. Säilytä VERMOX lasten ulottumattomissa.

Viimeinen käyttöpäivä

Pakkauksessa oleva lyhenne "exp." tarkoittaa, että lääke vanhenee kuukauden viimeisenä päivänä, joka on ilmoitettu lyhenteen jälkeen (kuukausi ja vuosi).

6. Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteyttä lääkäriisi tai apteekkiisi.

Jakelu

VERMOX-tabletit ja oraalisuspensio ovat saatavilla ilman reseptiä.

Tätä pakkausselostetta on viimeksi tarkistettu lokakuussa 2004

Tämän pakkausselosteen hyväksymispäivä: heinäkuu 2006

Transtoyou