

Notice d'emballage VERMOX

Lisez attentivement la notice d'emballage, car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance. Pour obtenir un succès optimal du traitement, VERMOX doit cependant être utilisé conformément aux instructions.

Conservez la notice d'emballage. Vous pourriez avoir besoin de la relire plus tard.

Demandez conseil à votre pharmacien si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils.

Si vos symptômes s'aggravent ou si aucune amélioration n'apparaît après quelques jours, vous devez absolument consulter un médecin.

Cette notice d'emballage comprend :

1. Qu'est-ce que VERMOX et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les précautions à prendre avant de prendre VERMOX ?
3. Comment prendre VERMOX ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VERMOX ?
6. Informations supplémentaires

Dénomination du médicament

VERMOX 100 mg comprimés

VERMOX 20 mg/ml suspension buvable

La substance active est le mébendazole.

Les comprimés de VERMOX contiennent 100 mg de mébendazole (R 17 635) par comprimé.

Autres composants : cellulose microcristalline, talc, amidon de maïs,

Carboxyméthylamidon sodique, saccharine sodique, stéarate de magnésium, huile de coton hydrogénée, huile d'écorce d'orange, dioxyde de silicium, laurylsulfate de sodium, jaune orangé S (E 110).

La suspension buvable VERMOX contient 20 mg de mébendazole (R 17 635) par ml de suspension.

Autres composants : cellulose microcristalline, méthylcellulose,

carboxyméthylcellulose sodique, saccharose, laurylsulfate de sodium,

méthylparahydroxybenzoate, propylparahydroxybenzoate, arôme banane, acide citrique, eau purifiée.

Titulaire de l'autorisation

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgique

Fabricant

Comprimés

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele
Latina – Italie
Suspension buvable
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgique

Numéro d'autorisation
VERMOX Comprimés : 1028 IS 162 F 3
VERMOX Suspension buvable : 2 S 260 F 11

1. Qu'est-ce que VERMOX et dans quel cas est-il utilisé ?

Comprimés à prendre par voie orale :

Les comprimés sont disponibles en plaquette de 6 comprimés.

Suspension buvable :

La suspension buvable est disponible en flacon de 30 ml de solution buvable (avec bouchon doseur en plastique pour 5 ml).

VERMOX est un médicament contre les infections par les vers

VERMOX est indiqué pour le traitement des infections par une ou plusieurs espèces de vers :

- Oxyure (*Enterobius vermicularis*) ;
- Ascaris (*Ascaris lumbricoides*) ;
- Trichocéphale (*Trichuris trichuria*) ;
- Ankylostome (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*) ;
- Ténia (*Taenia* spp.) ;
- Strongyloïde (*Strongyloides stercoralis*).

2. Quelles précautions devez-vous prendre avant de prendre VERMOX ?

VERMOX ne doit pas être pris,

- si vous êtes hypersensible (allergique) au mébendazole ou à l'un des autres composants de VERMOX. Cette hypersensibilité peut se manifester par des éruptions cutanées, des démangeaisons, un essoufflement et/ou un visage enflé. Dans ce cas, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

Une prudence particulière est requise lors de la prise de VERMOX,

- lorsqu'il est administré à des enfants de moins de 2 ans. VERMOX ne doit être administré aux jeunes enfants de moins de 2 ans que si l'infection par les vers affecte clairement l'état nutritionnel et le développement physique de l'enfant. Consultez toujours votre médecin au préalable.
- si vous prenez d'autres médicaments. Veuillez également lire la section "Prise de VERMOX avec d'autres médicaments".

Prise de VERMOX avec des aliments et des boissons

Non applicable

Grossesse

Surtout au cours des trois premiers mois de la grossesse, il est nécessaire de peser les avantages de VERMOX par rapport aux risques possibles.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Pendant l'allaitement, vous devez être prudent avec la prise de VERMOX.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

VERMOX n'a pas d'influence sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Informations importantes sur certains autres composants de VERMOX

Non applicable

Prise de VERMOX avec d'autres médicaments

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment, même s'il s'agit de médicaments non soumis à prescription.

- Si vous prenez simultanément de la cimétidine (un médicament contre l'acidité gastrique), vous devez en informer votre médecin. Il prendra les mesures appropriées et effectuera les ajustements de dose nécessaires.
- Il faut éviter la prise simultanée de VERMOX et de métronidazole (un médicament contre les infections bactériennes et protozoaires).

3. Comment prendre VERMOX ?

Veillez suivre ces instructions exactement, sauf si votre médecin vous a prescrit autre chose. Veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas tout à fait sûr.

La quantité de VERMOX que vous devez prendre dépend du type de ver dont vous êtes infecté. Si vous avez des doutes, veuillez demander conseil à votre médecin.

1. Oxyures (*Enterobius vermicularis*) :

1 seul comprimé ou 5 ml (= 1 bouchon doseur) de solution buvable.

Tous les membres de la famille doivent être traités en même temps et ce traitement doit être répété après 2 à 4 semaines (tous les membres de la famille prennent à nouveau 1 comprimé ou 5 ml de solution buvable). Ceci est nécessaire pour un traitement efficace : la première prise tue tous les vers, mais pas leurs œufs, qui peuvent causer une nouvelle infection.

La posologie s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

2. Ascaris, trichocéphales, ankylostomes et infections mixtes : 1 comprimé ou 5 ml (= 1 bouchon doseur) de solution buvable matin et soir pendant trois jours consécutifs.

La posologie s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

3. Ténias et strongyloïdes :

* Adultes :

2 à 3 comprimés ou 10 à 15 ml (= 2 à 3 bouchons doseurs) de solution buvable matin et soir pendant trois jours consécutifs.

* Enfants de plus de 2 ans :

1 comprimé ou 5 ml (= 1 bouchon doseur) de solution buvable matin et soir pendant trois jours consécutifs.

Enfants de moins de 2 ans : voir la section « Précautions particulières lors de la prise de VERMOX ».

Lorsque vous suivez un traitement avec VERMOX, vous ne devez pas suivre de régime spécial ni prendre de laxatifs.

Prendre le(s) comprimé(s) avec un peu d'eau. Agiter la suspension avant emploi. La bouteille s'ouvre comme suit : appuyer sur le bouchon en plastique vers le bas et tourner simultanément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (voir illustration).

Si vous avez oublié de prendre VERMOX
Non applicable

Si vous avez arrêté de prendre VERMOX
Non applicable

Si vous avez pris une quantité de VERMOX supérieure à celle que vous devriez Si vous avez pris trop de VERMOX, veuillez contacter immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison (070/245.245). La prise d'une trop grande quantité de VERMOX ne présente pas de grands dangers. Dans le pire des cas, des crampes intestinales, des vomissements et des diarrhées ou des maux de tête et des vertiges peuvent survenir. En cas de prise prolongée de grandes quantités, une altération de la fonction hépatique peut se produire.

Si l'un de ces symptômes apparaît, vous devez en informer votre médecin. L'administration de charbon actif peut être utile.

4. Quels sont les effets indésirables possibles ?

Comme tous les médicaments, VERMOX peut avoir des effets indésirables.

VERMOX est bien toléré et, en cas de prise des quantités prescrites, peu d'effets indésirables sont à prévoir. Cependant, les effets indésirables suivants peuvent occasionnellement survenir :

- Des douleurs abdominales de courte durée et des diarrhées peuvent survenir occasionnellement, surtout si vous avez une infection parasitaire sévère. Dans ce cas, vous pouvez continuer à prendre VERMOX selon les instructions.
- L'hypersensibilité à VERMOX est très rare. Elle peut se manifester par exemple par une éruption cutanée, des démangeaisons, un essoufflement et un visage enflé. Si l'un de ces symptômes apparaît, arrêtez de prendre VERMOX et contactez votre médecin.
- Dans de très rares cas, une maladie cutanée grave avec éruption cutanée, cloques sur la peau et ulcères dans la bouche, aux yeux ainsi qu'au niveau génital et anal accompagnée de fièvre a été signalée. Si vous remarquez ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin.
- Très rarement, des convulsions (crises) peuvent survenir chez les nourrissons. VERMOX ne doit être administré aux enfants de moins de 1 an que si votre médecin l'a prescrit.
- Très rarement, en cas de prise prolongée de VERMOX à des doses nettement supérieures aux doses recommandées (c'est-à-dire beaucoup plus élevées que celles normalement prescrites), des problèmes concernant le sang, le foie et les reins peuvent survenir.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez des effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice et que vous considérez comme graves.

5. Comment conserver VERMOX

VERMOX est conservé à température ambiante (15-30°C) et à l'abri de la lumière. Conserver VERMOX hors de la portée des enfants.

Date de péremption

L'abréviation "exp." sur l'emballage signifie que le médicament expire le dernier jour du mois indiqué après l'abréviation (mois et année).

6. Informations supplémentaires

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Remise

Les comprimés et la suspension buvable de VERMOX sont disponibles sans ordonnance.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en octobre 2004

Date d'approbation de cette notice : juillet 2006