

Pakuotės lapelis VERMOX

Perskaitykite visą pakuotės lapelį atidžiai, nes jame pateikiama svarbi informacija Jums. Šis vaistas parduodamas be recepto. Tačiau norint pasiekti geriausią gydymo rezultatą, VERMOX turi būti vartojamas pagal nurodymus.

Išsaugokite pakuotės lapelį. Galbūt norėsite jį perskaityti dar kartą vėliau.

Kreipkitės į vaistininką, jei Jums reikia daugiau informacijos ar patarimo.

Jei Jūsų simptomai pablogėja arba po kelių dienų nepagerėja, būtinai turite kreiptis į gydytoją.

Šis pakuotės lapelis apima:

1. Kas yra VERMOX ir kam jis vartojamas?
2. Ką turite žinoti prieš vartodami VERMOX?
3. Kaip vartoti VERMOX?
4. Kokios galimos šalutinės reakcijos?
5. Kaip laikyti VERMOX?
6. Papildoma informacija

Vaisto pavadinimas

VERMOX 100 mg tabletės

VERMOX 20 mg/ml geriamoji suspensija

Veiklioji medžiaga yra mebendazolas.

VERMOX tabletės turi 100 mg mebendazolo (R 17 635) vienoje tabletėje.

Kiti komponentai: mikrokristalinė celiuliozė, talkas, kukurūzų krakmolos, Karboksietilkrakmolo natrio, natrio sacharinas, magnio stearatas, hidrintas medvilnės sėklų aliejus, apelsinų žievelių aliejus, silicio dioksidas, natrio laurilsulfatas, geltonasis oranžinis S (E 110).

VERMOX geriamoji suspensija turi 20 mg mebendazolo (R 17 635) viename ml suspensijos.

Kiti komponentai: mikrokristalinė celiuliozė, metilceliuliozė, natrio karboksietilceliuliozė, sacharozė, natrio laurilsulfatas, metilparahidroksibenzoatas, propilparahidroksibenzoatas, bananų aromatas, citrinų rūgštis, išgrynintas vanduo.

Registracijos turėtojas

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgija

Gamintojas

Tabletės

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italija

Geriamoji suspensija

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgija

Registracijos numeris
VERMOX tabletės: 1028 IS 162 F 3
VERMOX geriamoji suspensija: 2 S 260 F 11

1. Kas yra VERMOX ir kam jis vartojamas?

Tabletės geriamajam vartojimui:

Tabletės tiekiamos lizdinėje plokštelėje su 6 tabletėmis.

Geriamoji suspensija:

Geriamoji suspensija tiekama buteliuke su 30 ml geriamojo tirpalo (su plastikiniu 5 ml dozavimo dangteliu).

VERMOX yra vaistas nuo kirminų infekcijų

VERMOX skirtas gydyti infekcijas, sukeltas vienos ar kelių kirminų rūšių:

- Spalinės (*Enterobius vermicularis*);
- Askaridės (*Ascaris lumbricoides*);
- Plaktonės (*Trichuris trichuria*);
- Kablinės kirmėlės (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Kaspinočiai (*Taenia* spp.);
- Nykštukinės kirmėlės (*Strongyloides stercoralis*).

2. Ką turite žinoti prieš vartodami VERMOX?

VERMOX negalima vartoti,

- jei esate padidėjęs jautrumas (alergiškas) mebendazolui arba bet kuriai kitai VERMOX sudedamajai daliai. Šis padidėjęs jautrumas gali pasireikšti odos bėrimu, niežuliu, dusuliu ir/arba veido patinimu. Tokiu atveju nutraukite gydymą ir kreipkitės į gydytoją.

Ypatingas atsargumas vartojant VERMOX yra būtinas,

- kai skiriama vaikams iki 2 metų. VERMOX gali būti skiriamas mažiems vaikams iki 2 metų tik tada, kai kirminų infekcija aiškiai pablogina vaiko mitybos būklę ir fizinį vystymąsi. Bet kuriuo atveju pirmiausia pasitarkite su savo gydytoju.
- jei vartojate kitus vaistus. Prašome taip pat perskaityti skyrių „VERMOX vartojimas kartu su kitais vaistais“.

VERMOX vartojimas kartu su maistu ir gėrimais

Nicht zutreffend

Nėštumas

Ypač pirmuosius tris nėštumo mėnesius būtina įvertinti VERMOX naudą ir galimą riziką. Prieš vartodami bet kokius vaistus, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Žindymo laikotarpis

Žindymo laikotarpiu turite būti atsargūs vartodami VERMOX.

Prieš vartodami bet kokius vaistus, pasitarkite su savo gydytoju arba vaistininku.

Gebėjimas vairuoti ir valdyti mechanizmus

VERMOX neturi įtakos gebėjimui vairuoti transporto priemones ar valdyti mechanizmus.

Svarbi informacija apie tam tikras kitas VERMOX sudedamąsias dalis
Nicht zutreffend

VERMOX vartojimas kartu su kitais vaistais

Prašome informuoti savo gydytoją arba vaistininką, jei vartojate kitus vaistus arba neseniai vartojote, net jei tai yra nereceptiniai vaistai.

- Jei tuo pačiu metu vartojate cimetidiną (vaistą nuo skrandžio rūgšties), turite apie tai pranešti savo gydytojui. Jis ims tinkamų priemonių ir atliks reikiamus dozės koregavimus.
- Reikėtų vengti vienu metu vartoti VERMOX ir metronidazolą (vaistą nuo bakterijų ir pirmuonių infekcijų).

3. Kaip vartoti VERMOX?

Prašome tiksliai laikytis šių nurodymų, nebent gydytojas nurodė kitaip. Jei nesate tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Kiek VERMOX turite vartoti, priklauso nuo kirminų rūšies, kuria esate užsikrėtę. Jei turite abejonių, pasitarkite su gydytoju.

1. Spalinės (Enterobius vermicularis):

1 tabletė arba 5 ml (= 1 dozavimo dangtelis) geriamojo tirpalo.

Visi šeimos nariai turi būti gydomi vienu metu, o šis gydymas turi būti pakartotas po 2–4 savaitių (visi šeimos nariai vėl vartoja 1 tabletę arba 5 ml geriamojo tirpalo). Tai būtina veiksmingam gydymui: pirmasis vartojimas sunaikina visus kirminus, tačiau ne jų kiaušinėlius, kurie gali sukelti naują infekciją.

Dozavimas taikomas tiek vaikams, tiek suaugusiems.

2. Apvaliosios kirmėlės, plaukagalviai, kabliukai ir mišrios infekcijos: 1 tabletė arba 5 ml (= 1 dozavimo dangtelis) geriamojo tirpalo ryte ir vakare tris iš eilės einančias dienas.

Dozavimas taikomas tiek vaikams, tiek suaugusiems.

3. Kaspinočiai ir nykštukiniai siūliniai kirminai:

* Suaugusieji:

2–3 tabletės arba 10–15 ml (= 2–3 dozavimo dangteliai) geriamojo tirpalo ryte ir vakare tris iš eilės einančias dienas.

* Vaikai virš 2 metų:

1 tabletė arba 5 ml (= 1 dozavimo dangtelis) geriamojo tirpalo ryte ir vakare tris iš eilės einančias dienas.

Vaikai iki 2 metų: žr. skyrių „Ypatingas atsargumas vartojant VERMOX yra būtinas“.

Vykdamas gydymą VERMOX, nereikia laikytis specialios dietos ir nevartoti vidurius laisvinančių vaistų.

Tabletes užgerkite šiek tiek vandens. Prieš vartojimą suspensiją suplakite. Butelis atidaromas taip: plastikinį užsukamą dangtelį spauskite žemyn ir tuo pačiu metu sukite prieš laikrodžio rodyklę (žr. paveikslėlį).

Jei pamiršote išgerti VERMOX
Netinkama

Jei nustojote vartoti VERMOX

Netinkama

Jei išgėrėte daugiau VERMOX, nei turėtumėte. Jei išgėrėte per daug VERMOX, nedelsdami susisieki su savo gydytoju, vaistininku arba apsinuodijimų centru (070/245.245). Išgėrus per daug VERMOX, didelės grėsmės nėra. Blogiausiu atveju gali pasireikšti žarnyno spazmai, vėmimas ir viduriavimas arba galvos skausmas ir svaigulys. Ilgai vartojant dideles dozes, gali sutrikti kepenų funkcija.

Jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų, turite apie tai informuoti savo gydytoją. Aktyvintos anglies vartojimas gali būti naudingas.

4. Kokios galimos šalutinės reakcijos?

Kaip ir visi vaistai, VERMOX gali turėti šalutinį poveikį.

VERMOX yra gerai toleruojamas ir vartojant nurodytas dozes, šalutinis poveikis yra retas.

Tačiau kartais gali pasireikšti šie šalutiniai poveikiai:

- Trumpalaikiai pilvo skausmai ir viduriavimas gali kartais pasireikšti, ypač jei turite sunkią kirminų infekciją. Tokiu atveju galite toliau vartoti VERMOX pagal nurodymus.
- Labai retai pasitaiko padidėjęs jautrumas VERMOX. Tai gali pasireikšti pavyzdžiui, odos bėrimu, niežuliu, dusuliu ir patinimu veide. Jei pasireiškia kuris nors iš šių simptomų, nutraukite VERMOX vartojimą ir susisieki su savo gydytoju.
- Labai retais atvejais buvo pranešta apie sunkią odos ligą su odos bėrimu, pūslelėmis ant odos ir opomis burnoje, akyse bei genitalijų ir išangės srityje kartu su karščiavimu. Jei pastebite šiuos simptomus, nedelsdami susisieki su savo gydytoju.
- Labai retai kūdikiams gali pasireikšti traukuliai. VERMOX vaikams iki 1 metų gali būti skiriamas tik gydytojui paskyrus.
- Labai retai ilgai vartojant VERMOX dozes, kurios gerokai viršija rekomenduojamas (t.y. daug didesnes nei paprastai skiriamos), gali kilti problemų dėl kraujo, kepenų ir inkstų.

Informuokite savo gydytoją arba vaistininką, jei pastebite šalutinį poveikį, kuris nėra paminėtas šiame pakuotės lapelyje ir kurį laikote rimtu.

5. Kaip laikyti VERMOX

VERMOX laikomas kambario temperatūroje (15-30°C) ir apsaugotas nuo šviesos. Laikyti VERMOX vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Galiojimo data

Santrumpa "exp." ant pakuotės reiškia, kad vaistas galioja iki paskutinės mėnesio dienos, nurodytos po santrumpos (mėnuo ir metai).

6. Papildoma informacija

Jei turite daugiau klausimų apie šio vaisto vartojimą, kreipkitės į savo gydytoją arba vaistininką.

Išdavimas

VERMOX tabletės ir geriamoji suspensija yra parduodamos be recepto.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą buvo peržiūrėtas 2004 m. spalio mėn.

Šio pakuotės lapelio patvirtinimo data: 2006 m. liepa