

Pakningsvedlegg VERMOX

Les hele pakningsvedlegget nøye, for det inneholder viktig informasjon for deg. Dette legemidlet er tilgjengelig uten resept. For å oppnå best mulig behandlingsresultat, må VERMOX imidlertid brukes i henhold til forskriftene.

Oppbevar pakningsvedlegget. Du kan ha behov for å lese det igjen senere.

Spør apoteket ditt hvis du trenger mer informasjon eller råd.

Hvis symptomene dine forverres eller det ikke er noen bedring etter noen dager, må du oppsøke lege.

Dette pakningsvedlegget inneholder:

1. Hva er VERMOX og hva brukes det til?
2. Hva må du vite før du tar VERMOX?
3. Hvordan skal VERMOX tas?
4. Hvilke bivirkninger er mulige?
5. Hvordan skal VERMOX oppbevares?
6. Ytterligere informasjon

Navn på legemidlet

VERMOX 100 mg tabletter

VERMOX 20 mg/ml mikstur til oral bruk

Virkestoffet er Mebendazol.

VERMOX tabletter inneholder 100 mg Mebendazol (R 17 635) per tablett.

Andre innholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, talkum, maisstivelse, Natriumkarboksymetylstivelse, natriumsakkarin, magnesiumstearat, hydrogenert bomullsfrøolje, appelsinskallolje, silisiumdioksid, natriumlaurylsulfat, Gelborange S (E 110).
VERMOX mikstur til oral bruk inneholder 20 mg Mebendazol (R 17 635) per ml mikstur.

Andre bestanddeler: mikrokrystallinsk cellulose, metylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose, sukrose, natriumlaurylsulfat, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, bananaroma, sitronsyre, renset vann.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Janssen-Cilag n.v.

Roderveldlaan 1

B-2600 Berchem

Belgia

Produsent

Tabletter

Janssen-Cilag S.p.A.

Via C. Janssen

I-04010 Borgo San Michele

Latina – Italia

Mikstur til oral bruk

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse
Belgia

Markedsføringstillatelsesnummer
VERMOX tabletter: 1028 IS 162 F 3
VERMOX mikstur til oral bruk: 2 S 260 F 11

1. Hva er VERMOX og hva brukes det til?

Tabletter til oral bruk:

Tablettene er tilgjengelige i en blisterpakning med 6 tabletter.

Mikstur til oral bruk:

Miksturen til oral bruk er tilgjengelig i en flaske med 30 ml drikkeløsning (med målekopp i plast for 5 ml).

VERMOX er et middel mot ormeinfeksjoner

VERMOX er indikert for behandling av infeksjoner forårsaket av en eller flere ormetyper:

- Barneorm (*Enterobius vermicularis*);
- Spolorm (*Ascaris lumbricoides*);
- Piskeorm (*Trichuris trichuria*);
- Hakeorm (Grubenwurm) (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- Bendelorm (*Taenia* spp.);
- Dvergrundeorm (*Strongyloides stercoralis*).

2. Hva må du ta hensyn til før du tar VERMOX?

VERMOX må ikke tas,

- hvis du er overfølsom (allergisk) mot mebendazol eller noen av de andre bestanddelene i VERMOX. Denne overfølsomheten kan uttrykkes ved utslett, kløe, kortpustethet og/eller et hovent ansikt. Avbryt behandlingen og kontakt legen din i så fall.

Spesiell forsiktighet ved inntak av VERMOX er nødvendig,

- når det gis til barn under 2 år. VERMOX skal kun gis til småbarn under 2 år hvis ormeinfeksjonen tydelig påvirker barnets ernæringstilstand og fysiske utvikling. Rådfør deg alltid med legen din først.
- hvis du tar andre legemidler. Les også avsnittet "Bruk av VERMOX sammen med andre legemidler".

Ved inntak av VERMOX sammen med mat og drikke

Ikke relevant

Graviditet

Spesielt i de første tre månedene av svangerskapet er det nødvendig å veie fordelene med VERMOX opp mot de mulige risikoene.

Rådfør deg med legen din eller apoteket før du tar noen legemidler.

Amming

Under amming må du være forsiktig med å ta VERMOX.

Rådfør deg med legen din eller apoteket før du tar noen legemidler.

Kjøring og bruk av maskiner

VERMOX påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Viktige opplysninger om visse andre innholdsstoffer i VERMOX
Ikke relevant

Bruk av VERMOX sammen med andre legemidler

Informér legen din eller apoteket hvis du tar andre legemidler eller nylig har tatt dem, selv om det er reseptfrie legemidler.

- Hvis du samtidig tar Cimetidin (et legemiddel mot magesyre), må du informere legen din. Han vil ta de nødvendige tiltakene og gjøre nødvendige dosejusteringer.
- Samtidig inntak av VERMOX og Metronidazol (et legemiddel mot bakterie- og protozoainfeksjoner) bør unngås.

3. Hvordan skal VERMOX tas?

Følg disse instruksjonene nøye, med mindre legen din har foreskrevet noe annet. Spør legen din eller apoteket hvis du er usikker.

Hvor mye VERMOX du må ta, avhenger av typen orm du er infisert med. Hvis du er i tvil, vennligst spør legen din om råd.

1. Barnemark (*Enterobius vermicularis*):

1 enkelt tablett eller 5 ml (= 1 doseringshette) mikstur.

Alle familiemedlemmer må behandles samtidig, og denne behandlingen må gjentas etter 2 til 4 uker (alle familiemedlemmer tar igjen 1 tablett eller 5 ml mikstur). Dette er nødvendig for en effektiv behandling: den første dosen dreper alle ormer, men ikke eggene, som kan forårsake en ny infeksjon.

Doseringen gjelder både for barn og voksne.

2. Spolorm, piskeorm, hakeorm og blandingsinfeksjoner: 1 tablett eller 5 ml (= 1 doseringshette) mikstur morgen og kveld i tre påfølgende dager.

Doseringen gjelder både for barn og voksne.

3. Bendelorm og dvergbendelorm:

* Voksne:

2 til 3 tabletter eller 10 til 15 ml (= 2 til 3 doseringshetter) mikstur morgen og kveld i tre påfølgende dager.

* Barn over 2 år:

1 tablett eller 5 ml (= 1 doseringshette) mikstur morgen og kveld i tre påfølgende dager.

Barn under 2 år: se avsnittet "Spesiell forsiktighet ved bruk av VERMOX er nødvendig".

Når du gjennomfører en behandling med VERMOX, trenger du ikke følge en spesiell diett eller ta avføringsmidler.

Ta tablett(en) med litt vann. Rist suspensjonen før bruk. Flasken åpnes som følger: trykk plastskrukorken ned og vri samtidig mot klokken (se illustrasjon).

Hvis du har glemt å ta VERMOX

Ikke relevant

Hvis du har avbrutt inntaket av VERMOX

Ikke relevant

Hvis du har tatt en større mengde VERMOX enn du burde Hvis du har tatt for mye VERMOX, ta umiddelbart kontakt med legen din, apoteket eller Giftinformasjonen (070/245.245). Inntak av for mye VERMOX medfører ingen store farer. I verste fall kan tarmkramper, oppkast og diaré eller hodepine og svimmelhet oppstå. Ved langvarig inntak av store mengder kan det oppstå forstyrrelser i leverfunksjonen.

Hvis noen av disse symptomene oppstår hos deg, må du informere legen din. Administrering av aktivt kull kan være nyttig.

4. Hvilke bivirkninger er mulige?

Som alle legemidler kan VERMOX ha bivirkninger.

VERMOX er godt tolerert, og ved inntak av foreskrevne mengder er det knapt forventet bivirkninger. Følgende bivirkninger kan imidlertid av og til oppstå:

- Kortvarige magesmerter og diaré kan av og til forekomme, spesielt hvis du har en alvorlig ormeinfeksjon. I dette tilfellet kan du fortsette å ta VERMOX i henhold til instruksjonene.
- Overfølsomhet overfor VERMOX er svært sjelden. Dette kan uttrykkes ved for eksempel utslett, kløe, kortpustethet og et hovent ansikt. Hvis noen av disse symptomene oppstår hos deg, avbryt inntaket av VERMOX og kontakt legen din.
- I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om en alvorlig hudsykdom med utslett, blemmer på huden og sår i munnen, på øynene samt i kjønns- og endetarmsområdet sammen med feber. Hvis du merker disse symptomene, ta umiddelbart kontakt med legen din.
- Svært sjelden kan kramper oppstå hos spedbarn. VERMOX skal kun gis til barn under 1 år hvis legen din har foreskrevet det.
- Svært sjelden kan langvarig inntak av VERMOX i doser som ligger betydelig over de anbefalte dosene (dvs. mye høyere enn de vanligvis foreskrevne), føre til problemer med blod, lever og nyrer.

Informér legen din eller apoteket hvis du merker bivirkninger som ikke er oppført i dette pakningsvedlegget og som du oppfatter som alvorlige.

5. Hvordan oppbevares VERMOX

VERMOX oppbevares ved romtemperatur (15-30°C) og beskyttet mot lys. Oppbevar VERMOX utilgjengelig for barn.

Utløpsdato

Forkortelsen "exp." på emballasjen betyr at legemidlet utløper den siste dagen i måneden som er angitt etter forkortelsen (måned og år).

6. Ytterligere informasjon

Hvis du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet, vennligst kontakt legen din eller apoteket.

Utlevering

VERMOX tabletter og mikstur til oral bruk er tilgjengelig uten resept.

Denne pakningsvedlegget ble sist oppdatert i oktober 2004

Godkjenningsdato for dette pakningsvedlegget: juli 2006